


الثنائية:.....	فرض كتابي رقم ② (الدورة الأولى)	المستوى : الأول من سلك البكالوريا الشعبة : العلوم التجريبية
المدة : ساعتان	المادة : العلوم الفيزيائية	

2010/2011

فيزياء 1:


نعتبر جسما صلبا كتلته $m = 0,4\text{kg}$ يمكنه الانتقال فوق سكة $ABCD$ حيث $AB = 3\text{m}$ و $r = 0,5\text{m}$ و $CD = 2\text{m}$ و $\theta = 60^\circ$.
نهمل جميع الاحتكاكات على المدار ABC ونأخذ $g = 10\text{N/kg}$.



(شكل 1)

- 1°) أحسب شغل وزن الجسم خلال الانتقال AB ؟
- 2°) عبر عن طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية للجسم في الموضع A بدلالة m و g و r و θ .
نختار كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية : $E_{pp} = 0$ عند الموضع C .
ثم أحسب E_{pp} و E_m عند الموضع A ؟
- 3°) أحسب كلا من طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية للجسم في الموضع B ؟
- 4°) أحسب كلا من طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية للجسم في الموضع C ؟
- 5°) إذا كان الجسم يتوقف عند الموضع D :
• أحسب شغل قوة الاحتكاك بين النقطتين C و D ؟
• واستنتج كمية الحرارة المبددة خلال الانتقال CD ؟

فيزياء 2:



شكل 2

- يمكن لساق OA كتلتها M وطولها l الدوران في مستوى رأسي يمر من الطرف O .
1°) نبعد الساق عن موضع التوازن بزاوية θ_0 ثم نحررها بطاقة حركية $E_{c0} = 0,12\text{J}$.
1.1- أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية للساق بدلالة M و g و l و θ ؟
1.2- نعتبر موضع التوازن كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية.
أحسب قيمة الطاقة E_{pp} عند $\theta_0 = \frac{\pi}{6}\text{rad}$. نعطي $l = 0,6\text{m}$ و $M = 0,2\text{kg}$.
2°) أحسب الطاقة الميكانيكية للساق في مجال الثقالة علما أنها تبقى ثابتة خلال الحركة ؟
3°) حدد الاستطالة القصوى θ_{max} التي تكونها الساق مع موضع التوازن عندما تتعدم طاقتها الحركية ؟

الكيمياء:

- نذيب $7,42\text{g}$ من كربونات الصوديوم اللاممية، صيغته $Na_2CO_3(s)$ في الماء فنحصل على محلول (S) حجمه $V_s = 250\text{ml}$.
- 1- أكتب معادلة ذوبان الجسم الصلب في الماء؟
 - 2- أحسب التراكيز المولية الفعلية للأنواع الناتجة عن ذوبان هذا المركب في الماء؟
 - 3- نضيف إلى المحلول (S) حجما $V' = 150\text{ml}$ من محلول S' لكلورور الصوديوم تركيزه $C' = 0,1\text{mol/l}$.
أحسب التراكيز المولية الفعلية للأيونات المتواجدة في الخليط ؟
نعطي: $M(\text{Na}) = 23\text{g/mol}$ ، $M(\text{C}) = 12\text{g/mol}$ و $M(\text{O}) = 16\text{g/mol}$

أرجو دعائكم وشكرا

Prof : Med Amine