

المواصلة والموصلية La conductance et la conductivité

1. مواصلة محلول إلكتروليتي

1.1. مواصلة جزء من محلول إلكتروليتي

عند غمر صفيحتين من النحاس، مستويتين ومتوازيتين في محلول إلكتروليتي، وتطبيق توتر مستمر أو متناوب بينهما، فإن الجزء المحصور بين الصفيحتين من محلول يتصرف كثائي قطب له مقاومة R ومواصلة G .

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

حيث: G (السيemens) I (آمبير) U (فيولت) R (أوم)

ملاحظة: لقياس مواصلة محلول إلكتروليتي نستعمل توترًا متناوباً جيبياً بتردد مرتفع نسبياً 500Hz لتفادي تشویش التفاعلات الكيميائية على مستوى الصفيحتين.

2. العوامل المؤثرة على مواصلة محلول إلكتروليتي

أ. العوامل المؤثرة المرتبطة بسميات خلية القياس

- ✓ تتناسب المواصلة G اطراداً مع المساحة المغمورة S لصفيحتي القياس.
- ✓ تتناسب المواصلة G عكسياً مع المسافة L الفاصلة بين صفيحتي القياس.

ب. العوامل المؤثرة المرتبطة بسميات محلول المدروس

- ✓ تتعلق المواصلة G بطبيعة الأيونات المتواجدة في محلول.
- ✓ تزداد المواصلة G مع تزايد درجة حرارة محلول.
- ✓ تتناسب المواصلة G اطراداً مع تركيز محلول C .

المنحنى الممثل للمواصلة G بدلالة التركيز C يسمى **منحنى التدريج**، وهو يستعمل لتحديد تراكيز المحاليل الإلكترولية.

ملاحظة هامة: للتمكن من استعمال منحنى التدريج $G = f(C)$ لتحديد تركيز محلول ما يجب توفر الشروط التالية:

- ✓ المحافظة على ثبات كل العوامل المؤثرة الأخرى.
- ✓ تراكيز المحاليل المدروسة أقل من $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. (عند ارتفاع التراكيز منحنى التدريج لا يحافظ على خاصيته الخطية).

II. موصلة محلول إلكتروليتي

1. تعريف

الموصلية σ هي خاصية مميزة للمحلول الإلكتروني (لا تتعلق بسميات خلية القياس).

$$G = \sigma \frac{S}{L}$$

تعبر عنها هو: σ (S.m⁻¹)

حيث: $\frac{S}{L}$: مقدار يميز خلية القياس يسمى **ثابتة الخلية**.

2. الموصليات المولية الأيونية

يتميز كل أيون في محلول بقده وشحنته وحالة تمييهه، مما يؤثر على قدرته على توصيل التيار الكهربائي، ويتم التعبير عن هذه القدرة **بالموصليات المولية الأيونية**. يرمز لها ب λ ، وحدتها هي: $\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$.

3. العلاقة بين موصليات محلول والموصليات المولية الأيونية

في محلول أيوني مائي يحتوي على n نوع من الأيونات X_i الأحادية الشحنة، يساهم كل نوع بمقدار: $\sigma_i = \lambda_i \cdot [X_i]$.

وبالتالي نكتب موصليات محلول على الشكل التالي:

$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$	$\text{K}^+ + \text{Cl}^-$	$\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	المحلول
1 mmol.L ⁻¹	1 mmol.L ⁻¹	1 mmol.L ⁻¹	التركيز C
268 μS	171 μS	137 μS	المواصلة G

تمرين تطبيقي:

لدينا المعطيات التالية:

1. أوجد مواصلة محلول ($\text{K}^+ + \text{OH}^-$) ذي تركيز 1 mmol.L^{-1} .