

تصحيح تمارين توسيع الكيمياء العضوية

تمرين 1:

1- لدينا في مول واحد من الفيتامين "C" كتلته المولية M ، كتلة (C) m من الكربون

*النسبة المئوية للكربون تكتب :

$$m(C) = \frac{40,9}{100} \times M$$

$$m(C) = 72g \quad m(C) = \frac{40,9}{100} \times 176$$

*بالنسبة للهيدروجين نكتب :

$$m(H) = \frac{4,6}{100} \times M$$

$$m(H) = 8 \quad m(H) = \frac{4,6}{100} \times 176$$

*بالنسبة للأوكسجين نكتب :

$$m(O) = \frac{54,5}{100} \times M$$

$$m(O) = 96g \quad m(H) = \frac{54,6}{100} \times 176$$

2- استنتاج الصيغة الإجمالية :

لنععتبر $C_xH_yO_z$ الصيغة الإجمالية للفيتامين "C" ، حسب كتل العناصر المكونة
لمول واحد نكتب :

$$x = \frac{72}{12} = 6 \quad \text{أي : } x = \frac{m(C)}{M(C)}$$

$$y = \frac{8}{1} = 8 \quad \text{أي : } y = \frac{m(H)}{M(H)}$$

$$z = \frac{96}{16} = 6 \text{ أي: } z = \frac{m(O)}{M(O)}$$

إذن الصيغة الإجمالية للفيتامين "C" هي :

تمرين 2:

1- ليكن M الكتلة المولية للكوليسترول ذي الصيغة الإجمالية : $C_{27}H_{46}O$:
 $M=27M(C)+46M(H)+M(O)$

$$M=27\times 12+46\times 1+16$$

$$M=386\text{g.mol}^{-1}$$

2- يكون المركب عضوياً إذا كانت جزيئته تتوفّر على الأقل على عنصري الكربون والهيدروجين ومنه فإن جزيئة الكوليسترول عضوية .

3- ليكن المركب A صيغته الإجمالية $C_{27}H_{46}O$ وكتلته المولية M .
تحسب النسب الكتليلية للعناصر المكونة لـ A بالعلاقة :

$$\%C = \frac{x \cdot M(C)}{M(A)} \times 100$$

$$\%H = \frac{y \cdot M(H)}{M(A)} \times 100$$

$$\%O = \frac{z \cdot M(O)}{M(A)} \times 100$$

وبالتالي بالنسبة لجزيئة الكوليسترول $C_{27}H_{46}O$

$$\%C = \frac{27 \times 12}{386} \times 100 = 84\%$$

$$\%H = \frac{46 \times 1}{386} \times 100 = 12\%$$

$$\%O = \frac{1 \times 16}{386} \times 100 = 4\%$$

تمرين 3:

1- نعتبر أن الصيغة الإجمالية للحمض هي : $C_xH_yO_z$

$$\%C = \frac{M(C)}{M} \times x \Rightarrow x = \frac{\%C}{M(C)} M \Rightarrow x = \frac{0,40}{12} \times 60 = 2$$

$$\%H = \frac{M(H)}{M} \times y \Rightarrow y = \frac{\%H}{M(H)} M \Rightarrow y = 4$$


$$\%O = \frac{M(O)}{M} \times z \Rightarrow z = \frac{\%O}{M(O)} M \Rightarrow z = 2$$

نستنتج صيغة حمض الإيثانويك


2- تمثيل لويس للجزئية

العنصر الكيميائي	عدد الطبقة الخارجية	عدد الأزواج الرابطة	عدد الأزواج غير الرابطة
كربون : C	4	$n_d = 0$	$n_{d'} = 8 - 4 = 4$
أوكسيجين : O	6	$n_d = 2$	$n_{d'} = 8 - 6 = 2$
هيدروجين : H	1	$n_d = 0$	$n_{d'} = 2 - 1 = 1$

تمثيل لويس للجزئية :



3- تمثيل لويس لجزيئه :



نلاحظ أن هذه الجزيئه لها نفس الصيغة الاجمالية لجزيئه الخل C_2H_6 وبالتالي فهما متماکبان .

تمرين 4:

1- التعبير العام لكتافة جسم غازي d بالنسبة الى الهواء:

$$d = \frac{M}{29}$$

حيث:

M : الكتلة المولية للغاز المعبر عنها ب (g.mol⁻¹)
و d مقدار بدون وحدة

2- الصيغة الاجمالية للألكان الغازي :
الكتلة المولية للألكان هي:

$$M(C_nH_{2n+2}) = 12M(C) + (2n+2)M(H) = 12n + 2n + 2$$

$$M(C_nH_{2n+2}) = 14n + 2$$

لدينا:

$$d = \frac{M}{29} = \frac{14n + 2}{29}$$

$$14n + 2 = 29d$$

$$n = \frac{29d - 2}{14}$$

ت.ع:

$$n = \frac{29 \times 2,483 - 2}{14} = 5$$

صيغة البنية الإجمالية :
 C_5H_{12}

تمرين 5

1- الصيغة الإجمالية للأسيتيلين :
 C_xH_y :
نحدد أولاً الكتلة المولية للأسيتيلين :

$$\text{نعلم أن: } n = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

$$M = \frac{m \cdot V_m}{V}$$

$$\text{كما أن: } m = \rho V \quad \text{أي: } \rho = \frac{m}{V}$$

الكتلة المولية تكتب :

$$M = \frac{\rho V \cdot V_m}{V} = \rho \cdot V_m$$

$$M = 1,083 \times 24 = 25,99 \approx 26 g. mol^{-1}$$

$$\%C = \frac{M(C)}{M} \times x \Rightarrow x = \frac{\%C}{M(C)} M \Rightarrow x = \frac{0,923}{12} \times 26 = 2$$

$$\%H = \frac{M(H)}{M} \times y \Rightarrow y = \frac{\%H}{M(H)} M \Rightarrow y = \frac{0,077}{1} \times 26 = 2$$

الصيغة الإجمالية للأسيتيلين هي : C_2H_2

2- تمثيل لويس للجزئية :

الصيغة الإجمالية : C_2H_2		الجزئية
هيدوجين H	كربون C	العنصر
1	4	عدد الإلكترونات الخارجية



توجد في الجزيئة خمس أزواج رابطة ولا توجد أزواج غير رابطة (حرة)

$$n_t = \frac{4 \times 2 + 2 \times 1}{2} = 5$$

n_t عدد الأزواج الموجودة في الجزيئة هي كلها رابطة .

3-الشكل الفضائي للجزئية : جزيئة مستقيمية

4-معادلة تفاعل احتراق الاسيتيلين في ثنائي الأوكسيجين :

