

الفصل الثاني

## استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية





الوثيقة 1: تطبق الصخور الرسوبية

بعد تعريف الطبقات الرسوبيّة، حدد على الوثيقة مختلف الطبقات الرسوبيّة، ثم رقمها من الأقدم إلى الأحدث.

الوثيقة 2: المبادئ الاستراتيجية والتاريخ النسبي للتشكلات الجيولوجية .

- (1) أرخ نسبياً الطبقات C,B,A,...,I من العمود الاستراتيجي ①، ثم صنع مضمون مبدأ التراكم، وبين حدود استعمالاته الجيولوجية بالاعتماد على الشكل ② والشكل ③ من الوثيقة.
- (2) قارن بين الطبقتين A و B في المواقع 1 و 2 المتباعدتين ببعض كيلومترات (الشكل ④ من الوثيقة)، فيما تفيده نتائج هذه المقارنة بخصوص تاريخهما النسبي؟.
- (3) اقترح التاريخ النسبي للعناصر الجيولوجية الممثلة في الأشكال ⑤ و ⑥ و ⑦ من الوثيقة.



## الوثيقة 3: بعض أنواع المستحاثات :

اعتمادا على معطيات هذه الوثيقة، استخرج خاصية المستحاثة الاستراتيجية، واستنتج أهميتها في التقسيم الكرونولوجي.

التوزيع الطبقي Répartition stratigraphique										بعض أنواع المستحاثات الموجودة في السلسلة الفوساطية بأولاد عبادون	
الكريتاسي Crétacé					الإيوسين Eocène						
الثاني عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر	الحادي عشر		
					+	+	+				
						+	+				
							+				
							+				
							+				
								+			
									+		



Lamna-bia



Lamna-asc



Odontaspis



Corax



Enchodus



Rhombodus



Mosasaurus



Pseudaspi..



Ostrea


## الوثيقة 4: نعتبر نموذجين من المستحاثات :

✓ الشعب المرجانية Récifs coralliens: (الشكل أ) هي حيوانات بحرية ظهرت في الترياس (الحقب II)، وما زالت تعيش إلى حد الآن في بحر قليل العمق، بمياه ساخنة وغنية بـ  $\text{CO}_2$ .

✓ الأمونيت: Ammonites (الشكل ب) عبارة عن مستحاثات ظهرت في الترياس، عرفت انتشارا جغرافيا


كبيرا أثناء الجوراسي والكريتاسي. لكنها انقرضت في أواخر الحقب II.

قارن بين النموذجين من المستحاثات. بما يفيد كل نوع منها؟



## الوثيقة 5: مفهوم التشكيلة النمطية

يعطي الشكل أ من الوثيقة، التشكيل النمطي البليونيسي Pliensbachien .  
 الحد A به عقيدات فوسفاتية ومستحاثات من أعمار مختلفة مميزة لطبقات غائبة.  
 الحد B به حجر رملي وحديد سريري oolithique .  
 1) حدد أهمية التشكيلة النمطية في بناء السلم الاستراتيجي وتاريخ الطبقات.  
 2) تعرف خصيات حدود التشكيلة النمطية البليونيسي.  
 3) من خلال تحليل الشكل ب من الوثيقة، عرف الفجوة الاستراتيجية وأبرز مختلف أنماطها، وبين أهمية الفجوات الطبقات في معرفة حدود التشكيلة النمطية.




## الوثيقة 6: مفهوم الدورة الروسية .

يلخص الجدول التالي خصائص الطبقات الروسية بمنطقة معينة من المغرب.  
 أتمم ملء الجدول بوضع علامات X في الخانات المناسبة. ثم اربط هذه العلامات بخطوطه، ماذا تلاحظ؟

العمر	السحنة	الوسط		تراجم	تجاوز
		قاري	بحري		
نيوجين	رصيص بعظام وأسنان قوارض	X			
باليوجين وكريتاسي علوي	رمل، سجيل، رمل فوسفاتي		X		X
جوراسي وسيط	حجر رملي خشن ورصيص بعظام ديناصورات عاشبة				
جوراسي سفلي	كلس وسجل بأمونيت كلس مرجاني				
تربياس علوي	طين أحمر وحجر رملي خشن وجبس لاغوني				
باليوزوي علوي	رصيص بعظام زواحف وسرخسيات				
باليوزوي سفلي	حجر رملي خشن وسجل بثلاثية الفصوص				


## الوثيقة 7: الخصيات السخنية للدورة الرسوبية .

- اعتمادا على الشكل أ من الوثيقة استخرج الخصيات السخنية للمتالية التجاوزية.
- اعتمادا على الشكل ب من الوثيقة استخرج الخصيات السخنية للمتالية التراجعية.
- اعتمادا على الشكل ج من الوثيقة استخرج الخصيات السخنية للمتالية المميزة للدورة الرسوبية.




الشكل أ: الخصيات السخنية لتجاوز بحري :

.....  
.....  
.....




الشكل ب: الخصيات السخنية لتجاوز بحري :

.....  
.....  
.....



الشكل ج: الخصيات السخنية لدورة رسوبيه :


.....  
.....  
.....



## الوثيقة 8: مفهوم التنافس الجيولوجي .


تترسب الطبقات التجاوزية على طبقات القاعدة القديمة وفق تموصعين هندسيين أساسيين: الشكل أ والشكل ب.


قارن بين الحالتين ثم استخلص طبيعة الملامسات بين طبقات هذه المقاطع الجيولوجية.



الوثيقة 9: تقسيمات بيوبستراتيغرافية دقيقة بفضل الأمونيات داخل الطابق الطورسي .

المنطقة الإحيائية تقسيم جيوكرونولوجي داخل الطابق. ببر ذلك بالاعتماد على معطيات الوثيقة.




الأفاق	جزء من التشكيلة النمطية للطورسي	H.caterinii	H.tethyi	H.crassum	H.lusitanicum	H.apertum	H.bifrons	O.douvillei	H.semipolitum
XIII									
XII								++	
XI								+	
X							++		
IX				++	++	+	+		
VIII									
VII		+	++	+					
VI									+

- المنطقة الإحيائية : مجموعة من الطبقات المتتالية التي توجد بها مجموعة من المستحاثات والمعرفة بوفرة صنف معين من المستحاثات الاستراتيغرافية الذي يبقى ثابتاً من حيث خاصياته المميزة ويعطي للطباقة الإحيائية اسم هذه المستحاثة.

- الأمونيت: مجموعة من رأسيات الأرجل البحرية، تعيش في قوقة ويمكن أن يتجاوز قطرها المتر الواحد. ونميز بين مختلف أصناف الأمونيتات بواسطة بعض خصائص القوقة التي تعكس التطور السريع لهذه المجموعة مما يجعلها مستحاثات استراتيغرافية جيدة تستعمل في تحديد المناطق الإحيائية.

الوثيقة 10: نحو سلم استراتيغرافي للزمن الجيولوجي .

مكنت دراسات جيولوجية في أربع مناطق مختلفة من المغرب من تحديد بعض المستحاثات المتواجدة في هذه المناطق (الجدول أسفله )، وتوفير الأعمدة الاستراتيغرافية  $S_4, S_3, S_2, S_1$  .



العمود $S_4$ : منطقة أمصيلة بشمال تازة	العمود $S_3$ : منطقة أولماس	العمود $S_2$ : الحافة الجنوبية للأطلس المتوسط	العمود $S_1$ : السفوح الجنوبية الشرقي لأطلس الصغير الغربي
سجيل وكلس <b>Clypeaster-pecten</b>	بازلت من بركان مجاور	سجيل وكلس <b>Clypeaster-pecten</b>	شيست وحجر رملي كلسي <b>Phacops latifrons</b>
كلس سجيلي <b>Nummulites</b>	<b>Nummulites</b> كلس	طين أحمر جبسي بدون مستحاثات	شيست أسود <b>Dalmanite caudatum</b>
سجيل <b>Ammonite hoplites</b>	كلس وسجيل <b>Ammonite acanthoceras</b>	حجر رملي خشن وشيست <b>phillipsia gemmulifera</b>	شيست وحجر رملي خشن بحري <b>Trinucleus goldfussi</b>
كلس طيني <b>perisphinctes</b>	سجيل <b>Ammonite hoplites</b>	حجر رملي خشن كلسي وشيست <b>Phacops latifrons</b>	شيست <b>Paradoxides bohemicus</b>
كلس طيني <b>harpoceras</b>	كلس وسجيل <b>Ammonite harpoceras</b>	شيست <b>Dalmanites caudatum</b>	صخور متطبقة كلسية بدون مستحاثات
	طين أحمر جبسي بدون مستحاثات	حجر رملي خشن <b>Trinucleus goldfussi</b>	
	شيست جد مطوي <b>Trinucleus goldfussi</b>		

1) وظف المبادئ الاستراتيغرافية وقارن بين الأعمدة  $S_1$  و  $S_2$  و  $S_3$  و  $S_4$  . وضع الطبقات المتشابهة في نفس المستوى على جدول.

2) بين أن النتيجة التي حصلت عليها عبارة عن سلم استراتيغرافي مبسط.

الحقب Ere		النظام (الدور) Système (période)	الحقبة Epoque	الطباق Etage	العمر مليون سنة	
Phanérozoïque	Cénozoïque (سينوزوي)	Tertiaire (الثالث)	Néogène (النيوجين)	Holocène	-2	
				Pléistocène		
				Pliocène	Gélacien Plaisancien Zancléen	
				Miocène	Méssinien Tortonien Serravallien Langhien Burdigalien Aquitaniens	
				Oligocène	Chattien Rupélien	
			Paléogène (الباليوجين)	Eocène	Priabonien Bartonien Lutétien Yprésien	
				Paléocène	Thanétien Danien	
			Crétacé (الكريتاسي)	Supérieur	Maestrichien Campanien	
				Inférieur	-95	
				Malm	-140	
				Dogger	-160	
				Lias	-181	
Mésozoïque (الميزوزوي)	Mésozoïque (الميزوزوي)	Secondaire (الثاني)	Jurassique (الجوراسي)	Trias	-210	
				Permien	-245	
				Carbonifère	-290	
			Dévonien (الديفوني)	Dévonien	-360	
				Silurien	-410	
				Ordovicien	-440	
				Cambrien	-500	
				Protérozoïque	-590	
Cryptozoïque	Précambrien (ما قبل الكمبري)	Archéen		Archéen	-570	
					-2500	
					-4000	

## الوثيقة 12: الخريطة الجيولوجية .

الشكل أ: الإسقاط العمودي لثلاة ① على الخريطة ②.

الشكل ب: رموز وألوان تعبر عن عمر الطبقات الصخرية وترتيبها الزمني.

الشكل ج: رموز تمثل المعلومات الصخرية.

الشكل د: رموز اصطلاحية لتمثيل ميلان الطبقات الصخرية.

وظف المعطيات المقترحة وتعرف باستعمال خرائط جيولوجية جهوية أو محلية مختلف المعلومات والرموز، ثم أبرز أهمية المعلومات الاستراتيجية والتكتونية في بناء الخريطة الجيولوجية.

الشكل ب: تمثيل المعلومات الاستراتيجية

اللون	الرمز	النظام	الحقب
بيج	a,q,A...		الرابع
أصفر	p	البليوسين	الثالث
	m	الميوسين	
ليموني	g	الأوليوكوسين	الثاني
	e	الإيوسين	
أخضر فاتح	c	الكريتاسي العلوي	
	n	الكريتاسي السفلي	
أزرق	j	الجوراسي الأوسط والعلوي	
	l	الجوراسي السفلي	
وردي	t	التریاس	
بنفسجي	r	البرمي	
رمادي	h	النفحي	
بني	d	الديفوني	
أخضر قاتم	s	السيلوري	
	o	الأردوفيسى	
بيج داكن	b,k	الكمبri	
أحمر		قبل الكمبri	



الشكل ج: تمثيل المعلومات الصخرية

الصخور المقابلة	الرموز الصخرية
الكلس	
الدولوميت	
الطين	
السجيل	
الحجر الرملي	
الرصيص	
الملح	

الشكل د: تمثيل الطبقات المشوهة








الرمز	درجة الميلان
+	ميلان منعدم = طبقات أفقية
—	ميلان عمودي ( 90° ) = طبقات عمودية
↓	ميلان ضعيف ( 30° - 10° )
↓	ميلان متوسط ( 60° - 30° )
▽	ميلان قوي ( 80° - 60° )
▽	ميلان معكوس $\alpha > 90°$

## الوثيقة 14: تمثيل البنى التكتونية على الخرائط والمقاطع الجيولوجية .





الوثيقة 13: العلاقة الهندسية بين حالة الطبقات و منحنيات المستوى.

انطلاقا من معطيات هذه الوثيقة حدد علاقة حدود الطبقات بمنحنيات المستوى.



## الوثيقة 16: تمرن تطبيقي .

- 1) لاحظ الخريطة الجيولوجية الممثلة أمامه وحدد الطبقات الأحدث والطبقات الأقدم (بالنظر إلى الترتيب الوارد في المفتاح ).
- 2) حدد البنية التي تظهر في المنطقة.
- 3) أنجز المقطع الجيولوجي AB.




## الوثيقة 17: استرداد التاريخ الجيولوجي لهضبة الفوسفات

تمثل السلسلة الفوسفاتية لأولاد عبden آخر جزء من سلسلة رسوبية تكونت فوق القاعدة الصخرية القديمة (الحقب الأول). وقد تعرضت الطبقات المكونة لهذه القاعدة الصخرية لتشوهات في آخر الحقب الأول على شكل طيات وفوالق، بينما لم تتعرض طبقات الحقب الثاني لأي تشوّه وبقيت منضدية.

نعطي أهم مراحل التاريخ الجيولوجي غير مرتبة:

- 1) تشوّه طبقات القاعدة الصخرية (الدورة الهرسنية).
- 2) ترسب طبقات القاعدة الصخرية (الحقب الأول).
- 3) تجاوز بحري.
- 4) تراجع بحري بعد لوتسبي.
- 5) تراجع بحري (الحقب الأول).
- 6) حت.
- 7) ترسب طبقات الكريتاسي قبل فوسفاتي.
- 8) ترسب السلسلة الفوسفاتية.
- 9) ترسب الطبقات الحديثة (نيوجين الرابع) وحت حديث.




نيوجين ورابع (رواسب قارية)  
السلسلة الفوسفاتية (مايستريختي إلى اللوتسبي) اللوتسبي بعد فوسفاتي (رواسب بحرية)  
كريتاسي قبل فوسفاتي (رواسب بحرية)  
القاعدة الصخرية (الحقب الأول)  
فالق

بعد تحديد نوع الملامسة بين السلسلة قبل فوسفاتية والقاعدة الصخرية، استرداد التاريخ النسبي لهضبة الفوسفات وذلك بترتيب المراحل من 1 إلى 9.


## الوثيقة 18: استرداد التاريخ الجيولوجي للحوض الفحمي لجرادة .

يقع حوض جرادة على بعد 60 كم جنوب غرب مدينة وجدة. ويمتد الحوض على مدى 25 كم، وهو منجم للفحم الحجري ذو أصل تربسي يظهر تواли التربسات البحرية والقارية المناسبة لتكون الفحم، وذلك ما بين -300Ma إلى 315Ma.



- مفتاح: 1 = سلسلة بحرية تحتوي على غونياتيت Goniatite (الحقب الأول).  
 2 = أول رواسب شاطئية تحتوي على فحم وسرخسيات Fougères (الحقب الأول، ويستفالي).  
 3 = رواسب بحرية تحتوي على غونياتيت (الحقب الأول، أحدث من السلسلة 1).  
 4 = سلسلة فحمية مع طبقات جرادة (الحقب الأول، ويستفالي، أحدث من المستويات 2).  
 ملحوظة: تغطي الطبقات الكلسية للجوراسي كل هذه الطبقات بتناور أعظم.

يتطلب تكون الفحم الحجري مناطق رسوبية تتميز بكثافة الغطاء النباتي (مناخ مداري)، وإمدادات قارية ضعيفة: مستنقعات شاطئية معرضة لتجاوزات بحرية دورية. كما يتطلب أيضا الانغراز السريع لقعر الحوض الذي يحمي البقايا من الأكسدة. انظر الصورة أسفله.



وظف المعطيات الواردة في الوثيقة لاسترداد التاريخ الجيولوجي لحوض جرادة.