




الفصل الثاني: تنظيم الضغط الشرياني والحفاظ على التوازن المائي المعدني

الوثيقة 1: القياس المباشر للضغط الشرياني La pression artérielle

★ في سنة 1732 قطع الباحث الانجليزي Stephen Hales الشريان الفخذي لأنثى فرس ملقأة على ظهرها، ثم أوصل جزء الشريان المتصل بالقلب بأنبوب عمودي طوله 3 m، فلاحظ ارتفاع الدم في الأنبوب إلى مستوى 2.7m

1) ماذا يمكنك استنتاجه من هذه الملاحظة؟


★ يبين الشكل أ طريقة القياس المباشر للضغط الشرياني عند الكلب، والشكل ب نتائج هذا القياس المباشر.



★ يعطي الشكل ج نتائج قياس الضغط الشرياني داخل الشريان الأبهري L'artère Aorte عند الإنسان عن طريق القسطرة Cathétérisme (إدخال مجس في الأبهري)

2) من خلال تسجيلات الشكلين ب وج فسر تغيرات الضغط الشرياني الملاحظة.

الوثيقة 2: القياس غير المباشر للضغط الشرياني بواسطة الساعدة المطاطية Brassard




عند الإنسان يتم القياس غير المباشر للضغط الشرياني على مستوى الشريان العضدي بواسطة الساعدة والمسامع (الشكل أ). ويتم ذلك في ثلاثة مراحل:

★ المرحلة ①: تنفس الساعدة بواسطة اجاصة مطاطية ضاغطة للهواء إلى أن يتوقف جريان الدم في الشريان العضدي، وتحتني بذلك كل الأصوات في المسماع.


★ المرحلة ②: تفرغ الساعدة المطاطية تدريجياً من الهواء حتى سماع الأصوات المصاحبة لعودة جريان الدم، حينئذ نقرأ الضغط الشرياني القصوي مباشرة على مقياس الضغط Manomètre.

★ المرحلة ③: نستمر في إفراغ الساعدة إلى أن تختفي الأصوات نهائياً فيشير مقياس الضغط آنذاك إلى قيمة الضغط الشرياني الديني.



اعتماداً على معلومات الوثيقة صف قياس الضغط الشرياني بواسطة الساعدة والمسامع، مع تفسير نتائج كل مرحلة. أجز المراولة على أح 7D التلاميذ واستنتاج مجال تغير الضغط الشرياني عنده.



الوثيقة 3: تغيرات الضغط الشرياني



- ★ الشكل أ: هو رسم تخطيطي مبسط للدورتان الدمويتان الصغرى والكبرى.
- ★ الشكل ب: تمثل للضغط الشرياني في مختلف الأوعية الدموية للدورة العامة.
- ★ يعطى الجدول التالي القيم العادية للضغط الشرياني عند الإنسان حسب العمر:


العمر بالسنوات	الحدود القصوى للقيم العادية للضغط ب (cmHg)	القيم القصوى للضغط
من 4 إلى 16	ما بين 8 و 10.5	ما بين 10.5 و 13
من 16 إلى 30	8	13
من 30 إلى 50	ما بين 9 و 9.5	ما بين 14.5 و 15.5
من 50 وما فوق	ما بين 10 و 10.5	ما بين 16.5 و 17.5

- ★ الشكل ج: تمثل لتغيرات الضغط الشرياني عند إنسان بالغ خلال 24 ساعة. من خلال تحليل معطيات هذه الوثائق استنتج العوامل المؤثرة في الضغط الشرياني.




الوثيقة 4: العلاقة بين الضغط الشرياني ونشاط القلب

- ★ نسجل بانتظام عند شخص تردد القلب FC وصبيب القلب Q (حجم الدم الذي يمر من القلب خلال دقيقة واحدة)، والمزنة الانقباضية VS (حجم الدم المدفوع من قبل البطين في كل انقباض)، والضغط الشرياني PA. وذلك في حالة راحة متبوعة بتمرين عضلي ذو شدة معتدلة وثابتة خلال عدة دقائق، والعودة لحالة الراحة. تتحول النتائج المحصلة إلى سلسلة من البيانات هي الممثلة على الشكل أ.




- ★ يعطي الشكل ب تغيرات متوسط الضغط الشرياني اثر نزف دموي.
- ★ يعطي الشكل ج تغيرات الضغط الشرياني حسب تغيرات الصبيب الدموي وقطر الشريانات: a: حالة عادية، b: حالة تضيق قطر الشريانات، c: حالة تمدد قطر الشريانات.

- 1) حل المنحنيات واربط العلاقة بين نشاط القلب وتغير الضغط الشرياني.
- 2) انطلاقاً من تحليل معطيات الوثيقة وضح أن الضغط الشرياني عامل بيولوجي ثابت.




الوثيقة 5: الكشف عن مستقبلات الضغط الشريانى



للكشف عن مناطق رصد تغيرات الضغط الشريانى نقوم بالتجارب التالية: يعطي الشكل أ من الوثيقة رسم تخطيطي لتعصيب الشرايين المرتبطة بالقلب.

★ التجربة 1: عند قطع الأعصاب القلبية التي تربط القلب بالمراکز العصبية عند كلب ونجره على الجري، يلاحظ انه يسقط منها خلاً وقت وجيز ويبيى إيقاع قلبه ثابتًا.

★ التجربة 2: بعد عزل الجيب السباتي عند حيوان بواسطة رابطات (الشكل ب) تم حقن سائل فيزيولوجي في المنطقة المعزولة للرفع من الضغط بداخلاً، فللحظ انخفاض في كل من التردد القلبي والضغط الشريانى في الجهاز الدورانى للحيوان.




★ التجربة 3: يؤدي ربط الشريانين السباتيين أسفل الجيب السباتي بواسطة ملقط (الشكل ب) إلى انخفاض الضغط في هذه المنطقة يتربى عليه تسارع في إيقاع القلب وارتفاع في الضغط الشريانى في الجهاز الدورانى للحيوان.

★ التجربة 4: تحتوي منطقة الجيب السباتي على نهايات عصبية تعصب الطبقة العضلية لجدار الشريان. يؤدي تهيج هذه الألياف العصبية إلى تباعي تردد القلب. ويؤدي قطعها إلى تسرع تردد القلب. ولا ينتج عن تهيج الطرف المحيطي أي تأثير بينما يتربى على تهيج الطرف المركزي تباعي لتردد القلب.

حل المعطيات التجريبية وفسر دور الجيب السباتي واستنتج المعلومات التي تمكن من إبراز وجود مستقبلات الضغط في هذا الجيب السباتي.

الوثيقة 6: دور الانعكاسات العصبية في تنظيم الضغط الشريانى



للقلب تعصيب مزدوج ينتمي للجهاز العصبي الاعاشي Végétatif الشكل أ (= تسمى ذاتية وتوجد خارج الجهاز العصبي المركزي):

- ألياف عصبية لا ودية Parasympathique تتمرکز أجسامها الخلوية بالبصلة السيسائية Bulbe rachidien. (عصب بصلى)
- ألياف عصبية ودية Orthosympathique تتمرکز أجسامها الخلوية بعقد نجمية ترتبط بالمركز النخاعي.

للكشف عن دور هذه المراكز والأعصاب الودية والأعصاب اللاودية في تنظيم الضغط الشريانى نقترح التجارب التالية:

★ تحديد دور المراكز العصبية والأعصاب في تنظيم الضغط الشريانى:

نتائج تخريبها أو قطعها	نتائج تهيجها	البنية
- ارتفاع تردد القلب. - ارتفاع الضغط الشريانى.	- انخفاض تردد القلب. - توسيع الشرايين. - انخفاض الضغط الشريانى.	البصلة السيسائية البطنية
- انخفاض تردد القلب. - انخفاض الضغط الشريانى.	- ارتفاع تردد القلب. - تضيق الشرايين. - ارتفاع الضغط الشريانى.	البصلة السيسائية الجانبيه والنخاع الشوكي
- ارتفاع تردد القلب. - ارتفاع الضغط الشريانى.	- انخفاض تردد القلب. - انخفاض الضغط الشريانى.	اللاودي: العصب X.
- انخفاض تردد القلب. - انخفاض الضغط الشريانى.	- ارتفاع تردد القلب. - ارتفاع الضغط الشريانى.	الودي: العصب القلبي الودي المحرك

(1) حل المعطيات التجريبية واستنتج المراكز العصبية والأعصاب المتدخلة في تنظيم الضغط الشريانى مبينا دورها.

★ النشاط العصبي للألياف العصبية المرتبطة بالقلب وعلاقتها بنشاط القلب والأوعية الدموية.


ضغط مرتفع	ضغط عادي	ضغط منخفض	الضغط الشريانی ب mmHg
mmHg			
			رسالة عصبية موردة نحو القلب (العصب المبهم)
			رسالة عصبية موردة نحو القلب (العصب الودي)
			تردد القلب (bat/min)
			رسالة عصبية متوجهة نحو الأوعية الدموية (العصب الودي)
			مقاومة الأوعية الدموية

نقوم بتسجيل السيالات العصبية في الألياف العصبية المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية عند حيوان ثديي، اثر تغيرات الضغط الشريانی، كما نحدد تغيرات تردد القلب ومقاومة الأوعية الدموية.

النتائج مدونة على الجدول أمامه:
(2) بين كيف تؤثر تغيرات الضغط الشريانی على نشاط مختلف المسالك العصبية.

(3) بالاعتماد على كل المعطيات السابقة وضح كيف يتدخل الجهاز العصبي في تنظيم الضغط الشريانی.

الوثيقة 7: دور الكاتيكولامينات في تنظيم الضغط الشريانی





الأدرينالين **noradrénaline** والنورادرينالين **adrénaline** هرمونين ينتميان إلى مجموعة الكاتيكولامينات **catécholamines**، يفرزهما لب الغدة الكظرية في الدم، تحت تأثير الجهاز العصبي الودي.

★ يعطي الشكل أ رسم تخطيطي لمقطع للغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية. وتكون من جزء خارجي (①) يسمى قشرة الكظر **Corticosurrénale**، وجزء مركري (②) يدعى لب الكظر **Medullosurrénale**.

★ ببینت تجارب أنجرت على حيوانات أن الانفعال يحدث ارتفاعاً مفاجئاً لإفراز مادة الأدرينالين من لدن غدة الكظر. وبيين الشكل ب من الوثيقة تسجيلات تردد القلب والضغط الشريانی وكمية الكاتيكولامينات البلازمية عند الإنسان في حالة الانفعال.

★ بعد حقن الأدرينالين أو النورادرينالين لكلب سليم، نتتبع تغيرات الضغط الشريانی. النتائج المحصل عليها مماثلة على الشكل ج من الوثيقة.




انطلاقاً من تحليل معطيات الوثيقة حدد تأثير الكاتيكولامينات (الأدرينالين مثلاً) على نشاط القلب، والآلية تدخلها في تنظيم الضغط الشريانی.

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

الوثيقة 8: دور نظام الرينين - أنجيوتانسين في تنظيم الضغط الشرياني

تركيز الرينين في البلازما ب UA		
شخص شاهد	شخص مريض كلية يسرى	كلية يمنى
4	6	6
5	12	6

الشكل أ



الشكل ب

★ لوحظ عند شخص مصاب بفرط الضغط الشرياني انغلق جزئي للشريان الكلوي الأيسر نتج عنه انخفاض كبير للضغط الدموي في الكلية اليسرى مصحوب بارتفاع مهم للضغط في الكلية اليمنى. يبين الجدول أمامه قياس تركيز الرينين (أنزيم تفرزه الكلية) في الدم الداخل والدم الخارج من كل كلية

★ الأنجيوتانسين Angiotensine بروتين يفرز من طرف بعض الخلايا الكبدية على شكل بشير خامل يدعى الأنجيوتانسينوجين.

يوجد هذا الأخير في البلازما بصفة دائمة، ولا يتحول إلى هرمون نشيط إلا بتواجد أنزيم الرينين Rénine المفرز من طرف الكليتين. خضع شخص عادي لتروية مطولة (عدة أيام) بالأنجيوتانسين، وتم عنده تتبع تغير قيمة الضغط الشرياني، ويلخص الشكل ب من الوثيقة النتائج المحصل عليها.

1) حل هذه الملاحظات السريرية، والمعطيات التجريبية واستنتاج الآلية المتحكمة في إفراز الرينين وعلاقة هذا الأخير بتنظيم الضغط الشرياني.

بعد استئصال الغدتين الكظريتين وإحدى كليتين كلب، وقطع الأعصاب المرتبطة بالكلية المتبقية، تم تتبع كل من كمية الرينين المفرزة من طرف الكلية المتبقية، وتغير الضغط الشرياني داخلها حسب الزمن قبل وبعد خضوع هذا الكلب لنزف دموي. يمثل مبيان الشكل ج من الوثيقة النتائج المحصل عليها.

2) انطلاقا من تحليل هذه المعطيات التجريبية حدد العامل المسؤول عن تنظيم إفراز الرينين من طرف الكلية.

الوثيقة 9: دور هرمون الألدوستيرون في تنظيم الضغط الشرياني

★ ينتج عن ورم في الغدة الكظرية فرط في الضغط الشرياني بسبب احتفاظ الجسم بكميات كبيرة من Na^+ ، وبالتالي الاحتفاظ بالماء، في حين يؤدي ضمور هذه الغدة، عند بعض المرضى، إلى انخفاض الضغط الشرياني الناتج عن طرح كميات كبيرة من Na^+ في البول، وبالتالي فقدان كميات مهمة من الماء.


★ يؤدي حقن حيوان مستأصل الغدة الكظرية بمستخلصات قشرة الكظر إلى انخفاض كبير في طرح Na^+ في البول، وقد بينت التحاليل أن المادة النشطة في المستخلصات هي هرمون الألدوستيرون Aldostérone.

★ لوحظ عند حيوان ثديي خضع لنظام غذائي بدون Na^+ فرط في إفراز الألدوستيرون، وبالمقابل يسبب النظام الغذائي الغني بملح الطعام انخفاض في إفراز هذا الهرمون.

★ عند تروية الغدة الكظرية بمحاليل ذات تركيز ضعيف أو كبير ل $NaCl$ لا يلاحظ أي تغيير في إفراز الألدوستيرون. وعند تروية الشرين المورد للكببية بمحلول $NaCl$ المخفف يسبب إفراز الرينين المتبع بإفراز الألدوستيرون.

★ تتبع عند كلب مستأصل الكليتين تغير إفراز الألدوستيرون من طرف قشرة الغدة الكظرية بعد حقن الأنجيوتانسين. يمثل المبيان أمامه النتائج المحصل عليها.


حل المعطيات السريرية والتجريبية واستنتاج آلية إفراز ودور الألدوستيرون في تنظيم الضغط الشرياني.



★ قصد الكشف عن دور هرمون ADH (Antidiuritique) هرمون مضاد الابالة في تنظيم الضغط الشرياني، أجري عند كلب قياس كل من تركيز ADH وحجم البول المطروح، وبين الشكلان أ وب النتائج المحصل عليها.

- الشكل أ: تغير تركيز هرمون ADH في الدم بدلالة تغير نسبة حجم الدم.
 - الشكل ب: تغير الاباللة على اثر الحقن الضموريدي بهرمون ADH.

★ قصد الكشف عن مصدر هرمون ADH وعن مراحل تدخله في تنظيم الضغط الشرياني، تم عند الكلب، القيام بالتجارب الممثلة في الجدول التالي:



التجربة	النتائج
اهاجة المنطقة S من الوطاء (مركز اندماجي)	- انخفاض طرح البول. - ارتفاع نسبة ADH في الدم الوريدي للنخامية.
قطع الألياف في مستوى C ثم تهبيج المنطقة S	- ارتفاع طرح البول. - انعدام ADH في الدم الوريدي للنخامية.
استتصال النخامية الخلفية	- ارتفاع حجم البول المطروح
عزل الكلية وحقتها بمستخلصات النخامية الخلفية	- نقص في حجم البول المطروح.

انطلاقاً من تحليك لمعطيات الوثيقة:

- أبرز العلاقة الموجودة بين تركيز **ADH** وتغيير حجم الدم. ثم حدد تأثير حقن **ADH** على حجم البول المطروح.
 - حدد مصدر **ADH** والبنية الشراحية المتدخلة في تنظيم حجم البول المطروح.
 - استنتج دور **ADH** في تنظيم الضغط الشرياني.