

Angles orientés mesurés en radian

- Le **radian** est une unité d'angle définie comme l'arc entre deux points du cercle unité de longueur 1.
- L'**angle** (\vec{u}, \vec{v}) est orienté de \vec{u} vers \vec{v} .

On a les relations suivantes :

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) \text{ relation de Chasles}$$


$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) \text{ et } (-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi$$

- Soit θ_1 et θ_2 **deux mesures** d'un même angle (\vec{u}, \vec{v}) :

$$\exists k \in \mathbb{R}, \theta_2 = \theta_1 + k2\pi \Leftrightarrow \theta_2 = \theta_1 [2\pi]$$

- θ **mesure principale** d'un angle (\vec{u}, \vec{v}) si $\theta \in]-\pi; \pi]$

| α | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\sin \alpha$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 |
| $\cos \alpha$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 |
| $\tan \alpha$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | ∞ |



Lignes trigonométriques

Dans le cercle unité, α est l'angle orienté :

$$\cos \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (Ox)$$


$$= OA$$

$$\sin \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (Oy)$$

$$= OB$$

$$\tan \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (T)$$

$$= IC$$



Angles orientés et trigonométrie

Relations fondamentales

- $-1 \leq \cos \alpha \leq 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- $-1 \leq \sin \alpha \leq 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \forall \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Formules d'addition

Soient a et b deux angles quelconques :

- Avec cosinus on « ne panache pas » :
 $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
 $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- Avec sinus on « panache » :
 $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
 $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

Tableau de signes de cosinus et sinus

| | |
|----------------------|----------------------|
| $\cos \theta \leq 0$ | $\cos \theta \geq 0$ |
| $\sin \theta \geq 0$ | $\sin \theta \geq 0$ |
| $\cos \theta \leq 0$ | $\cos \theta \geq 0$ |
| $\sin \theta \leq 0$ | $\sin \theta \leq 0$ |

Formules de duplication et de linéarisation


1) Formule de duplication :

- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$
 $= 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$
- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$

2) Formules de linéarisation

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Symétries et compléments



Exemple d'application

Soit $A = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{9\pi}{14} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos \frac{23\pi}{14}$. Montrer que $A = 0$

$$\begin{aligned}
 A &= \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{9\pi}{14} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos -\frac{5\pi}{14} \quad \text{car } \frac{23\pi}{14} = -\frac{5\pi}{14} [2\pi] \\
 &= \cos \frac{\pi}{7} + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{7}\right) + \cos \left(\pi + \frac{\pi}{7}\right) + \cos \frac{5\pi}{14} \\
 &= \cos \frac{\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7} + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) \\
 &= -\sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{\pi}{7} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Applications des formules

- **Relations fondamentales :** Sachant que $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, calculer $\sin \frac{\pi}{5}$

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \frac{5+2\sqrt{5}+1}{16} = \frac{10-2\sqrt{5}}{16} \quad \cos \frac{\pi}{5} > 0$$

$$\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

- **Formules d'addition :**

$$\begin{aligned}
 \cos \frac{7\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}
 \end{aligned}$$

- **Formules de linéarisation :**

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad \cos \frac{\pi}{8} > 0 \quad \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \quad \cos \frac{\pi}{8} > 0 \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

Figure donnant les formules d'addition de cosinus et sinus

- On trace un cercle \mathcal{C} de centre O et de rayon 1.
- On repère le rayon [OA] par rapport à la droite (OI) par les angles x et y .
- Le point A se projette orthogonalement en H sur la droite (OI).
- Le point A se projette orthogonalement en B sur la droite formant un angle y avec (OI).
- Le point B se projette orthogonalement en C sur la droite (OI).
- Le point A se projette orthogonalement en D sur la droite (CB). On a alors : $\widehat{ABD} = y$.

Sachant que cosinus est la projection orthogonale sur l'axe horizontal et sinus sur l'axe vertical, on obtient la figure suivante :

