

# 2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية

سلسلة رقم

تمارين : المجموعات والتطبيقات

من طرف التلاميذ : هند غريبي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلجان - حمروأوي عبد السلام



الصفحة

.OK

1

نحدد المجموعة E :

$$E = \{y \in \mathbb{R} / \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2xy + y^4 = 0\}$$

المجموعة E عناصرها y من

حيث يجب أن نجد x من  $\mathbb{R}$  حيث: 0

$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2xy + y^4 = 0$  لهذا نحل المعادلة: (y  $\in \mathbb{R}$ )

نحسب مميز المعادلة:

$$\Delta = 4y^2 - 4y^4$$

$$= 4y^2(1 - y^2)$$

جدول إشارة Δ

y	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$4y^2$	+	+	0	+	+
$1 - y^2$	-	0	+	0	-
$4y^2(1 - y^2)$	-	+	+	0	-

حسب الجدول:  $\Delta \geq 0$  على المجال [-1,1]

E = [-1,1] و منه:

نحسب: 2.

$$\begin{aligned} ((\overline{A \cap B}) \cap (\overline{A \cap C})) \cup A &= A \cup ((\overline{A} \cup B) \cap (\overline{A} \cup C)) A \\ ((\overline{A \cap B}) \cap (\overline{A \cap C})) \cup A &= ((\overline{A} \cup B) \cap (\overline{A} \cup C)) \cup A \\ &= ((\overline{A} \cup B) \cup A) \cap ((\overline{A} \cup C) \cup A) \\ &= (\overline{A} \cup B \cup A) \cap (\overline{A} \cup C \cup A) \\ &= (E \cup B) \cap (E \cup C) ; (\overline{X} \cup X = E) \\ &= E \cap E ; (E \cup X = E) \\ &= E \end{aligned}$$

وبالتالي:  $((\overline{A \cap B}) \cap (\overline{A \cap C})) \cup A = E$

نعطي مثال مضاد على أن الاستلزم غير صحيح:

حيث: A و B و C أجزاء من E  $C \subset A \cup B \Rightarrow C \subset A \subset C \subset B$

نأخذ: A = {1,2,3,4} و B = {4,5,6,7} و C = {3,4,5,7}

لدينا: C ⊂ A ∪ B و لكن: C ⊂ A و C ⊂ B

ومنه: C ⊂ A ∪ B  $\Rightarrow C \subset A \subset B$  عبارة خاطئة

3. نبين أن: P(E) ∪ P(F) ⊂ P(E ∪ F)

# 2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية

سلسلة رقم

تمارين : المجموعات و التطبيقات



الصفحة

من طرف التلاميذ : هند غربي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلات - حمروأوي عبد السلام

ليكن  $X$  من  $(1) : P(E) \cup P(F)$

$$(1) \Rightarrow X \in P(E) \text{ او } X \in P(F)$$

$$\Rightarrow X \subset E \text{ او } X \subset F$$

$$\Rightarrow X \subset E \cup F$$

$$\Rightarrow X \in P(E \cup F)$$

اذن:  $X \in P(E) \cup P(F) \Rightarrow X \in P(E \cup F)$

**خلاصة :**  $P(E) \cup P(F) \subset P(E \cup F)$

مثال مضاد:

$$\text{ليكن: } P(E) = \{\emptyset, \{1\}\} \text{ اذن: } E = \{1\}$$

$$P(F) = \{\emptyset, \{2\}\} \text{ اذن: } F = \{2\}$$

$$P(E \cup F) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \text{ و نعلم ان: }$$

$$P(E) \cup P(F) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$$

ومنه:  $P(E \cup F) \not\subset P(E) \cup P(F)$

4. نبين ان:  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

لتكن:  $A$  و  $B$  و  $C$  أجزاء من

$$\text{ لدينا: } A \setminus (B \cap C) = A \cap (\overline{B \cap C})$$

$$= A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})$$

$$= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C})$$

$$= (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

• خلاصة :  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

5. نبين ان:  $A \Delta B = A \Delta C \Leftrightarrow B = C$

✓ نبين ان:  $B = C \Rightarrow A \Delta B = A \Delta C$

هو صحيح لأن:  $A \Delta B = A \Delta C$

✓ نبين ان:  $A \Delta B = A \Delta C \Leftrightarrow B = C$

نبين ان:  $B \subset C$

ليكن  $x$  من  $B$  ونبين ان:  $x \in C$

❖ حالة (1) :  $x \in A$

لدينا:  $x \in B$  اذن:  $x \in (A \cap B)$  ومنه:  $x \notin A \Delta B$  اذن:  $x \notin A \Delta C$  لان:  $x \in (A \cap B)$

بما أن:  $x \in C$  و  $x \notin A \Delta C$  فلن:  $x \in A \Delta C$  اذن:  $x \in A \Delta B$

وبالتالي:  $x \in B \Rightarrow x \in C$

• خلاصة (1) :  $B \subset C \Leftrightarrow A \Delta B = A \Delta C$

❖ حالة (2) :  $x \in B \setminus A$  و  $x \in C$  اذن:  $x \in B \setminus A$

اذن:  $x \in A \Delta B$

ومنه  $x \in A \Delta C$  لان:  $x \in B \setminus A$

نعلم ان:  $x \in B \Rightarrow x \in C$  اذن:  $x \in A \Delta C$  و منه  $x \in A \Delta B$

• خلاصة (2) :  $B \subset C \Leftrightarrow A \Delta B = A \Delta C$

خلاصة : في كلتا الحالتين  $B \subset C$

وبنفس الطريقة نبين ان  $C \subset B$

**خلاصة :**  $A \Delta B = A \Delta C \Rightarrow B = C$

2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية



الصفحة

## تمارين : المجموعات و التطبيقات

سلسلة رقم

من طرف التلاميذ : هند غربي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلات - حمروأوي عبد السلام

$$\bullet \quad \text{خلاصة عامة : } A\Delta B = A\Delta C \Leftrightarrow B = C$$

.02

1. أ - نبين أن :  $f$  تبانية من  $E$  إلى  $F$ .لها نبين ان :  $\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ ليكن  $x$  و  $x'$  من  $E$  حيث . (1)  $f(x) = f(x')$ 

و منه :

$$(1) \Rightarrow g(f(x)) = g(f(x'))$$

$$\Rightarrow g \circ f(x) = g \circ f(x')$$

( لأن  $g \circ f$  تبانية ) .

$$\Rightarrow x = x'$$

وبالتالي  $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ خلاصة :  $f$  تبانية من  $E$  إلى  $F$ .ب - نبين أن : (  $g$  تبانية )  $\Rightarrow (f$  شمولية و  $g \circ f$  تبانية ) .نبين أن :  $g$  تبانية من  $F$  إلى  $G$ .لها نبين ان :  $\forall y, y' \in F, g(y) = g(y') \Rightarrow y = y'$ ليكن  $y$  و  $y'$  من  $F$  حيث . (1)  $g(y) = g(y')$ نعلم أن  $f$  شمولية من  $E$  إلى  $F$  إذن : يوجد  $x$  و  $x'$  من  $E$  حيث  $(1) y' = f(x)$  و  $y = f(x')$ 

$$(1) \Rightarrow g(f(x)) = g(f(x'))$$

$$\Rightarrow g \circ f(x) = g \circ f(x')$$

( لأن  $g \circ f$  تبانية ) .

$$\Rightarrow x = x'$$

( لأن  $f$  تطبيق ) .

$$\Rightarrow f(x) = f(x')$$

$$\Rightarrow y = y'$$

وبالتالي  $g(y) = g(y') \Rightarrow y = y'$ خلاصة :  $g$  تبانية من  $F$  إلى  $G$ .2. نبين أن : (  $f$  تطبيق تباني )  $\Leftrightarrow (f$  تطبيق شمولي ) .أ - نبين أن : (  $f$  تطبيق شمولي )  $\Rightarrow (f$  تطبيق تباني )لها نبين :  $\forall y \in E, \exists x \in E / y = f(x)$ ليكن  $y$  من  $E$ .لدينا :  $f \circ f \circ f(y) = f(y) \Rightarrow f(f \circ f(y)) = f(y)$ ( لأن  $f$  تطبيق تباني )

$$\Rightarrow f \circ f(y) = y$$

$$\Rightarrow f(f(y)) = y$$

إذن يوجد سابق ل  $y$  هو  $f(x)$ خلاصة 1 :  $f$  تطبيق شمولي.ب - نبين أن : (  $f$  تطبيق تباني )  $\Rightarrow (f$  تطبيق شمولي ) .

2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية

سلسلة رقم

تمارين : المجموعات و التطبيقات



الصفحة

من طرف التلاميذ : هند غربي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلات - حمروأوي عبد السلام

نبين أن :  $f$  تبانية من  $E$  إلى  $E$ .

$$\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

ليكن  $x$  و  $x'$  من  $E$  حيث  $f(x) = f(x')$ (2)  $f(x_1) = x$  و  $f(x_1) = x'$  من  $E$  حيث  $x = x'$ 

$$\text{ومنه : } (f \circ f)(f(x_1)) = (f \circ f)(f(x_1'))$$

$$(نركب بالتطبيق f \circ f) \Rightarrow (f \circ f) \circ f(x_1) = (f \circ f) \circ f(x_1')$$

$$(لأن مركب التطبيقات تجمعي) \Rightarrow f \circ f \circ f(x_1) = f \circ f \circ f(x_1')$$

$$(f \circ f \circ f = f) \Rightarrow f(x_1) = f(x_1')$$

$$(حسب (2)) \Rightarrow x = x'$$

خلاصة 2 :  $f$  تطبيق تبانيخلاصة :  $f$  تطبيق تباني  $\Leftrightarrow f$  تطبيق شمولي .3. نبين أن :  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ ليكن :  $y \in f(f^{-1}(B))$ 

$$. y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B) / f(x) = y$$

بما أن :  $x \in f^{-1}(B)$  إذن  $x \in B$  أي  $f(x) \in B$ خلاصة :  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ 4. بين أن : إذا كان  $g \circ f_1 = g \circ f_2$  و  $g$  تطبيق تباني فإن  $f_1 = f_2$ نبين أن :  $f_1 = f_2$ - لدينا :  $f_1$  و  $f_2$  تطبيقات من  $E$  إلى  $F$  إذن لهما نفس مجموعة الانطلاق وكذلك نفس مجموعة الوصول .- نبين أن :  $\forall x \in E, f_1(x) = f_2(x)$ ليكن  $x$  من  $E$ لدينا :  $g \circ f_1(x) = g \circ f_2(x)$  (حسب المعطيات)ومنه :  $g(f_1(x)) = g(f_2(x))$ إذن :  $f_1(x) = f_2(x)$  ( لأن  $g$  تباني )خلاصة :  $f_1 = f_2$ 5. نبين أن :  $g_1 = g_2 \circ f \Rightarrow g_1 = g_2$  و  $f$  تطبيق شمولي .نبين أن :  $g_1 = g_2$ - لدينا :  $g_1$  و  $g_2$  تطبيقات من  $F$  إلى  $G$  إذن لهما نفس مجموعة الانطلاق وكذلك نفس مجموعة الوصول .- نبين أن :  $\forall y \in F, g_1(y) = g_2(y)$ ليكن  $y$  من  $F$ نعلم أن :  $f$  شمولية ومنه :  $\forall y \in F, \exists x \in E / y = f(x)$  . نضع  $(1) : y = f(x)$ ومنه :  $(1) \Rightarrow g_1(y) = g_1(f(x))$  (نركب بالدالة  $g_1$ )

2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية



الصفحة

سلسلة رقم

تمارين : المجموعات و التطبيقات

من طرف التلاميذ : هند غريبي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلات - حمروأوي عبد السلام

$$\Rightarrow g_1(y) = g_1 \circ f(x) = g_1 \circ f(x)$$

( حسب المعطيات )

$$\Rightarrow g_1(y) = g_2(y)$$

• خلاصة :  $g_1 = g_2$ 

.03

1. نبين أن  $f$  ليس تباعيبما أن الجمع و الضرب تبادليان فإن:  $(x+y, xy)$  و  $(y,x)$  لهما نفس الصورةو منه:  $f$  ليس تباعي2. الشرط الضروري والكافي لكي يكون الزوج  $(s,p)$  من  $\mathbb{R}^2$  ينتمي إلى  $f(\mathbb{R}^2)$ لدينا:  $(s,p) \in \mathbb{R}^2 / (s,p) \in f(\mathbb{R}^2)$ 

$$(s,p) \in \mathbb{R}^2 / (s,p) \in f(\mathbb{R}^2) \Leftrightarrow (s,p) \in \mathbb{R}^2; \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2 / f(x,y) = (s,p)$$

$$\Leftrightarrow (s,p) \in \mathbb{R}^2; \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2 / f(x+y, xy) = (s,p)$$

$$\Leftrightarrow (s,p) \in \mathbb{R}^2; \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x+y = s \\ xy = p \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (s,p) \in \mathbb{R}^2; \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2 / X^2 - sX + p = 0$$

و هذه المعادلة لها حلول  $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow$ 

$$\Leftrightarrow s^2 - 4p \geq 0$$

• خلاصة : الشرط الضروري والكافي هو  $s^2 - 4p \geq 0$ 3. نحدد الصورة العكسية ل  $\{(s,p) \in \mathbb{R}^2 / s^2 - 4p = 1\}$ حسب ما سبق:  $\Delta = 1$ 

$$X_1 = \frac{s + \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{s + 1}{2} \quad ; \quad X_2 = \frac{s - \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{s - 1}{2}$$

إذن:  $(y = X_1 \text{ و } x = X_2)$  أو  $(y = X_2 \text{ و } x = X_1)$ • خلاصة :  $f^{-1}\left(\{(s,p) \in \mathbb{R}^2 / s^2 - 4p = 1\}\right) = \{(X_1, X_2); (X_2, X_1)\}$ 

.04

1. \* لنجدد  $f^{-1}(\{3\})$ 

$$x \in f^{-1}(\{3\}) \Leftrightarrow f(x) \in \{3\}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x-4) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ او } x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ او } x = 4$$

$$f^{-1}(\{3\}) = \{0, 4\} \quad \text{إذن:}$$

2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية

سلسلة رقم

تمارين : المجموعات و التطبيقات

من طرف التلاميذ : هند غربي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلجان - حمروأوي عبد السلام



الصفحة

\* f ليست تبانية لأن 3 سابقين لها 0 و 4 .

.2

أ- نبين أن :  $f(\mathbb{R}) \subset [-1, +\infty[$ أي نبين ان :  $y \in f(\mathbb{R}) \Rightarrow y \in [-1, +\infty[$   
لدينا :

$$y \in f(\mathbb{R}) \Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, y = x^2 - 4x + 3$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, y + 1 = (x - 2)^2$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, y + 1 \geq 0$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, y \geq -1$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, y \in [-1, +\infty[$$

$$y \in f(\mathbb{R}) \Rightarrow y \in [-1, +\infty[ \quad \text{ومنه:}$$

• خلاصة :  $f(\mathbb{R}) \subset [-1, +\infty[$ ب- تحديد التطبيق:  $g \circ f$ 

لدينا :

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

$$= g(x^2 - 4x + 3)$$

$$= x^2 - 4x + 3 + \sqrt{x^2 - 4x + 3}$$

$$= x^2 - 4x + 3 + \sqrt{(x - 2)^2}$$

$$= x^2 - 4x + 3 + |x - 2|$$

• خلاصة :  $g \circ f : \mathbb{R} \xrightarrow{f} I \xrightarrow{g} I$ 

$$x \rightarrow g \circ f(x) = x^2 - 4x + 3 + |x - 2|$$

.3

أ- نبين أن  $g$  تقابل :أي نبين أن :  $\forall y \in I, \exists! x \in I / g(x) = y$ ليكن  $y \in I$  نحل المعادلة :  $x \in I / g(x) = y$ 

$$g(x) = y \Leftrightarrow x + \sqrt{x+1} = y$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+1} = y - x$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = y^2 - 2xy + x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x(2y + 1) - 1 + y^2 = 0$$

$$\Delta = (2y + 1)^2 - 4(y^2 - 1)$$

حسب :  $\Delta$ 

$$\Delta = 4y^2 + 4y + 1 - 4y^2 + 4$$

$$\Delta = 4y + 5 \geq 1$$

$$X_1 = \frac{2y + 1 + \sqrt{4y + 5}}{2}$$

$$\text{او } X_2 = \frac{2y + 1 - \sqrt{4y + 5}}{2}$$

$$\text{و منه: } \text{نبين أن: } g^{-1}(y) = \frac{2y + 1 + \sqrt{4y + 5}}{2} \text{ غير ممكن}$$

# 2

التصحيح من طرف مجموعة من تلاميذ ثانوية: عمر بن عبد العزيز | علوم رياضية



الصفحة

## تمارين : المجموعات و التطبيقات

سلسلة رقم

من طرف التلاميذ : هند غربي - نعمة الراضي - محمد الصادق - الطبيبي وليد محمد - المهدى قصیر - الياس بوفلجان - حمروأوي عبد السلام

مثال مضاد :  $g(3) = 5$

$$g^{-1}(5) = \frac{2 \times 5 + 1 + \sqrt{(4 \times 5) + 5}}{2} = 8 \quad \text{ولكن: } g^{-1}: 5 \rightarrow 3 \quad \text{إذن: } g: 3 \rightarrow 5$$

إذن:  $g^{-1}(5) \neq 3$

$$X_2 = \frac{2y + 1 - \sqrt{4y + 5}}{2} \quad \text{المعادلة لها حل وحيد هو:}$$

• خلاصة:  $g$  تقابل من  $I$  إلى  $I$

بـ. نحدد:  $g^{-1}$

حسب ما سبق نستنتج أن :

$$g^{-1}: I \rightarrow I$$

$$x \rightarrow g^{-1}(x) = \frac{2x + 1 - \sqrt{4x + 5}}{2}$$

4. نتبين أن  $h$  غير تباعي:

لدينا :  $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$

$$n \rightarrow h(n) = \frac{1}{n^2 - 2n + 3}$$

لكي يكون  $h$  تباعي يجب أن يتحقق ما يلي :

$$\forall x, x' \in \mathbb{N} / h(x) = h(x') \Rightarrow x = x'$$

ليكن  $x$  و  $x'$  من  $\mathbb{N}$  حيث :

$$h(x) = h(x') \Rightarrow \frac{1}{x^2 - 2x + 3} = \frac{1}{x'^2 - 2x' + 3} \quad \text{لدينا :}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 3 = x'^2 - 2x' + 3$$

$$\Rightarrow x^2 - x'^2 - 2x + 2x' = 0$$

$$\Rightarrow (x - x')(x + x') - 2(x - x') = 0$$

$$\Rightarrow (x - x')(x + x' - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x - x' = 0 \quad \text{او} \quad x + x' - 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = x' \quad \text{او} \quad x + x' = 2$$

ومنه:  $h$  غير تباعي

مثال مضاد:  $h(0) = h(2) = \frac{1}{3}$  ولتكن:  $2 \neq 0$

• خلاصة :  $h(x)$  تطبيق غير تباعي

5. استنتاج تطبيق  $k$  يكون قصور ل  $h$  و تباعي :

لنعتبر القصور التالي

$$k: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$n \rightarrow \frac{1}{n^2 - 2n + 3}$$

أو القصور التالي:

$$k: \mathbb{N} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$n \rightarrow \frac{1}{n^2 - 2n + 3}$$

بتاريخ : 31/01/2015 11:15 ص