



I. تذكير و تمهيد:

A. العلاقة بين القيمة المطلقة و المجالات:

1. تذكير: ببعض الحروف: α, β, ϵ

α يقرأ : ألف alpha. β يقرأ بيت béta . ϵ يقرأ إبسيلون epsilon

نقصد ب α موجب قطعا : شاع موجب قطعا.

نقصد ب $0 < \epsilon$ مهما يكن عشاع موجب قطعا.

نقصد ب $0 > \alpha$ يوجد α شاع موجب قطعا.

عندما نكتب عدد موجب قطعا على الشكل A أو B نقصد بهذه الكتابة عدد موجب كبير جدا مما نتصور.

2. مجال (I(x₀, α) : الذي مركزه x_0 و شعاعه α :

مثال :

• الكتابة $|x - 2| < \alpha$ تعني $x \in I(2, \alpha)$ أو أيضا $x \in (2 - \alpha, 2 + \alpha)$.

• أو أيضا $I(2, \alpha)$ يسمى المجال الذي مركزه 2 و شعاعه α .

بصفة عامة نكتب : $I(x_0, \alpha) = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$.

3. مجال ($I^*(x_0, \alpha)$: الم定点 في x_0 و الذي مركزه x_0 و شعاعه α .

• الكتابة $|x - 2| < \alpha < 0$ تعني $x \in I^*(2, \alpha) \setminus \{2\}$ و $0 < |x - 2| \neq \alpha$ تعني كذلك $x \in I(2, \alpha) \setminus \{2\}$ أو أيضا $x \in (2 - \alpha, 2 + \alpha) \setminus \{2\}$.

• أو أيضا $I(2, \alpha)$ يسمى المجال الذي مركزه 2 و شعاعه α .

بصفة عامة نكتب : $I^*(x_0, \alpha) = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \setminus \{x_0\}$.

B. دالة معرفة بجوار نقطة a . على يمين a . على a .

1. مفردات:

f معرفة بجوار a ثم على يمين a ثم على يسار a .

إذ وجد شاع موجب قطعا (أي $r > 0$) حيث :

a نقول إن f دالة معرفة بجوار a . $I^*(a, r) = [a - r, a + r] \setminus \{a\} = [a - r, a + r] \subset D_f$

b نقول إن f دالة معرفة على يمين a . $[a, a + r] \subset D_f$

c نقول إن f دالة معرفة على يسار a . $[a - r, a] \subset D_f$

f معرفة بجوار $+\infty$ أو $-\infty$.

إذا وجد عدد حقيقي b أو c حيث :

a نقول إن f دالة معرفة بجوار $+\infty$. (يمكن أن يكون المجال مغلق من جهة b)

b نقول إن f دالة معرفة بجوار $-\infty$. (يمكن أن يكون المجال مغلق من جهة c)

أمثلة :

1. مثال f لدينا : $f(x) = \frac{1}{x}$

f معرفة بجوار 0 و على يمين 0 و على يسار 0 و بجوار $+\infty$ و بجوار $-\infty$.

b مثال 2 : f لدينا: $f(x) = \sqrt{x^2(x-2)}$

f معرفة على يسار 2 . f معرفة بجوار $+\infty$. f معرفة كذلك بجوار 3 .

f غير معرفة بجوار 0 و غير معرفة على يمين 0 وغير معرفة على يسار 0 .

c مثال 3 : f لدينا: $f(x) = \sqrt{(x-1)(x+2)}$

f معرفة بجوار $+\infty$ و بجوار $-\infty$ و على يسار 2 و على يمين 1 . f غير معرفة على يسار 1 و غير معرفة على يسار 1 .




II. النهاية هي 0 لدالة f في نقطة $x_0 = 0$ (أي عندما ينول x إلى 0)

A. نهاية الدوال المرجعية في النقطة $x_0 = 0$

1. تعريف:

الدوال التالية : $f(x) = \sqrt{|x|}$ و $f(x) = |x|$ و $(n \in \mathbb{N}^*)$; $f(x) = x^n$ و $f(x) = x^3$ و $f(x) = x^2$ و $f(x) = x$ تسمى دوال مرجعية.



تمثيل المباني لهذه الدوال هو:

2. نشاط:

f دالة مرجعية :

1. ماذا تلاحظ عن قيمة x التي أعطيت في الجدول؟

2. أتمم الجدول التالي.

3. ماذا تلاحظ عن قيمة $f(x)$ التي حصلت عليها بالنسبة لكل دالة مرجعية؟

جواب:

1. نلاحظ أن قيمة x تقترب من 0.

2. نتمم الجدول (أنظر الجدول).

3. نلاحظ عن قيمة $f(x)$ تقترب من 0.

$x \rightarrow$	-10^{-2}	-10^{-3}	-10^{-4}	\rightarrow		\leftarrow	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}
$f(x) \downarrow$									
$f(x) = x$				\rightarrow		\leftarrow			
$f(x) = x^2$				\rightarrow		\leftarrow			
$f(x) = x^3$				\rightarrow		\leftarrow			
$f(x) = x $				\rightarrow		\leftarrow			
$f(x) = \sqrt{ x }$				\rightarrow		\leftarrow			

3. مفردات :

نقول إن x ينول إلى 0 . ونكتب : $x \rightarrow 0$

نقول إن : $f(x)$ تؤول إلى 0 . ونكتب : $f(x) \rightarrow 0$

نلخص ذلك بقولنا أن $f(x)$ تؤول إلى 0 عندما x ينول إلى 0 .

نقول كذلك أن نهاية $f(x)$ هي 0 عندما x تؤول إلى 0 . نرمز لذلك ب : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

4. تعريف:

f دالة عدديّة معرفة بجوار 0 (أي $I^*(0, r) =]-r, r[\setminus \{0\} =]-r, 0[\cup]0, r[$)

نقول إن : $f(x)$ تؤول إلى 0 عندما x ينول إلى 0 لمعنى أن: $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x| < \alpha \Rightarrow |f(x)| < \epsilon$

نكتب : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ نقرأ : نهاية $f(x)$ هي 0 عندما x ينول إلى 0 .



٥. أمثلة :

a مثال ١ : $f(x) = x^2$ نبين أن $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$

ليكن $0 < \epsilon$ و $|x| < \sqrt{\epsilon}$. لدینا: $|f(x)| = |x^2| = |x|^2 < \epsilon$. ومنه: $|x| < \sqrt{\epsilon}$. من خلال (١) و (٢) نحصل على $0 < |x| < \sqrt{\epsilon}$

وفي هذه الحالة :

نقول لكل $0 < \epsilon$ يوجد α حيث $\sqrt{\epsilon} = \alpha$. أو أيضاً : نقول لكل $0 < \epsilon$ يكفي أن نأخذ $\sqrt{\epsilon} = \alpha$.

b مثال ٢ : $f(x) = \sqrt{|x|}$ نبين أن $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} = 0$

ليكن $0 < \epsilon$ و $|x| < \epsilon^2$. لدینا: $|f(x)| = |\sqrt{|x|}| = \sqrt{|x|} < \epsilon$. ومنه: $|x| < \epsilon^2$. من خلال (١) و (٢) نحصل على $0 < |x| < \epsilon^2$

وفي هذه الحالة :

نقول لكل $0 < \epsilon$ يوجد α حيث $\epsilon^2 = \alpha$. أو أيضاً : نقول لكل $0 < \epsilon$ يكفي أن نأخذ $\epsilon^2 = \alpha$.

c مثال ٣ : $f(x) = \frac{x}{x-1}$ نبين أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x-1} = 0$

لدينا : $\begin{cases} -2 < x-1 < 0 \\ x \neq 0 ; x \neq 1 \end{cases}$ إذن: $\begin{cases} -1 < x < 1 \\ x \neq 0 ; x \neq 1 \end{cases}$ ومنه: $x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$. نأخذ: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

(١) $\begin{cases} |x-1| < 2 \\ x \neq 0 ; x \neq 1 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} -2 < x-1 < 2 \\ x \neq 0 ; x \neq 1 \end{cases}$

ليكن $0 < \epsilon$ و $|x| < |x-1|\epsilon$. لدینا: $|f(x)| = \left| \frac{x}{x-1} \right| = \frac{|x|}{|x-1|} < \epsilon$. من خلال (١) و (٢) و (٣) .

نحصل على $0 < |x| < |x-1|\epsilon < 2\epsilon$

وفي هذه الحالة :

نقول لكل $0 < \epsilon$ يوجد α حيث $\alpha = \inf(1, 2\epsilon)$. أو أيضاً : نقول لكل $0 < \epsilon$ يكفي أن نأخذ $\alpha = \inf(1, 2\epsilon)$

B. خصائص : (نهاية الدوال المرجعية في ٠)

J. خصائص :

a . $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ و $(n \in \mathbb{N}^*) \lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

b . دوال عدديّة معرفة بجوار ٠ (أي $D_h \cup D_g \cup D_f$ و $D_r, r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) ضمن D_f و D_g و D_h

c . $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$. إذا كان $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

٢. مثال :

a . $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. نبين أن $f(x) = x^2 \sin x$

لدينا : $-x^2 \leq x^2 \sin x \leq x^2$. إذن $-1 \leq \sin x \leq 1$

نعم أن : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. إذن $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x = 0$

خلاصة: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x = 0$

III. النهاية ℓ عندما يؤول x إلى ٠:

I. تعريف :



دالة معرفة بجوار x_0 مع $r > 0$. $\exists r, r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
نقول إن $f(x)$ تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يؤول x إلى x_0 لمعنى أن: $f(x) \rightarrow \ell$ عندما $x \rightarrow x_0$.
أو أيضاً: $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \epsilon$.
نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

٢. أمثلة :

نعتبر الدالة: $f(x) = x + 3$. نبين أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$

ليكن: $0 < \epsilon$ و $0 < |x| < \epsilon$. من خلال (١) و (٢) لدينا: $|f(x) - 3| = |x + 3 - 3| = |x| < \epsilon$ ومنه: $0 < |x| < \epsilon$.
نحصل على $0 < |x| < \epsilon$.

وفي هذه الحالة:

نقول لكل $\epsilon > 0$ يوجد α حيث $\alpha = \epsilon$ أو أيضاً نقول لكل $\epsilon > 0$ يكفي أن نأخذ $\alpha = \epsilon$.
خلاصة: $\lim_{x \rightarrow 0} x + 3 = 3$

ملحوظة: إذا اعتربنا $f(x) = x + c$. بنفس الطريقة نبين أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = c$

٤. نهاية دالة عدديّة f بجوار x_0 :

: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

١. تعريف :

دالة معرفة بجوار x_0 أي $\exists r, r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. مع $r > 0$

نقول إن $f(x)$ تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يؤول x إلى x_0 لمعنى أن: $f(x) \rightarrow \ell$ عندما $x \rightarrow x_0$.
أو أيضاً: $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \epsilon$.
نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

٢. أمثلة: نعتبر الدالة: $f(x) = x$

نبين أن: $\lim_{x \rightarrow -5} f(x) = -5$. لكل $\epsilon > 0$ نبحث هل يوجد $\alpha > 0$ مع $\alpha < \epsilon$ يعطينا $0 < |x - (-5)| < \alpha$

ليكن: $0 < \epsilon$ و $0 < |x - (-5)| < \epsilon$. من خلال (١) و (٢) نحصل على $|x - (-5)| = |x + 5| = |x - (-5)| < \epsilon$.
لدينا: $|f(x) - (-5)| = |x - (-5)| < \epsilon$ ومنه: $|f(x) - (-5)| < \epsilon$.
نحصل على $0 < |x - (-5)| < \epsilon$

وفي هذه الحالة:

نقول لكل $\epsilon > 0$ يوجد $\alpha = \epsilon$ حيث $\alpha = \epsilon$. أو أيضاً: نقول لكل $\epsilon > 0$ يكفي أن نأخذ $\alpha = \epsilon$.

خلاصة: $\lim_{x \rightarrow -5} x = -5$

ملحوظة: إذا اعتربنا $f(x) = x$. بنفس الطريقة نبين أن: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$ مع

٣. نتائج: $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ لكل x_0 من \mathbb{R}



. $r > 0$ مع $x_0 \in D_f$ دوال عدديه معرفة بجوار x_0 . أي $x \in]x_0 - r, x_0 + r[\setminus \{x_0\} \subset D_f$.

كل دالة f لها نهاية ℓ بهذه النهاية وحيدة. a

. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell$ و $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ b

إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |\ell|$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ c

. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ و $|f(x) - \ell| \leq g(x)$ d

٥. أمثلة :

• مثال 1: أحسب $\lim_{x \rightarrow -5} |x|$

لدينا: $\lim_{x \rightarrow -5} |x| = |-5| = 5$ (حسب المثال السابق) إذن :

• مثال 2: بين أن $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x + 7 = 7$

لدينا: $-x^2 + 7 \leq x^2 \sin x + 7 \leq x^2 + 7$ إذن: $-x^2 \leq x^2 \sin x \leq x^2$

لدينا: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 7 = 7$ إذن: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x + 7 = 7$ و $\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 + 7 = 7$ (حسب الخاصية b)

خلاصة: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x + 7 = 7$

• مثال 3: أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} (\sin x + \cos x)$

نعم أن: $\left| \frac{x}{2} (\sin x + \cos x) \right| = \left| \frac{x}{2} \right| |\sin x + \cos x| \leq \left| \frac{x}{2} \right| \times 2$ إذن: $|\sin x + \cos x| \leq |\sin x| + |\cos x| \leq 1 + 1$

و منه: $|f(x)| \leq |x|$ أي $\left| \frac{x}{2} (\sin x + \cos x) \right| \leq |x|$

لدينا: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} (\sin x + \cos x) = 0$ و منه: $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ (حسب الخاصية c)

خلاصة: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} (\sin x + \cos x) = 0$

: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ B

• نشاط: لنعتبر الدالة $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$

مجموعة تعريف f هي: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$. الرسم (3) يمثل منحنى الدالة f .

استنتج مبانيها نهاية الدالة f في 1. أتمم ما يلي: $\lim_{x \rightarrow \dots} f(x) = \dots$

٢. تعاريف:

. $\forall A > 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow f(x) > A$ يكفي: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

. $\forall A < 0, \exists \alpha > 0, 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow f(x) < A$ يكفي: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$



٣. أمثلة: نبين أن: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

لكل $A > 0$ نبحث هل يوجد $\alpha > 0$ يحقق $|x| < \alpha$ يعطينا $A > f(x) > 0$

ليكن: $0 < A < |x| < \alpha$

لدينا: $f(x) > A \Rightarrow \frac{1}{x^2} > A \Rightarrow x^2 < \frac{1}{A} \Rightarrow |x|^2 < \frac{1}{A} \Rightarrow |x| < \sqrt{\frac{1}{A}}$; (2)

حسب العلاقة (1) و (2) نحصل على: $0 < |x| < \sqrt{\frac{1}{A}} = \alpha$.

وفي هذه الحالة:

نقول لكل $A > 0$ يوجد α حيث $\alpha = \sqrt{\frac{1}{A}}$. أو أيضاً: نقول لكل $A > 0$ يكفي أن نأخذ

خلاصة: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

V. النهاية على اليمين - النهاية على اليسار:

A. النهاية على اليمين في النقطة x_0 - النهاية على اليسار في النقطة x_0 .

١. نشاط:

لنعتبر الدالة $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ هي معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\} = [-\infty, 1] \cup [1, +\infty]$.

- f معرفة على يمين 1 لأن: $D_f = [1, 2]$. أتم الجدول رقم (أ). ماذ تلاحظ عندما x يقول إلى 1 بقيم أكبر من 1 ؟
- f معرفة على يمين 1 لأن: $D_f = [0, 1]$. أتم الجدول رقم (ب). ماذ تلاحظ عندما x يقول إلى 1 بقيم أصغر من 1 ؟

جدول رقم 4	x	0,99	0,999	0,9999	→		←	1,0001	1,001	1,01
	$f(x)$									
		الجدول (ب)						الجدول (أ)		

٢. مفردات:

- نلاحظ أن: x تؤول إلى 1 بقيم أكبر و $f(x)$ تؤول إلى 2 . نعبر عن هذا بقولنا أن نهاية f على يمين 1 هي 2 .

نكتب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ أو $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$

- نلاحظ أن: x تؤول إلى 1 بقيم أصغر و $f(x)$ تؤول إلى 2 . نعبر عن هذا بقولنا أن نهاية f على يسار 1 هي 2 .

نكتب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ أو $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$

B. تعريف:

١. تعريف 1:

دالة عدديّة معرفة على يمين x_0 . أي $D_f = [x_0, x_0 + r] \subset D_f$. مع $r > 0$.

نقول إن $f(x)$ تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ_d عندما يقول x إلى x_0 على اليمين لمعنى أن :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < x - x_0 < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell_d| < \varepsilon$

نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_d$ أو أيضاً $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell_d$



دالة عدديّة معرفة على يسار x_0 . أي $x_0 - r, x_0 \subset D_f$. مع $r > 0$.
نقول إن $f(x)$ تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ_g عندما يؤول x إلى x_0 على اليسار لمعنى أن :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < x - x_0 < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell_g| < \varepsilon$$

نرمز لذلك بـ : $\lim_{\substack{x \rightarrow x \\ x < x_0}} f(x) = \ell_g$ أو أيضاً $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_g$

٣. أمثلة :

نعتبر الدالة العدديّة f المعرفة بـ :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x \\ x < 0}} f(x) = 0 \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x \\ x > 0}} f(x) = 0 \quad \text{و} \quad \begin{cases} f(x) = x, & x \geq 0 \\ f(x) = x^2, & x < 0 \end{cases}$$

٤. بعض التعريفات :

▪ . $\forall A > 0, \exists \alpha > 0, 0 < x - x_0 < \alpha \Rightarrow f(x) > A$ يكافيء $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = +\infty$

▪ . $\forall A > 0, \exists \alpha > 0, 0 < x_0 - x < \alpha \Rightarrow f(x) < -A$ يكافيء $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty$

٥. خصائص :

٦. خصائص :

▪ . $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

▪ . $(n \in \mathbb{N}^*)$ زوجي حيث $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

▪ كل دالة f لها نهاية ℓ في x_0 يكافيء نهايتها ℓ_d على يمين x_0 تساوي نهايتها ℓ_g على يسار x_0 تساوي ℓ

▪ أو أيضاً : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell_d = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_g = \ell$

٧. أمثلة :

نعتبر الدالة العدديّة f المعرفة بـ :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 \sin x ; & x \geq 0 \\ f(x) = x + 3 ; & x < 0 \end{cases}$$

▪ ١. أ - أحسب : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. ب - أحسب : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

▪ ٢. هل الدالة f لها نهاية في 0 ؟

جواب :

١. أحسب :


حسب الأمثلة السابقة لدينا : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin x = 0$ و منه $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin x = 0$ (خاصية)

حسب الأمثلة السابقة لدينا : $\lim_{x \rightarrow 0^-} x + 3 = 3$ و منه $\lim_{x \rightarrow 0} x + 3 = 3$ (خاصية)

▪ ٢. ندرس هل f لها نهاية في 0 :



الرسم ٤



بما أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ أي $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin x \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin x$
إذن f ليس لها نهاية في 0.

خلاصة: f ليس لها نهاية في 0.

٦. نهاية دالة بجوار $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \quad \text{A}$$

١. نشاط:

الرسم (٤) يمثل منحني الدالة: $f(x) = \frac{1}{x}$

استنتاج مبانيما ما يلي: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots$

٢. مفردات ورموز:

حسب الرسم (٤) نقول عندما x يؤول إلى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن $f(x)$ تؤول إلى 0 أو أيضا: نهاية f هي 0 عندما x يؤول إلى $+\infty$.

نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(C_f) منحني f يقترب أكثر فأكثر من محور الأفاسيل أو أيضا من المستقيم ذي المعادلة $y = 0$ عندما x يؤول إلى $+\infty$.

لهذا نقول إن (C_f) يقبل مقارب أفقى هو المستقيم الذي معادلته $y = 0$.

٣. تعريف ١: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$

دالة معرفة بجوار $+\infty$. أي $[\mathbf{b}, +\infty) \subset D_f$.

نقول إن (x) f تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يؤول x إلى $+\infty$ لمعنى أن: $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, x > B \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$

٤. تعريف ٢: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$

دالة معرفة بجوار $-\infty$. أي $(-\infty, \mathbf{b}] \subset D_f$.

نقول إن (x) f تؤول إلى العدد الحقيقي ℓ عندما يؤول x إلى $-\infty$ لمعنى أن: $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, x < -B \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$

٥. خصائص تقبل:

. ($n \in \mathbb{N}^*$); $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

دالة عدديه و $\ell \in \mathbb{R}$

إذا كانت f تقبل نهاية ℓ فهذه النهاية وحيدة.

. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - \ell = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$

٦. مثال: بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2} = -3$



درس : النهايات

$$\text{لدينا: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2} + 3 = 0 \text{ . ومنه : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2} + 3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x + 3x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$


$$\text{حسب الخاصية السابقة : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2} = -3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \quad \underline{\text{B}}$$

جدول ١	x	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	→
رقم	f(x)					

جدول ٢	←	-10^{15}	-10^{12}	-10^9	-10^6	x
رقم						f(x)

الرسم ١



$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. عبر عن ذلك باستعمال رمز $\lim_{x \rightarrow +\infty}$.

٢ **نشاط ٢:** (النهاية بطريقة مبيانيا)

أ الرسم (١) يمثل منحني الدالة : $f(x) = x^3$

استنتج مبيانيا ما يلي : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots \dots \dots$ ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots \dots \dots$

ب الرسم (٢) يمثل منحني الدالة : $f(x) = \sqrt{x}$

استنتاج النهاية التالية $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots \dots \dots$

هل يمكن أن نتكلم عن نهاية f عند $-\infty$ بالنسبة لرسم ٢ ؟

الرسم ٢

$$f(x) = \sqrt{x}$$

٣ **تعريف ١:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

f دالة معرفة بجوار $+\infty$. أي $[b, +\infty) \subset D_f$

نقول إن f تؤول إلى $+\infty$ عندما يؤول x إلى $+\infty$ لمعنى أن: $\forall A > 0, \exists B > 0, x > B \Rightarrow f(x) > A$

نرمز لذلك بـ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

٤ **تعريف ٢:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

. $\forall A > 0, \exists B > 0, x > B \Rightarrow f(x) < -A$ يكافي: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

. $\forall A > 0, \exists B > 0, x < -B \Rightarrow f(x) > A$ يكافي: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

. $\forall A > 0, \exists B > 0, x < -B \Rightarrow f(x) < -A$ يكافي: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

٥ **خاصيات (تقبل):**



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \quad \text{و} \quad (n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{N}^*) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad \dots \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$(n \in \mathbb{N}) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty \quad ; \quad n \text{ زوجي} \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

. VII . العمليات على النهايات: (بواسطة جدول مع x → الخاصية صحيحة بتعويض ؟ ب x_0 أو x_0^+ أو x_0^- أو $+\infty$ أو $-\infty$)

f/g	$1/g$	$f \times g$	$f+g$	g	f
$\lim_{x \rightarrow ?} \left(\frac{f}{g} \right) (x)$	$\lim_{x \rightarrow ?} \left(\frac{1}{g} \right) (x)$	$\lim_{x \rightarrow ?} (f \times g) (x)$	$\lim_{x \rightarrow ?} (f+g) (x)$	$\lim_{x \rightarrow ?} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow ?} f(x)$
$(\ell' \neq 0) ; \ell / \ell'$	$(\ell' \neq 0) ; 1 / \ell'$	$\ell \times \ell'$	$\ell + \ell'$	ℓ'	ℓ
مع وضع إشارة ∞	$+\infty$	0	ℓ	0^+	$(\ell \neq 0) \ell$
مع وضع عكس إشارة ℓ	$-\infty$	0	ℓ	0^-	$(\ell \neq 0) \ell$
0	0	مع وضع إشارة ∞	$+\infty$	$+\infty$	$(\ell \neq 0) \ell$
0	0	مع وضع عكس إشارة ℓ	$-\infty$	$-\infty$	$(\ell \neq 0) \ell$
شكل غير محدد	0^\pm . إذا كان $\pm\infty$	0	0	0	0
0	0	شكل غير محدد	$+\infty$	$+\infty$	0
0	0	شكل غير محدد	$-\infty$	$-\infty$	0
مع وضع إشارة ℓ'	$(\ell' \neq 0) ; \frac{1}{\ell'}$	مع وضع إشارة ℓ'	$+\infty$	$\ell' \neq 0 ; \ell'$	$+\infty$
مع وضع عكس إشارة ℓ'	$(\ell' \neq 0) ; \frac{1}{\ell'}$	مع وضع عكس إشارة ℓ'	$-\infty$	$\ell' \neq 0 ; \ell'$	$-\infty$
شكل غير محدد	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
شكل غير محدد	0	$-\infty$	شكل غير محدد	$-\infty$	$+\infty$
شكل غير محدد	0	$-\infty$	شكل غير محدد	$+\infty$	$-\infty$
شكل غير محدد	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$

الأشكال الغير المحددة هي: نوع 1 : نوع 2 : نوع 2 : $\frac{0}{0}$; 0^\pm ; 1^\pm .

. VIII . نهاية الدوال: 1- الحدودية 2- الجذرية 3- من نوع (x) 4- نهاية دالة مثلثية :

A . نهاية دالة حدودية - نهاية دالة جذرية :
خاصية :

$$Q(x) = \sum_{i=0}^{i=m} b_i x^i = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n \quad \text{و} \quad P(x) = \sum_{i=0}^{i=n} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \quad \text{اللتان حدوديتان}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \quad (2) \quad \text{. لدينا : } \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0) \quad (1) \quad \text{. لدينا : } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n = 0$$

$$\text{. لدينا : } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \quad (4) \quad \text{. لدينا : } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} \quad (3) \quad \text{. لدينا : } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m}$$

. 2 . أمثلة :

أ- مثال خاص بالدوال الحدودية :



$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3}x^2 + 2x + 6 = \frac{1}{3} \times 1^2 + 2 \times \frac{1}{3} + 6 = 7 ; \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3}x^2 = \frac{1}{3} \times 1^2 = \frac{1}{3} ; \lim_{x \rightarrow 1} 2x + 6 = 2 \times 3 + 6 = 12 \quad .1$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{5}x^3 + 2x + 6 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{5}x^3 = -\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3}x^2 = +\infty ; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x + 6 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \quad .2$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} 18x^4 - 3x^3 + 2x - 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 18x^4 = +\infty$$

بـ مثال خاص بالدوال الجذرية :

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+6}{-3x+2} = \frac{2 \times 3 + 6}{-3 \times 1 + 2} = \frac{12}{-1} = -12 \quad .1$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{18x^4 - 3x^3 + 2x - 5}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{18x^4}{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -18x^3 = -\infty \quad .2$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{18x^4 - 3x^3 + 2x - 5}{3 - x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{18x^4}{-x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -18 = -18 \quad .3$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{18x^4 - 3x^3 + 2x - 5}{3 - x^7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{18x^4}{-x^7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{18}{x^3} = 0 \quad .4$$

ـ g(x) = \sqrt{f(x)} نوع دالة من

ـ خاصية :

ـ دالة عدديّة معرفة و موجبة على D_f و \ell \geq 0

ـ إذا كان \lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\ell} \quad (\text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\ell} \quad \text{فإن} \quad \ell \geq 0) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} f(x) = \ell

ـ إذا كان \lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} \sqrt{f(x)} = +\infty \quad (\text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{f(x)} = +\infty \quad \text{فإن} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} f(x) = +\infty)

ـ مثال: .2

$$\lim_{x \rightarrow -3} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{(-3)^2 - 1} = \sqrt{8} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + 3} = \sqrt{1^2 + 3} = 2 \quad .1$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty : \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} = +\infty \quad .2$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty : \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x} = +\infty \quad .3$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-4}{3x+6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3} : \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{2x-4}{3x+6}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad .4$$

ـ نهايات الدوال المثلثية :

ـ خاصيات :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$


$$((k \in \mathbb{Z}) x_0 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \tan x = \tan x_0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$


$$\cdot a \in \mathbb{R}^* \quad \text{مع} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} = a \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$



الرسم 2



الرسم 1



لدينا :

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 2$. استنتاج مبيانيا (الرسم 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$

(2) نعلم : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. استنتاج مبيانيا (الرسم 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(3) نعلم أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$. استنتاج مبيانيا (الرسم 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

2. خصائص :

دوال عدديّة حيث f و g و h دوال عدديّة حيث :

إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} g(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = +\infty$ و $f(x) \leq g(x)$

إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow ?} g(x) = -\infty$ و $f(x) \leq g(x)$

إذا كان $\lim_{x \rightarrow ?} h(x) = \ell$ فإن $\lim_{x \rightarrow ?} f(x) = \lim_{x \rightarrow ?} g(x) = \ell$ و $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$