

9

الللميد: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: I علوم رياضية


سلسلة رقم

تصحيح سلسلة تمارين : الدوران في المستوى



الصفحة

.01




ننشر الشكل :
 1. نحدد صور النقط D و B و E بالدوران :
 $R(D) = J$ ومنه $\frac{CD = CJ}{(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CJ}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]}$
 بما أن المثلث DCJ المتساوي الأضلاع إذن :
 $R(E) = A$ و $R(B) = I$
 بنفس الطريقة نبين أن : $R(E) = A$ و $R(B) = I$

2. استنتج أن النقط I و J و A مستقيمة .
 $E \in (DB)$ هو واسط القطعة $[AC]$ و نعلم أن $CE = AE$ ومنه :
 إذن النقط D و B و E مستقيمة و وبالتالي $J = R(D) = A$ و $I = R(B) = R(D) = J$ لأن الدوران يحافظ على استقامية النقاط .

خلاصة : النقط I و J و A مستقيمة .

.02



1. أنشئ (C') صورة (C) بالدوران r الذي مركزه A و قياس زاويته $\frac{\pi}{2}$.
 2. ثبت أن النقط M و B و M' مستقيمة .
 لتكن A و B نقطتي تقاطع (C) و (C') .
 لتكن B' صورة B بالدوران r .
 لدينا :

$$(1) (BM) \perp (B'M') \text{ إذن } (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{B'M'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] : \begin{cases} r : M \mapsto M' \\ r : B \mapsto B' \end{cases}$$

$$(AB) \perp (AB') \text{ إذن } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] : \begin{cases} r : B \mapsto B' \\ r : A \mapsto A' \end{cases}$$

ومنه : المثلث 'ABB' متساوي الساقين وقائم الزاوية في A .

لدينا : إذن $B \in (C')$ و $B' \in (C)$ [قطر (C')] .

بما أن : $(M'B) \perp (M'B')$ إذن (C') [قطر (C')] .

من خلال (1) و (2) نحصل على المستقيمين (BM) و $(M'B')$ عوديين على نفس المستقيم (BM') إذن هما منطبقين

ومنه : $(BM) = (M'B')$.

خلاصة : $(BM) = (M'B')$ و وبالتالي النقط M و B و M' مستقيمة .

.03

1. بين أن : $S_{D'} \circ S_D$ دوران يتم تحديد مركزه و قياس زاويته .

لدينا المستقيمين $D\left(O, \vec{j}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ و $D\left(O, \vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ متقطعين في O .

9


التلميذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: I علوم رياضية

سلسلة رقم

تصحيح سلسلة تمارين : الدوران في المستوى



الصفحة



إذن $S_{D'} \circ S_D$ هو دوران مركزه O .

نحدد قياس زاويته :
لدينا :

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) &= (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM}) + (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) [2\pi] \\ &\equiv 2(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) + 2(\overrightarrow{OM}, \vec{j}) [2\pi] \\ &\equiv 2(\vec{u}, \vec{j}) [2\pi] \\ &\equiv 2 \times \frac{\pi}{4} [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{aligned}$$

$$(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

خلاصة : $S_{D'} \circ S_D$ هو دوران الذي مركزه O و قياس زاويته $\frac{\pi}{2}$ أو أيضا :

نحدد حسب قيم α مجموعة النقط M حيث $MM' = \alpha$

حسب ما سبق : $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ إذن $OM = OM'$ ومنه المثلث OMM' متساوي الساقين

و قائم الزاوية في O . من خلال خاصية فيثاغورس نحصل على $OM^2 + OM'^2 = MM'^2 \Leftrightarrow 2OM^2 = \alpha^2 \Leftrightarrow OM^2 = \frac{\alpha^2}{2}$

و منه : $OM = \frac{2\alpha}{\sqrt{2}}$

مجموعة النقط M حيث $MM' = \alpha$ هي الدائرة .

04

ليكن OAB مثلثاً متساوياً الساقين رأسه O .

نعتبر المستقيم (Δ) المار من O و العمودي على المستقيم (AO) .

و المستقيم (Δ') المار من I منتصف $[AO]$ و العمودي على (AO) .

و المستقيم (D) ارتفاع المثلث OAB المنشأ من O .

نعتبر التمايز المحوري S_D الذي محوره (D) .

بين أن : التطبيق $S_{\Delta} \circ S_{\Delta'} = t$ إزاحة يتم تحديد متجهتها .

لدينا : $(\Delta) \perp (AO)$ و $(\Delta') \perp (AO)$ إذن : $(\Delta) \parallel (\Delta')$ لأن

وبالتالي التحويل $S_{\Delta} \circ S_{\Delta'} = t = 2\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{AO}$ هو إزاحة ذات المتجهة

(Δ') المار من I مننصف $[AO]$ و العمودي على (AO) .

خلاصة : $S_{\Delta} \circ S_{\Delta'} = t = \overrightarrow{AO}$

بين أن : التطبيق $r = S_{\Delta} \circ S_{\Delta'} = S_D$ دوران يتم تحديد مركزه و قياس زاويته .



$$\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA'} \right) \equiv \pi - \beta \quad [2\pi] \quad \text{ثم بين أن } S_D(A_1) = A' \quad \text{و } S_\Delta(A) = A_1$$

أ- أنشئ A_1 و $S_D(A_1) = A'$ و $S_\Delta(A) = A_1$

لدينا :

$$: \left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'} \right) \equiv \alpha \quad [2\pi] \quad \text{(أي)} \quad S_{(D)} \circ S_{(\Delta)} = r : A \xrightarrow{S_{(\Delta)}} A_1 \xrightarrow{S_{(D)}} A'$$

$$\text{نضع :} \quad r : A \xrightarrow{\quad} A'$$

لدينا : $(\Delta) \perp (AO)$ ومنه :

من جهة أخرى : $\triangle OAB$ مثلاً متساوي الساقين رأسه O و المستقيم (D) ارتفاع المثلث OAB المنشأ من

. إذن (D) منصف داخلي لزاوية . (2) $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \right)$

حسب (1) و (2) نستنتج أن : $S_D(A_1) = A' \in (OB)$ و ليست نقطة من نصف المستقيم $[O, B]$. من جهة أخرى :

$$\begin{aligned} \left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA'} \right) &\equiv \left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA_1} \right) + \left(\overrightarrow{OA_1}, \overrightarrow{OA'} \right) \quad [2\pi] \\ &\equiv \pi + \left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \right) \quad [2\pi] \\ &\equiv \pi - \beta \quad [2\pi] \end{aligned}$$

ومنه : $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA'} \right) \equiv \pi - \beta \quad [2\pi]$

خلاصة : $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA'} \right) \equiv \pi - \beta \quad [2\pi]$

ب- نستنتج طبيعة التحويل . $r = S_D \circ S_\Delta$

لدينا : $\{O\} \cap (D) = \{O\}$ (إذن التحويل $r = S_D \circ S_\Delta$) و $r = S_D \circ S_\Delta$ هو دوران مركزه النقطة O و قياس زاويته هو $\pi - \beta$

خلاصة: التحويل $r = S_D \circ S_\Delta$ هو دوران مركزه النقطة O و قياس زاويته هو $\pi - \beta$ أي

3. بين أن : $r \circ t$ دوران يتم تحديد مركزه و قياس زاويته .

لدينا : $r \circ t = (S_D \circ S_\Delta) \circ (S_\Delta \circ S_{\Delta'})$

= $S_D \circ (S_\Delta \circ S_{\Delta'}) \circ S_{\Delta'}$ (لأن تركيب التطبيقات تجمعي)

= $S_D \circ I_\theta \circ S_{\Delta'}$ (لأن $S_\Delta \circ S_{\Delta'}$ هو التطبيق المطابق في المستوى)

= $S_D \circ S_{\Delta'}$

بما أن $\{O\} \cap (D) = \{O\}$ (إذن $S_D \circ S_{\Delta'}$ هو دوران مركزه O .

خلاصة : $r \circ t = S_D \circ S_{\Delta'}$ هو دوران مركزه O .