

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

التعداد تمارين و حلول

تمرين 1

يحتوي صندوق على 10 كرات موزعة كما يلي أربعة كرات حمراء 3 منها تحمل الرقم 1 و واحدة تحمل الرقم 2 و خمسة كرات خضراء 3 منها تحمل الرقم 2 ، واثنين منها تحمل الرقم 1، و كرة واحدة بيضاء تحمل الرقم 3 نسحب عشوائيا بالتناوب و بدون احلال ثلث كرات.

- حدد عدد السحبات الممكنة حيث الكرة الثانية تكون حمراء و تحمل الرقم 1
- حدد عدد السحبات الممكنة بحيث المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حلين مختلفين في \mathbb{R} مع العلم أن العدد a يمثل رقم الكرة الأولى المسحوبة و b يمثل رقم الكرة الثانية و c يمثل الكرة الثالثة.

تمرين 2

من مؤسسة ثانوية ثانوية تأهلية تحتوي على n شخصا، نريد أن نختار مجلسا مكونا من p شخصا حيث $2 \leq p \leq n$

- ما هو عدد المجالس الممكن تكوينها في الحالات التالية:
 - مجلس يضم المدير و الناظر
 - مجلس لا يضم المدير و الناظر
 - مجلس يضم المدير أو الناظر و ليس الاثنين معا

$$C_n^p = C_{n-2}^p + 2C_{n-2}^{p-1} + C_{n-2}^{p-2}$$

تمرين 3

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{p=1}^{p=n} C_{p+1}^2 = C_{n+2}^3$$

$$S = (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 4) + \dots + (n(n+1))$$

تمرين 4

ليكن $n \in \mathbb{N}$ حيث $n \geq 2$. نعتبر الدالة f المعرفة بـ $f(x) = (x+1)^n$ بعد حساب $(f'(x))'$ بطريقتين مختلفتين

$$C = \sum_{k=0}^{k=n} (2k+1)C_n^k \quad B = \sum_{k=0}^{k=n} (k+1)C_n^k \quad A = \sum_{k=1}^{k=n} kC_n^k$$

استنتج المجاميع التالية

تمرين 5

نعتبر صندوقا يحتوي على 5 كرات حمراء و 5 كرات بيضاء و 5 كرات خضراء في كل لون الكرات تحمل الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

نسحب بالتناوب و بدون احلال خمس كرات من الصندوق.

- أحسب عدد السحبات الممكنة للحصول على 3 كرات بيضاء و كرتين حمراوين.
- أحسب عدد السحبات الممكنة للحصول على 5 كرات تحقق الشرطين:
 - كرة واحدة تحمل الرقم 5.
 - أربع كرات فقط من اللون الأخضر

تمرين 6

في مكتب جمعية يتكون من 15 عضوا ، 6 إناث و 9 ذكور .
نريد أن نختار عشوائيا رئيس و نائبه و كاتب عام و أمين المال.
ما هو عدد الإمكانيات الممكنة ؟

- ما هو عدد الإمكانيات التي يكون فيها الكاتب العام والأمين من الإناث؟

تمرين 7

لتكن E و F مجموعتين غير فارغتين و منفصلتين بحيث $cardE = cardF = n$

- 1- بين أن عدد الأزواج $(X; Y)$ من $X \cup Y = E$ بحيث $n \geq 2$ هو 3^n
- 2- أحسب بطريقتين مختلفتين عدد أجزاء $E \cup F$ المكونة من n عنصر. و استنتج أن

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{k=n} \left(C_n^k \right)^2$$

$$\frac{n}{2} C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{k=n} k \left(C_n^k \right)^2$$

استنتاج أن

تمرين 8

أحسب المجاميع التالية

$$S_{(n;p)} = \sum_{i=0}^p C_n^i \cdot C_{n-i}^{p-i} \quad \text{و} \quad S'_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i+1} C_n^i \quad \text{و} \quad S_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i$$


تمرين 9

لتكن E مجموعة متميزة حيث $\text{card } E = n \geq 2$

حدد عدد التطبيقات f المعرفة من E نحو E حيث

حلول

حل تمرين 1



نسحب عشوائيا من الصندوق بالتتابع و بدون إخلال بثلاث كرات.

1- نحدد عدد السحبات الممكنة حيث الكرة الثانية تكون حمراء و تحمل الرقم 1

هذه السحبات ستكون على شكل $R_1 R_1 X$ أو $R_1 R_1 X$

عدد السحبات الممكنة حيث الكرة الثانية تكون حمراء و تحمل الرقم 1 هي:

$$A_7^1 \cdot A_3^1 \cdot A_8^1 + A_3^2 \cdot A_8^1 = 216$$

2- نحدد عدد السحبات الممكنة بحيث المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حللين مختلفين في \mathbb{R} مع العلم أن العدد a يمثل رقم الكرة الأولى المسحوبة و b يمثل رقم الكرة الثانية و c يمثل رقم الكرة الثالثة.

$$\left(\frac{b}{2} \right)^2 > ac \Leftrightarrow b^2 - 4ac > 0 \Leftrightarrow ax^2 + bx + c = 0$$

إذا كان $b = 1$ فان $ac > \frac{1}{4}$ وهذا غير ممكن لأن $a \geq 1$ و $c \geq 1$

إذا كان $b = 2$ فان $ac > 1$ غير ممكن

إذا كان $b = 3$ فان $ac > \frac{9}{4}$

ومنه $(a; b; c) = (2; 3; 1)$ أو $(a; b; c) = (1; 3; 2)$ أو $(a; b; c) = (1; 3; 1)$

إذن عدد السحبات الممكنة بحيث المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حللين مختلفين في \mathbb{R} هي:

$$A_5^1 \cdot A_1^1 \cdot A_4^1 + A_4^1 \cdot A_1^1 \cdot A_5^1 + A_5^1 \cdot A_1^1 \cdot A_4^1 = 60$$

حل تمرين 2

من مؤسسة ثانوية تأهيلية تحتوي على n شخصا، نريد أن نختار مجلسا مكونا من p شخصا

$$\begin{aligned} & 2 \leq p \leq n \\ & -1 \end{aligned}$$

a. عدد المجالس الممكنة التي تضم المدير و الناظر هو C_{n-2}^{p-2}

b. عدد المجالس الممكنة التي لا تضم المدير و الناظر هو C_{n-2}^p

c. عدد المجالس الممكنة التي تضم المدير أو الناظر و ليس الاثنين معا هو

$$C_{n-2}^{p-1} + C_{n-2}^{p-1} = 2C_{n-2}^{p-1}$$

$$2- نستنتج أن C_n^p = C_{n-2}^p + 2C_{n-2}^{p-1} + C_{n-2}^{p-2}$$

عدد المجالس المكونة من p شخص من بين n شخص هو C_n^p

لدينا المجالس المكونة من p شخص من بين n شخص هو مجموع المجالس الممكنة التي تضم المدير و الناظر و المجالس الممكنة التي لا تضم المدير و الناظر و المجالس الممكنة التي تضم المدير أو الناظر و ليس الاثنين معا.

$$\text{إذن } C_n^p = C_{n-2}^p + 2C_{n-2}^{p-1} + C_{n-2}^{p-2}$$

حل تمرين 3

$$1) \text{ نبين بالترجع أن } \sum_{p=1}^{p=n} C_{p+1}^2 = C_{n+2}^3$$

$$\text{من أجل } n=1 \text{ لدينا } C_{1+2}^3 = C_3^3 = 1 \quad \text{إذن العبرة صحيحة من أجل } n=1$$

$$\text{لنفترض أن } \sum_{p=1}^{p=n+1} C_{p+1}^2 = C_{n+3}^3 \quad \text{لنبين أن } \sum_{p=1}^{p=n} C_{p+1}^2 = C_{n+2}^3$$

$$\sum_{p=1}^{p=n+1} C_{p+1}^2 = C_{n+1+1}^2 + \sum_{p=1}^{p=n} C_{p+1}^2 = C_{n+2}^2 + C_{n+2}^3 = C_{n+3}^3$$

$$\text{إذن } \sum_{p=1}^{p=n} C_{p+1}^2 = C_{n+2}^3$$

$$2) \text{ نستنتج قيمة المجموع : } S = (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 4) + \dots + (n(n+1))$$

$$C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + \dots + C_{n+1}^2 = C_{n+2}^3 \quad \text{لدينا}$$

$$\frac{(1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 4) + \dots + (n(n+1))}{2} = C_{n+2}^3 \quad \text{أي}$$

$$S = 2C_{n+2}^3 = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad \text{إذن}$$

حل تمرين 4

ليكن $n \in \mathbb{N}$ حيث $n \geq 2$. نعتبر الدالة f المعرفة بـ $f(x) = (x+1)^n$

بعد حساب $f'(x)$ بطريقتين مختلفتين

$$C = \sum_{k=0}^{k=n} (2k+1)C_n^k \quad B = \sum_{k=0}^{k=n} (k+1)C_n^k \quad A = \sum_{k=1}^{k=n} kC_n^k$$

نستنتج المجامع التالية

$$f'(x) = n(x+1)^{n-1} \quad f(x) = (x+1)^n$$

لدينا

$$(f(x))' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k x^k \right)' = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1}$$

لدينا

$$n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k = A$$

فان $x=1$ يوضع

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1}$$

ومنه

$$B = \sum_{k=0}^{k=n} (k+1)C_n^k = n + \sum_{k=1}^{k=n} k C_n^k + \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k = n + n2^{n-1} + 2^n$$

$$C = \sum_{k=0}^{k=n} (2k+1)C_n^k = 2n + 2 \sum_{k=1}^{k=n} k C_n^k + \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k = 2n + n2^n + 2^n$$

حل تمرين 5

صندوق يحتوي على 5 كرات حمراء و 5 كرات بيضاء و 5 كرات خضراء في كل لون الكرات تحمل الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . نسحب بالتناوب و بدون إخلال خمس كرات من الصندوق.

1- نحسب عدد السحبات الممكنة للحصول على 3 كرات بيضاء و كرتين حمراوين.

$$\text{عدد هذه السحبات هو } C_5^3 A_5^3 A_5^2 = \frac{60}{3!} \times 60 \times 20 = 12000$$

2- نحسب عدد السحبات الممكنة للحصول على 5 كرات تحقق الشرطين:

- كرة واحدة تحمل الرقم 5 .

- أربع كرات فقط من اللون الأخضر

$$\text{عدد هذه السحبات هو } C_5^1 A_2^1 A_4^4 + C_5^1 A_1^1 C_4^3 A_4^3 A_8^1 = 240 + 160 = 400$$

حل تمرين 6

1- عدد الإمكانيات الممكنة هو $A_{15}^3 = 15 \times 14 \times 13 = \dots$

2- عدد الإمكانيات التي يكون فيها الكاتب العام والأمين من الإناث هو $A_9^4 + A_9^2 \times A_6^2$

حل تمرين 7

لتكن E و F مجموعتين غير فارغتين و منفصلتين بحيث $\text{card}E = \text{card}F = n$

3- نبين أن عدد الأزواج $(X;Y)$ من $X \cup Y = E$ بحيث $P(E) = [P(X;Y)]^2$ و $n \geq 2$ هو 3^n

نضع $A \in P(X)$ بما أن $\text{card}X = p$ حيث $X = \bar{X} \cup A$ فان $X \cup Y = E$

ومنه عدد المجموعات الجزئية Y حيث $X \cup Y = E$ هو عدد عناصر $P(Y)$ أي 2^p

و بما أن عدد أجزاء E التي رئيسها p هو C_n^p فان عدد الأزواج $(X;Y)$ حيث $\text{card}X = p$

$$C_n^p 2^p$$

و حيث أن $p \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ فان عدد الأزواج $(X;Y)$ حيث $X \cup Y = E$ هو

$$\sum_{p=0}^n C_n^p 2^p = (1+2)^n = 3^n$$

4- نحسب بطريقتين مختلفتين عدد أجزاء $E \cup F$ المكونة من n عنصر. و نستنتج أن

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{k=n} (C_n^k)^2$$

- بما أن $C_{2n}^n = 2n$ فان عدد أجزاء $E \cup F$ المكونة من n عنصر هو

- كل جزء من $E \cup F$ يكون مكون من k عنصر من E و $n-k$ عنصر من F حيث

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$k \in \{0;1;2;...;n\}$$

عدد الحالات الممكنة لاختيار جزء مكون من k عنصر من E هو

عدد الحالات الممكنة لاختيار جزء مكون من $n-k$ عنصر من F هو

عدد أجزاء $E \cup F$ المكونة من n عنصر يحتوي على k عنصر من E و $n-k$ عنصر من F

$$k \in \{0;1;2;...;n\} \text{ حيث } C_n^k \times C_n^k = \left(C_n^k \right)^2 \text{ هو}$$

$$\sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k \right)^2 \text{ إذن عدد أجزاء } E \cup F \text{ المكونة من } n \text{ هو}$$

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k \right)^2 \text{ ومنه نستنتج أن}$$

$$\frac{n}{2} C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{n} k \left(C_n^k \right)^2 * \text{ نستنتج أن}$$

$$S = \sum_{k=0}^{n} k \left(C_n^k \right)^2 \text{ نضع}$$

$$S = 0 \cdot \left(C_n^0 \right)^2 + 1 \cdot \left(C_n^1 \right)^2 + \dots + (n-1) \cdot \left(C_n^{n-1} \right)^2 + n \cdot \left(C_n^n \right)^2$$

$$S = n \cdot \left(C_n^n \right)^2 + (n-1) \cdot \left(C_n^{n-1} \right)^2 + \dots + 1 \cdot \left(C_n^1 \right)^2 + 0 \cdot \left(C_n^0 \right)^2$$

$$C_n^{n-k} = C_n^k \text{ لأن } S = n \cdot \left(C_n^0 \right)^2 + (n-1) \cdot \left(C_n^1 \right)^2 + \dots + 1 \cdot \left(C_n^{n-1} \right)^2 + 0 \cdot \left(C_n^n \right)^2$$

$$2S = n \cdot \left(C_n^0 \right)^2 + n \cdot \left(C_n^1 \right)^2 + \dots + n \cdot \left(C_n^{n-1} \right)^2 + n \cdot \left(C_n^n \right)^2$$

$$2S = n \left(\left(C_n^0 \right)^2 + \left(C_n^1 \right)^2 + \dots + \left(C_n^{n-1} \right)^2 + \left(C_n^n \right)^2 \right) = n C_{2n}^n$$

$$\frac{n}{2} C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{n} k \left(C_n^k \right)^2 \text{ إذن}$$

حل تمرين 8

نحسب المجاميع التالية

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i} * \text{ نعلم أن}$$

$$S_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i = 0 \text{ ومنه } b=1 \text{ و } a=-1 \text{ نضع}$$

$$\frac{1}{i+1} C_n^i = \frac{1}{i+1} \times \frac{n!}{(n-i)! i!} = \frac{n!}{(n-i)!(i+1)!} = \frac{1}{n+1} \times \frac{(n+1)!}{(n-i)!(i+1)!} = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{i+1} * \text{ لدينا}$$

$$S'_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i+1} C_n^i = \sum_{i=0}^n \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{i+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n C_{n+1}^{i+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} C_{n+1}^i \text{ ومنه}$$

$$S'_n = \frac{1}{n+1} \left(-C_{n+1}^0 + \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i \right)$$

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$S_n' = \frac{1}{n+1} (-1 + 2^{n+1}) \quad \text{فإن} \quad \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i = 2^{n+1}$$

وحيث أن $C_n^i C_{n-i}^{p-i} = \frac{n!}{(n-i)! i!} \times \frac{(n-i)!}{(n-i-p+i)!(p-i)!} = \frac{n!}{i!} \times \frac{1}{(n-p)!(p-i)!} = \frac{n!}{(n-p)! p!} \times \frac{p!}{i!(p-i)!}$ لدينا أي أن $C_n^i C_{n-i}^{p-i} = C_n^p C_p^i$

$$S_{(n;p)} = \sum_{i=0}^p C_n^i \cdot C_{n-i}^{p-i} = \sum_{i=0}^p C_n^p C_p^i = C_n^p \sum_{i=0}^p C_p^i = 2^p C_n^p = 2^p \times \frac{n!}{(n-p)! p!}$$

حل تمرين 9

لتكن E مجموعة متميزة حيث $\text{card } E = n \geq 2$

نحدد عدد التطبيقات f المعرفة من E نحو E حيث f (زوجي)

F نعتبر $f(E) = \left\{ y_1, y_2, \dots, y_{\frac{n}{2}} \right\} = F$ حيث $y_i = \{\varphi / \forall x \in E; \varphi(x) \neq y_i\}$ و $f(E)$ تطبيق من E نحو F لدينا $F - \{y_i\}$ تطبيق من E نحو $F \Leftrightarrow \varphi \in Y_i$

عدد التطبيقات المعرفة من E نحو $F - \{y_i\}$ هو

$f \in \overline{Y_i} \Leftrightarrow E$ في y_i تقبل على الأقل ساقب بالتطبيق f

كل عنصر من F يقبل على الأقل ساقب بـ f في E (أي f شمولي من E نحو F)

$$f \in \bigcap_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} \overline{Y_i} \Leftrightarrow (F$$

ومنه عدد التطبيقات الشمولية من E نحو F هو

لدينا عدد التطبيقات المعرفة من E نحو F هو

$$\text{card} \left(\bigcap_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} \overline{Y_i} \right) = \text{card} \left(\bigcup_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} \overline{Y_i} \right) = \left(\frac{n}{2} \right)^n - \text{card} \left(\bigcup_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} Y_i \right)$$

ومنه $F - \{y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_k}\}$ تطبيق من E نحو $\varphi \Leftrightarrow \varphi \in Y_{i_1} \cap Y_{i_2} \cap \dots \cap Y_{i_k}$

$$\text{card} (Y_{i_1} \cap Y_{i_2} \cap \dots \cap Y_{i_k}) = \left(\frac{n}{2} - k \right)^n$$

$$\text{card} \left(\bigcup_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} Y_i \right) = \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^{k-1} \left(\sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k < \frac{n}{2}} \text{card} (Y_{i_1} \cap Y_{i_2} \cap \dots \cap Y_{i_k}) \right)$$

$$\text{card} \left(\bigcup_{i \in \left[1; \frac{n}{2} \right]} Y_i \right) = \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^{k-1} C_{\frac{n}{2}}^k \left(\frac{n}{2} - k \right)^n \quad \text{ومنه } 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k < \frac{n}{2}$$

$$\left(\frac{n}{2} \right)^n - \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^{k-1} C_{\frac{n}{2}}^k \left(\frac{n}{2} - k \right)^n \quad \text{إذن عدد التطبيقات الشمولية من } E \text{ نحو } F \text{ هو}$$

لدينا $C_n^{\frac{n}{2}}$ لاختيار مجموعة F حيث $F \subset E$; $cardF = \frac{n}{2}$

إذن عدد التطبيقات من E نحو $f(E)$ حيث $card[f(E)] = \frac{n}{2}$ هو

$$C_n^{\frac{n}{2}} \left[\left(\frac{n}{2} \right)^n - \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (-1)^{k-1} C_{\frac{n}{2}}^k \left(\frac{n}{2} - k \right)^n \right]$$