

الحسابيات

I- قابلية القسمة في \mathbb{Z}

أنشطة

نظام 1 ليمكن n عدداً صحيحاً طبيعياً فردياً بين أن 8 يقسم $n^2 - 1$ لكل عدد صحيح طبيعي فردي n

الحل

ليكن n عدد صحيح طبيعي فردي أي يوجد k من \mathbb{N} حيث

$$n^2 - 1 = 4k(k+1) \quad \text{لدينا } n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$$

وحيث أن $(k+1)$ عدد زوجي (لأنه جداء عددين متتاليين)

$$n^2 - 1 = 8k \quad \text{فانه يوجد } k \text{ من } \mathbb{N} \text{ حيث } k(k+1) = 2k + 1 \text{ و بالتالي}$$

إذن 8 يقسم $n^2 - 1$

نظام 2

بين أن لكل n من \mathbb{N} العدد $n^3 - n$ يقبل القسمة على 3

الحل

$$n^3 - n = n(n-1)(n+1) \quad \text{لدينا}$$

ليكن n من \mathbb{N} و منه يوجد $k \in \mathbb{N}$ حيث $n = 3k + 1$ أو $n = 3k$ أو $n = 3k - 1$

$$n^3 - n = (3k+1)(3k)(3k+2) \quad \text{أو} \quad n^3 - n = 3k(3k-1)(3k+1)$$

$$n^3 - n = (3k+2)(3k+1)(3k+3) = 3(3k+2)(3k+1)(k+1) \quad \text{أو}$$

وفي جميع هذه الحالات $n^3 - n = 3k'$ حيث $k' \in \mathbb{N}$

إذن $n^3 - n$ يقبل القسمة على 3

نظام 3

أنشر $10^6 - 1$ ثم استنتج باقي القسمة للعدد 999999^3 على 5

نظام 4

حدد الأرقام x و y بحيث العدد الصحيح الطبيعي $11x1y$ قابل للقسمة على 28

1- تعريف

ليكن a و b من \mathbb{Z} نقول إن b يقسم a و نكتب b/a إذا وجد k في \mathbb{Z} حيث $a = kb$

$$(a; b) \in \mathbb{Z}^2 \quad b/a \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad a = kb$$

2- ملاحظات

- إذا كان b يقسم a فإننا نقول إن b قاسم لـ a أو a مضاعف لـ b

- ليكن $b \in \mathbb{Z}$ مجموعه مضاعفات العدد b هي المجموعة $b \cdot \mathbb{Z} = \{k \cdot b / k \in \mathbb{Z}\}$

- ليكن $b/a \Rightarrow |b| \leq |a|$: $b \in \mathbb{Z}$ $a \in \mathbb{Z}^*$

" b/a " خاصيات العلاقة "

$\forall a \in \mathbb{Z} \quad a/a$ -*

$\forall (a; b; c) \in \mathbb{Z}^3 \quad b/a \quad \begin{cases} b/a \\ a/c \end{cases} \Rightarrow b/c$ -*

$\forall (a; b; c) \in \mathbb{Z}^3 \quad \begin{cases} b/a \\ a/b \end{cases} \Rightarrow |a| = |b|$ -*

$$\forall (a; b; c) \in \mathbb{N}^3 \quad \begin{cases} b/a \\ a/b \end{cases} \Rightarrow a = b$$

تمرين

- 1- بين أن $\forall (a; b) \in \mathbb{Z}^2 \quad b/a \Leftrightarrow a \cdot \mathbb{Z} \subset b \cdot \mathbb{Z}$
- 2- بين أن $\forall (a; x_1; x_2; y_1; y_2) \in \mathbb{Z}^5 \quad a/(x_1 - y_1) \wedge a/(x_2 - y_2) \Leftrightarrow a/(x_1 x_2 - y_1 y_2)$

II- القسمة الأقلية في \mathbb{Z}

1- القسمة الأقلية في \mathbb{N}

مبرهنة

ليكن $a \neq b$ من \mathbb{N} حيث $0 \leq r < b$ حيث $a = bq + r$ من \mathbb{N}^2 حيث يوجد زوج وحيد $(q; r)$ من

اصطلاحات

العملية التي تمكنا من تحديد $(q; r)$ بحيث $a = bq + r$ حيث $0 \leq r < b$ تسمى القسمة الأقلية لـ a على b في \mathbb{N} .

العدد a يسمى المقسم و العدد b يسمى المقسوم عليه و العدد q الخارج و r الباقي.

2- القسمة الأقلية في \mathbb{Z}

مبرهنة

ليكن a من \mathbb{Z} و b في \mathbb{N}^* حيث $0 \leq r < b$ حيث $a = bq + r$ من $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ حيث يوجد زوج وحيد $(q; r)$ من

اصطلاحات

العملية التي تمكنا من تحديد $(q; r)$ من $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ بحيث $a = bq + r$ حيث $0 \leq r < b$ تسمى القسمة الأقلية لـ a على b في \mathbb{Z} .

العدد a يسمى المقسم و العدد b يسمى المقسوم عليه و العدد q الخارج و r الباقي

تمرين

حدد الأعداد الصحيحة النسبية x بحيث يكون للقسمة الأقلية لـ x على 7 خارج q و باقي q^2

تمرين

بين إذا كان للقسمة الأقلية لـ a على b و القسمة الأقلية لـ a' على b نفس الخارج q و كان b فإن q خارج القسمة الأقلية لـ x على b

- الأعداد الأولية

1- تعاريف

أ- القواسم الفعلية لعدد صحيح نسبي

تعريف

ليكن $a \in \mathbb{Z}$
نقول إن العدد d قاسم فعلي للعدد a إذا و فقط إذا كان d يقسم a و $d \notin \{-1; 1; -a; a\}$

أمثلة

- القواسم الفعلية للعدد 6 هي 2 و -2 و 3 و -3
- لدينا $D_7 = \{1; -1; 7; -7\}$ العدد 7 لا يقبل قواسم فعلية

ب- الأعداد الأولية

تعريف

ليكن $a \in \mathbb{Z}$
نقول إن العدد a أولي إذا و فقط إذا كان a يخالف 1 و -1 و ليس له قواسم فعلية
 $|a| \neq 1 \Leftrightarrow D_a = \{1; -1; a; -a\}$

نرمز لمجموعة الأعداد الأولية بـ P

2- خصائص

- أ- إذا كان p و q عددين أوليين و $|q| \neq |p|$ فان قاسمهما المشترك الأكبر هو 1 (العكس غير صحيح)
- ب- ليكن a عدداً غير أولي في \mathbb{Z}^* ويختلف 1 و -1 . أصغر قاسم فعلي موجب للعدد a هو عدد أولي
- د- مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية

البرهان

نبرهن أن مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية

لتكن P^+ مجموعة الأعداد الأولية الموجبة

$$2 \in P^+ \text{ لأن } P^+ \neq \emptyset$$

لنفترض أن P^+ منتهية ولتكن p أكبر عنصر من P^+ . لنتعتبر $m = p! + 1$ لدينا $p \mid m$.
و منه $m \notin P^+$ أي m ليس أولياً وبالتالي للعدد m قاسم أولي q ومنه $q \leq p$
 $q \leq p$ يستلزم q يقسم $p!$ لأن $(p!) \mid q$ أحد عوامل $(p!)$ وهذا يتناقض مع كون q أولياً

و منه P^+ غير منتهية إذن P غير منتهية

-3 طريقة عملية لتحديد الأعداد الأولية

مبرهنة

ليكن $n \geq 2$ و $n \in \mathbb{N}$

إذا كان n غير أولي فانه يوجد عدد أولي موجب p يقسم n و $p^2 \leq n$

البرهان

ليكن $n \in \mathbb{N}$ و $n \geq 2$ و n غير أولي ولتكن p أصغر قاسم فعلي موجب لـ n إذن p أولي ومنه يوجد

$$n = pk \text{ حيث } k \in \mathbb{N}^*$$

بما أن $n = kp$ فإن $1 < p < n$ إذن k قاسم فعلي موجب للعدد n وبالتالي $k \leq n$

$$p^2 \leq pk = n \text{ إذن}$$

ملاحظة

ليكن $n \geq 2$ و $n \in \mathbb{N}$

لتتأكد من أن n هل أولي أم لا . نرى هل يقبل القسمة على أحد الأعداد الأولية p حيث $n \leq p^2$

❖ فإذا كان يقبل القسمة على أحدهم فان n غير أولي

❖ وإذا كان لا يقبل القسمة على أي واحد منها فان n عدد أولي

(عملياً تتوقف عندما تكون $n > p^2$)

مثال العدد 179 لا يقبل القسمة على أي عدد من الأعداد الأولية التالية 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13

$$17^2 = 289 ; 13^2 = 169$$

-4 خصائص

خاصية

*- إذا كان عدد أولي يقسم جداء أعداد صحيحة نسبية فانه يقسم أحد عوامل هذا الجداء

نتيجة

لتكن p_1 و p_2 و p_n أعداد أولية موجبة و p عدداً أولياً

$$p / p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n \Rightarrow \exists i \in \{1; 2; \dots; n\} \quad p = p_i$$

-5 التفكير إلى جداء من عوامل أولية

-1 مبرهنة

كل عدد صحيح نسبي n غير منعدم ومخالف لـ 1 و -1 يمكن كتابته بكيفية وحيدة على شكل

$$n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k} \text{ حيث } p_1 \text{ و } p_2 \text{ و } p_n \text{ أعداد أولية مختلفة مثنى مثنى و } \alpha_1 \text{ و } \alpha_2 \text{ و } \alpha_n \text{ أعداد صحيحة طبيعية غير منعدمة و } \varepsilon = \pm 1$$

ملاحظة عندما نكتب n على شكل $n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$ فإننا نقول اننا فكينا n إلى جداء

عوامل أولية

مثال فك العدد 1752 إلى جداء عوامل أولية

ليكن $n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$ أعداد أولية
يكون عدد d قاسماً للعدد n إذا وفقط إذا كان تفكيك d إلى عوامل جداء أولية على شكل

$$d = \varepsilon p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_k^{\beta_k}$$

حيث $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ لـ i من $\{1; 2; \dots; k\}$

نتيجة 2

ليكن $n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$ أعداد أولية
يكون عدد m مضاعفاً للعدد n إذا وفقط إذا كان تفكيك m إلى عوامل جداء أولية على شكل

$$d = \varepsilon p_1^{\lambda_1} \times p_2^{\lambda_2} \times \dots \times p_k^{\lambda_k}$$

حيث $0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i$ لـ i من $\{1; 2; \dots; k\}$

- القاسم المشترك الأكبر IV

نرمز لمجموعة قواسم العدد الصحيح النسبي a بالرمز D_a

1- تعريف

ليكن a و b من \mathbb{Z}^*
القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو أكبر قاسم مشترك موجب قطعاً لـ a و b يرمز له $a \wedge b$.

$$\delta = a \wedge b \Leftrightarrow \begin{cases} \delta \in D_a \cap D_b \\ \forall x \in D_a \cap D_b \quad x \leq \delta \end{cases}$$

- خصائص 2

ليكن a و b و c من \mathbb{Z}^*

$$a \wedge b = b \wedge a$$

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

$$a \wedge a = |a|$$

مثال $48 \wedge 60 = 12$

3- خوارزمية أقليدس أو طريقة "القسمات المتتالية" لتحديد القاسم المشترك
أ- ملاحظة

$$\forall a \in \mathbb{Z}^* \quad D_a = D_{-a} \quad *$$

ب- ومنه تحديد القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين نسبيين
 $a \wedge b = |a| \wedge |b|$ *
يرجع إلى تحديد القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين.

ب- ليكن a و b من \mathbb{N}^*
- إذا كان b/a فان

- إذا كان b لا يقسم a فانه يوجد زوج وحيد $(q; r)$ من $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ حيث $a = bq + r$ و
بما أن $r = a - bq$ فان كل قاسم مشترك لـ a و b يقسم r
و بالتالي قاسم قاسم مشترك لـ a و b هو قاسم مشترك لـ b و أي r أـ يـ قـ يـ عـ كـ سـ يـاـ كلـ قـ اـ سـ مـ شـ تـ رـ كـ لـ b و r يـ قـ يـ عـ كـ سـ يـاـ كلـ قـ اـ سـ مـ شـ تـ رـ كـ لـ b و r يـ قـ يـ عـ كـ سـ يـاـ كلـ قـ اـ سـ مـ شـ تـ رـ كـ لـ b و r هو قاسم مشترك لـ a و أي b و منه كل قاسم مشترك لـ b و r هو قاسم مشترك لـ a و أي b و إذن $a \wedge b = r \wedge b$ و بالتالي $D_a \cap D_b = D_r \cap D_b$

تمهيدة

ليكن a و b من \mathbb{N}^* بحيث b لا يقسم a و r باقي القسمة الأقلدية لـ a على b

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

- ❖ بما أن δ/a و δ/b فان δ/p و منه $\delta \leq p$
- ❖ بإيجاز القسمة لـ a على p نحصل على $a = pq + r$; $0 \leq r < p$
- ❖ ومنه $r = a - q(au_0 + bv_0) = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$
- إذا كان $r > 0$ فان $r \in A$ و منه $r \geq p$ وهذا يتناقض مع كون $r < p$
- و بالتالي $r = 0$ أي p/a وبينفس الطريقة نبرهن أن p/b
- و منه p قاسم مشترك لـ a و b وبالتالي $p \mid \delta$ $\geq p$
- لدينا $\delta = p$ و $\delta \geq p$ إذن $\delta \leq p$

ب- استنتاجات

* من البرهان السابق نستنتج $\delta = a \wedge b$ هو أصغر عدد موجب قطعاً من المجموعة $B = \{n \in \mathbb{Z}^* / n = au + bv ; (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}$

* بما أن δ قاسم مشترك لـ a و b فإن أي قاسم لـ δ يقسم a و b

عكسياً إذا كان c قاسم مشترك لـ a و b فإن $c \mid \delta$

بما أن $\delta = au + bv$ فإنه $\delta = a \wedge b$ ومنه $\delta = (k_1u + k_2v)c$ أي c يقسم δ

مبرهنة

ليكن a و b من \mathbb{Z}^* و مجموعة قواسم δ هي مجموعة القواسم المشتركة لـ a و b
 $(D_a \cap D_b = D_\delta)$

نتيجة

إذا كان a و b و c أعداد من \mathbb{Z} فإن $a \wedge b = \delta \Rightarrow ca \wedge cb = |c|\delta$

خاصية

ليكن a و b من \mathbb{Z}^* حيث $a = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_n^{\alpha_n}$ و $b = p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_k^{\beta_k}$ حيث p_1, p_2, \dots, p_n أعداد أولية

القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو العدد $\delta = p_1^{\lambda_1} \times p_2^{\lambda_2} \times \dots \times p_k^{\lambda_k}$ حيث $\lambda_i = \inf\{\alpha_i, \beta_i ; i = 1, 2, \dots, k\}$

مثال حدد $-180 \wedge 1170$

2- القاسم المشترك الأكبر لعدة أعداد

تعريف

أكبر عدد صحيح طبيعي يقسم في آن واحد a_1 و a_2 و a_3 و و a_k يسمى القاسم المشترك الأكبر لـ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$

مثال $12 \wedge -18 \wedge 15 = 3$

نتيجة

إذا كان δ هو القاسم المشترك الأكبر لـ a_1 و a_2 و a_3 و و a_k فإنه توجد اعداد $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k$ من \mathbb{Z} حيث

$$\sum_{i=1}^{i=k} \alpha_i a_i = \delta$$

VI- المضاعف المشترك الأصغر

تعريف

ليكن $(a; b) \in \mathbb{Z}^{*2}$ المضاعف المشترك الأصغر لـ a و b هو أصغر مضاعف مشترك موجب لـ a و b نرمز له بـ $a \vee b$

2- خصائص

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma :

- أ - ليكن a و b و c من \mathbb{Z}^*

$$a \vee b = b \vee a$$

$$(a \vee b)|c| = ac \vee bc$$

$$a \wedge a = |a|$$

$$b/a \Leftrightarrow a \vee b = |a|$$

- ب - ليكن a و b من \mathbb{Z}^*

كل مضاعف مشترك لـ a و b هو مضاعف للعدد m

ج - مبرهنة

ليكن a و b من \mathbb{Z}^* و $a \wedge b = \delta$ و $a \vee b = m$

$$m\delta = |ab|$$

نتيجة

ليكن a و b من \mathbb{Z}^*

$$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a \vee b = |ab|$$

خاصية

ليكن a و b من \mathbb{Z}^* حيث $b = \varepsilon p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_k^{\beta_k}$ و $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$ و حيث p_1, p_2, \dots, p_n أعداد أولية

المضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b هو العدد

$$\text{حيث } \{1; 2; \dots; k\} \text{ و } \lambda_i = \sup(\alpha_i; \beta_i)$$

مثال حدد $-180 \vee 1170$

3- المضاعف المشترك لعدة أعداد

تعريف

\mathbb{Z}^* و a_1, a_2, \dots, a_k أعداد من

أصغر مضاعف مشترك موجب للأعداد a_1 و a_2, \dots, a_k و يسمى المضاعف المشترك الأصغر لـ a_1, a_2, \dots, a_k

و استنتاج عدد قواسم عدد صحيح نسبي

III- الموافقة بتردد n

1- تعريف

ليكن a و b من \mathbb{Z} و n من \mathbb{N}

نقول إن a يوافق b بتردد n و نكتب $a \equiv b \pmod{n}$ إذا كان n يقسم

$$\forall (a; b) \in \mathbb{Z}^2 \quad a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad a - b = kn$$

2- خصيات العلاقة " الموافقة بتردد n "

أ - $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \equiv a \pmod{n}$ نقول إن العلاقة " الموافقة بتردد n " انعاكسية

ب - $\forall (a; b) \in \mathbb{Z} \quad a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$ تمانلية

ج - $\forall (a; b) \in \mathbb{Z} \quad (a \equiv b \pmod{n}) \text{ et } (b \equiv c \pmod{n}) \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$ متعدية

تلخص الخصيات أ و ب و ج بقولنا إن العلاقة " الموافقة بتردد n " علاقة تكافؤ

د - خاصية

ليكن a و b من \mathbb{Z} و n من \mathbb{N}

و $a \equiv b \pmod{n}$ تكافئ a و b لهما نفس باقي القسمة الأقلية على n

البرهان

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

ليكن a و b من \mathbb{Z} و n من \mathbb{N} بحيث $0 \leq r_2 < n$ مع $b = nq_2 + r_2$ و $a = nq_1 + r_1$

إذا كان a و b لهما نفس باقي القسمة الأقلية على n أي $r_1 = r_2$ فان $a - b = n(q_1 - q_2)$ أي أن $a \equiv b \pmod{n}$

عكسيا إذا كان $a \equiv b$ فانه يوجد k من \mathbb{Z} حيث $a - b = nk$
 $r_1 - r_2 = (k - q_1 - q_2)n$ أي n يقسم $r_1 - r_2$
 $|r_1 - r_2| < n$ و منه $0 \leq r_2 < n$ و $0 \leq r_1 < n$ ولدينا
 $r_1 = r_2$ أي $r_1 - r_2 = 0$ وبالتالي

3- المجموعة $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\forall (a; n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad \exists (q; r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad a = nq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < n \quad - *$$

$$\forall (a; n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad \exists r \in \mathbb{N} \quad a \equiv r \pmod{n} \quad \text{et} \quad r \in \{0; 1; \dots; n-1\} \quad -$$

- المجموعة $\{x \in \mathbb{Z} / x \equiv r \pmod{n}\}$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية التي لها نفس الباقي r

في القسمة الأقلية على n نرمز لها بـ \bar{r}

المجموعة \bar{r} تسمى صنف تكافؤ r بالنسبة للعلاقة " الموافقة بتردد n " في

$$x \in \bar{r} \Leftrightarrow x \equiv r \pmod{n} \quad -$$

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad \exists r \in \{0; 1; \dots; n-1\} / \quad \bar{a} \equiv \bar{r} \quad \text{أي } \forall a \in \mathbb{Z} \quad \exists r \in \{0; 1; \dots; n-1\} / \quad a \equiv r \pmod{n} \quad - *$$

- إذا كان $r' = \bar{r}$ و $0 \leq r' < n$ و $0 \leq r < n$ فإن $r = r'$

- $\forall (x; n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad \exists r \in \{0; 1; \dots; n-1\} / \quad x \in \bar{r}$ - *

$$\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2} \cup \dots \cup (\overline{n-1}) \quad \text{اذن}$$

المجموعة $\{\overline{0}; \overline{1}; \dots; \overline{n-1}\}$ يرمز لها بالرمز

عناصر $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ منفصلة مثنى مثنى

أمثلة

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 2k+1 \quad (k \in \mathbb{Z})\} \quad \text{و } \overline{0} = 2 \cdot \mathbb{Z} \quad \text{حيث} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}\} \quad *$$

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 7k+1 \quad (k \in \mathbb{Z})\} \quad \text{و } \overline{0} = 7 \cdot \mathbb{Z} \quad \text{حيث} \quad \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{2}; \overline{3}; \overline{4}; \overline{5}; \overline{6}\} \quad *$$

$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 7k+3 \quad (k \in \mathbb{Z})\} \quad \text{و } \overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 7k+2 \quad (k \in \mathbb{Z})\} \quad \text{و }$$

$$\overline{6} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 7k+6 \quad (k \in \mathbb{Z})\} \quad \text{و}$$

$$\text{في } 532 \equiv 4 \pmod{7} \quad \text{لدينا } \overline{532} = \overline{4} \quad \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

$$-36 \equiv 6 \pmod{7} \quad \overline{-36} = \overline{6}$$

4- انسجام العلاقة " الموافقة بتردد n " مع الجمع والضرب

أ- خاصية

ليكن x و y و z و t و n من \mathbb{N} و $x + z \equiv y + t \pmod{n}$ فان $x \equiv y \pmod{n}$ و $z \equiv t \pmod{n}$

إذا كان $x \times z \equiv y \times t \pmod{n}$ فان $x \equiv y \pmod{n}$ و $z \equiv t \pmod{n}$

إذا كان $x \equiv y \pmod{n}$ و $z \equiv t \pmod{n}$ فان $x \times z \equiv y \times t \pmod{n}$

نقول إن العلاقة " الموافقة بتردد n " منسجمة مع الجمع والضرب

ب- نتائج

$$\overline{r+r'} = \overline{r} + \overline{r'} \quad \text{نكتب} \quad x \times x' \in \overline{r \times r'} \quad \text{فان } x' \in \overline{r'} \quad x \in \overline{r} \quad \text{و } \overline{r \times r'} = \overline{r} \times \overline{r'} \quad \text{و }$$

$$\forall (a; b) \in \mathbb{Z}^2 \quad \forall (p; n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N} \quad a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^p \equiv b^p \pmod{n} \quad - *$$

أمثلة

$$\overline{3} \times \overline{4} = \overline{12} = \overline{2} \quad , \quad \overline{0} + \overline{1} + \overline{2} + \overline{3} + \overline{4} = \overline{10} = \overline{0} \quad , \quad \overline{3} + \overline{4} = \overline{7} = \overline{2} \quad \text{في } \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

تمرين

$\overline{x} + \overline{5} = \overline{2}$ $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ حدد مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية x حيث في

تمرين

1- أعط جدول الجمع ثم الضرب في $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

2- بين أن العدد $3^{70} + 2^{70}$ قابلة للقسمة على 13

تمرين

3- بين أن $[n] \in \mathbb{N}$ $n(n^4 - 1) \equiv 0$

4- بين أن 17 يقسم $3 \times 5^{2n-1} + 2^{3n-2}$ لكل n من \mathbb{N}^*

3- ليكن n من \mathbb{N} ، حدد باوقي القسمة الأقلية للأعداد $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ على 4