


**الموضوع:** الدوران والشغل والطاقة الحركية  
القياس و المقاييس المرتبطة بكميات الماحدة

المستوى: الأولي بكالوريا مع 1

المادة: الفيزياء والكميات



(نعطي  $g = 9,8 N/kg$  و الاحتكاك مهملة)

## الفيزياء ١-٦ نقط

1- بواسطة محرك قدرته ثابتة  $P_1 = 10W$  نجعل قرصا متجانسا  $D_1$  شعاعه  $R_1 = 20cm$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2} m R_1^2$$

1-1 أحسب المدة الزمنية اللازمة ليصبح تردد القرص  $N_1 = 10 tr/s$

2- عند التردد  $N = 10 tr/s$  نجعل القرص  $D_1$  في حركة دائرية منتظمة و ذلك بوضعه في تماس

مع قرص آخر  $D_2$  شعاعه  $R_2 = 10cm$  ذي محور  $\Delta_2$  موازي  $\Delta_1$ .  $\Delta_1$  و  $\Delta_2$  يتذحران الواحد على الآخر بدون انزلاق (أنظر الشكل)

2-1 أحسب السرعة الزاوية  $w_2$  للقرص  $D_2$  بدلالة  $D_2$  و  $R_1$  و  $N_1$  ثم أحسب  $w_2$

3- نفترض أن القرص  $D_2$  يطبق قوة  $\vec{F}_1$  مماسة  $D_1$  و القرص  $D_1$  يطبق قوة  $\vec{F}_2$  مماسة  $D_2$  عند نقطة تماسهما

1-3-1 أحسب ممیزات القوتين  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$

1-3-2 بين أن  $P_1 = P_2$  حيث  $P_2$  قدرة القوة  $\vec{F}_2$ . ما الفائدة من هذا التركيب

1-3-3 لحشد سكين نضعه في تماس مع القرص  $D_2$  و نفترض أن الحركة دائرية منتظمة حدد شدة قوة المطبقة من طرف السكين على  $D_2$

1-4 أحسب السرعة الخطية لشارة لحظة انبعاثها من السكين

## التمرين 2 ٦,٧٥ نقط

1- من أعلى الحصو على الماء من البئر عمقه  $h = h_1 + h_2$  لملي صهريج سعته  $1m^3$ . نعلق دلو كتلته  $m = 5kg$  و سعته  $20L$  بحلب يمر من مجرى بكرة شعاعها  $r = 20cm$ . عند اللحظة  $t_0$  يطبق أحمد

قوة ثابتة شدتها  $F = 250N$  على الحبل لرفع الدلو بدون سرعة بدئية من قعر البئر. عند اللحظة  $t_1$

يرتفع مركز قصور الدلو بالمقدار  $h_1$  وتكون سرعته عند هذه اللحظة  $V_1 = 1m/s$  بعد أن تتجز البكرة 4 دورات. عند اللحظة  $t_2$  يصل الدلو إلى سطح الأرض بسرعته  $V_2 = 2m/s$  بعد أن تتجز 46 دورة

0,5-1 أرد القوى المطبقة على الدلو و البكرة

0,75-2 أحسب سرعة الزاوية للبكرة  $w$  عند اللحظة  $t_1$  و اللحظة  $t_2$

2-3 بتطبيق مبرهنة الطاقة الحرارية حدد توتر الحبل بين اللحظتين  $t_0$  و  $t_1$  ثم بين  $t_1$  و  $t_2$

1-4 بتطبيق مبرهنة الطاقة الحرارية حدد عزم قصور البكرة

2- عند تفريخ الدلو في الصهريج يرمي أحمد الدلو في البئر وذلك في سقوط حر و بدون سرعة بدئية و يخرج بنفس الكيفية السابقة

1-2 حدد سرعة الدلو لحظة اصطدامه على سطح الماء

1-2-1 حدد المدة الزمنية اللازمة لملي الصهريج، علما أن المدة الزمنية اللازمة لرفع الدلو إلى السطح هي  $\Delta t = 1min$  والمدة الزمنية اللازمة

لتفريخه هي  $5s$  و مدة الزمنية لاملاكه مهملة (نعطي  $P = 0,75P_a$  حيث  $f_a = 0,75f_a$  شدة دافعة أرخميدس في الماء و  $P$  وزن الدلو ممتنع)

## الكميات ٧ نقط

التمرين 1-1- لتحضير محلولا S نقوم بمزج  $V_1 = 50ml$  من محلول مائي لثرات النحاس II ( $Cu^{2+} + 2NO_3^- \rightarrow Cu(OH)_2 + NO_2 + H_2O$ ) ذي

تركيز  $C_1 = 0,25mol/l$  مع حجم  $V_2 = 100ml$  من محلول مائي لكlorور الصوديوم ( $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$ ) ذي تركيز  $C_2 = 0,10mol/l$ .

1-1 أحسب التركيز الموليء الفعلية للأيونات المتوادة في الخليط.

1-2 نضيف إلى محلول S كتلة  $m = 5g$  من كبريتات الصوديوم  $Na_2SO_4$  أحسب من ديد التركيز الموليء الفعلية في الخليط

التمرين 2-1- نذيب قرصا من الأسبرين الخالص  $C_9H_8O_4$  كتلته  $m = 500mg$  في كاس من الماء حجمه  $V = 100mL$

1-1 أحسب كمية مادة الأسبرين في قرص واحد

1-2 أحسب التركيز المولي للأسبرين ثم أستنتج تركيزه الكتلي

2- أنشاء الذوبان يتكون تنايي أكسيد الكربون. هذا الأخير قليل الذوبان في الماء. نجمع داخل مخارب حجما  $v = 70mL$

من غاز تنايي أوكسيد الكربون عند حرارة ثابتة  $T = 25^\circ C$  و تحت ضغط  $P = 10^5 Pa$

1-1 لماذا تنايي أوكسيد الكربون قليل الذوبان في الماء

1-2 أحسب كمية مادة الغاز المجتمع

$$\text{نعطي } R = 8,32 Pa.m^3 / K.mol$$

حظ سعيد

