

نضيف كتلة $m=2,8g$ من برادة الحديد Fe إلى حجم $V=25mL$ من محلول حمض الكلوريدريك $(H^{+} + Cl^{-})_{(aq)}$ تركيزه المولي $C=1\text{mol/L}$

فيتخرج عن التفاعل الحاصل تكون أيونات الحديد Fe^{2+} وانطلاق غاز ثاني الهيدروجين H_2 .

1) اكتب معادلة التفاعل الحاصل ثم حدد كمية المادة البدنية لكل من المتفاعلين .

2) أنشئ جدول تقدم التفاعل وحدد المتفاعل المحد.

3) أوجد كتلة الحديد المتبقية عند نهاية التفاعل.

4) ما حجم غاز ثاني الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل.

5) حدد كتلة الحديد المتفاعلة .

6) ما كتلة الحديد البدنية التي كان يجب استعمالها لكي يكون الخليط ستوكيميتريا؟ نعطي : $M(Fe)=56\text{g/mol}$

نغر صفيحة من الزنك في محلول مائي لتراث الفضة حجمه $V=100mL$ وتركيزه $C=0,1\text{mol/L}$ فنحصل على توضع طبقة من الفضة على الجزء المغمور من الصفيحة مع تكون أيونات الزنك Zn^{2+} .

1) أعط نصف معادلة التفاعل الحاصل لكل من المزدوجتين Zn^{2+}/Zn و Ag^{+}/Ag . ثم استنتج حصيلة التفاعل.

2) حدد كمية مادة الفضة البدنية .

3) علما أن الزنك استعمل بوفرة ، ارسم جدول تقدم التفاعل وحدد قيمة التقدم الأقصى.

4) احسب كتلة الفضة المتوضعة عند نهاية التفاعل على صفيحة الزنك.

5) أوجد كتلة الزنك المتفاعلة .

6) ما تركيز أيونات الزنك في محلول المحصل عليه عند نهاية التفاعل .

نعطي : $M(Zn)=65,4\text{g/mol}$ ، $M(Ag)=107,9\text{g/mol}$.

نضيف $0,28g$ من مسحوق برادة الحديد Fe إلى حجم $V=10mL$ من محلول مائي لحمض الكلوريدريك تركيزه $C=0,1\text{mol/L}$ ،

فتكون أيونات الحديد Fe^{2+} ويتتساعد غاز ثاني الهيدروجين H_2 .

1) ما طبيعة التفاعل الحاصل ؟

2) اكتب معادلته معينا النوع المؤكسد والنوع المخترل.

3) ارسم جدول تقدم التفاعل ثم حدد المتفاعل المحد؟

4) حدد حصيلة المادة عند نهاية التفاعل .

5) ما حجم غاز ثاني الهيدروجين المتتساعد في ظروف التجربة والتي هي: $(20^{\circ}\text{C}, 1\text{bar})$

نعطي: $I: M(Fe)=56\text{g/mol}$ ، $R=8,314\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

نمزج حجما $V_1=30mL$ من محلول مائي S_1 لبرمنقات البوتاسيوم $(K^{+} + MnO_4^{-})$ محمض تركيزه $C_1=0,2\text{mol/L}$ وحجم $V_2=50mL$ من

محلول S_2 لكبريتات الحديد $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تركيزه : $C_2=0,4\text{mol/L}$

1) اكتب نصف معادلتي التفاعل للمزدوجتين المتفاعلاتين .

2) ارسم جدول تقدم التفاعل ثم حدد حصيلة التفاعل للمجموعة عند نهاية التفاعل .

نضيف كتلة $m=2,12g$ من فلز النحاس إلى حجم $V=250mL$ من محلول مائي لحمض التريك $(H^{+} + NO_3^{-})$ تركيزه $C=0,2\text{mol/L}$ ، فيأخذ

المحلول تدريجيا لونا أزرقا ويتتساعد غاز أحادي أوكسيد الأزوت NO العديم اللون .

1) ما الاحتياطات اللازم اتخاذها أثناء هذه التجربة ؟

2) على ماذا يدل اللون الأزرق؟

3) اكتب معادلة التفاعل الحاصل

. $M(Cu)=63,5\text{g/mol}$

P= 1bar ، درجة الحرارة 20°C ، الضغط

:6) التمرن رقم

نلقي قطعة من الحديد (s) كتلتها $m=400\text{mg}$ في محلول مائي لحمض الكلوريدريك $(\text{H}^+ \text{(aq)} + \text{Cl}^- \text{(aq)})$ تركيزه $C=0,5\text{mol/L}$ وحجمه 100cm^3

1) اكتب نصف المعادلتين الالكترونية المقونتين بالمذووجتين المشاركتين في التفاعل.

2) أوجد المعدلة الحصيلة للتفاعل.

3) احسب كمية المادة البدئية للمتفاعلين.

4) ما حجم غاز ثاني الهيدروجين الناتج عند اختفاء قطعة الحديد كليا؟

نعطي : $V_M=24\text{L/mol}$ ، $M(Fe)=56\text{g/mol}$

:7) التمرن رقم

المذووجة : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ تشارك في التفاعل الذي يتحول خلاله الماء الأكسجيني H_2O_2 إلى غاز ثاني الأكسجين O_2 .

1) اكتب معادلة تفاعل الأكسدة احتزال.

2) هل حدث احتزال ام اكسدة الماء الأكسجيني خلال هذا التفاعل : علل جوابك.

3) نضيف للماء الأكسجيني ايونات اليودور I^- . تلون محلول تبين وجود ثاني اليود I_2 .

أ) هل الماء الأكسجيني مؤكسد ام مخترل في هذه التجربة؟ علل جوابك.

ب) علما أن المذووجتين المشاركتين في هذا التحول هما : I/I_2 اكتب معادلة التفاعل.

:8) التمرن رقم

تفاعل كتلة $m=0,56\text{g}$ من باردة الزنك مع محلول لحمض الكلوريدريك تركيزه $C=5\text{mol/L}$

1) اعط المذووجتين للمتفاعلين.

2) اكتب نصفي معادلتي الأكسدة احتزال.

3) أوجد معادلة تفاعل الأكسدة احتزال.

4) احسب كمية مادة الزنك البدئية.

5) أ) ما حجم حمض الكلوريدريك اللازم لتخفي كل برادة الزنك؟

ب) ما حجم الغاز الناتج عن التفاعل عند نهاية التفاعل علما أن الحجم المولى : $V_M=25\text{L/mol}$

ج) فسر الطريقة التجريبية المعتمدة لقياس حجم الغاز المنطلق.

التصحيح**:1) تصحيح التمرن رقم**

1) يعبر عن التحول الذي حصل لفلز الحديد بنصف المعادلة التالية :

$2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ بنصف المعادلة التالية :

و حصيلة التفاعل نحصل عليها بإضافة نصفي المعادلتين السابقتين :

$$n_o(\text{H}^+) = CV = 1 \times 25 \cdot 10^{-3} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{mol}$$

$$\text{كمية مادة الحديد البدئية} : n_o(\text{Fe}) = \frac{m}{M} = \frac{2,8}{56} = 5 \cdot 10^{-2} \text{mol}$$

2) جدول تقدم التفاعل:

$2\text{H}^+ + \text{Fe} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Fe}^{2+}$	معادلة التفاعل
---	----------------

كميات المادتين المتفاعلات					الحالات
$2,5 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-2}$	0	0	0	ح. البدنية
$2,5 \cdot 10^{-2} - 2x$	$5 \cdot 10^{-2} - x$	x	x	x	ح. التحول
$2,5 \cdot 10^{-2} - 2x_{\max}$	$5 \cdot 10^{-2} - x_{\max}$	x_{\max}	x_{\max}	x_{\max}	ح. النهاية

$$x_{\max} = \frac{2,5 \cdot 10^{-2}}{2} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \text{ومنه: } 2,5 \cdot 10^{-2} - 2x_{\max} = 0$$

$$x_{\max} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \text{ومنه: } 5 \cdot 10^{-2} - x_{\max} = 0$$

$$\text{ولدينا: } 5 \cdot 10^{-2} < 5 \cdot 10^{-2} \quad \text{إذن: } x_{\max} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \text{ومنه: } H^+ \text{ هو المتفاعل المحسوب}$$

$$(3) \text{ كمية مادة الحديد المتبقية عند نهاية التفاعل: } n(Fe) = 5 \cdot 10^{-2} - x_{\max} = 5 \cdot 10^{-2} - 1,25 \cdot 10^{-2} = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{ومنه كتلة الحديد المتبقية عند نهاية التفاعل: } m = M_{(Fe)} \times n_{(Fe)} = 56 \times 3,75 \cdot 10^{-2} = 2,1 \text{ g}$$

$$(4) \text{ كمية مادة غاز ثاني الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل: } n(H_2) = x_{\max} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{ومنه حجم غاز ثاني الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل: } V_{(H_2)} = n(H_2) \times V_M = 1,25 \cdot 10^{-2} \times 24 = 0,3L = 300 \text{ cm}^3$$

$$(5) \text{ كمية مادة الحديد المتفاعلة: } n(Fe) = x_{\max} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{ومنه كتلة الحديد المتفاعلة: } m = M_{(Fe)} \times n_{(Fe)} = 56 \times 1,25 \cdot 10^{-2} = 0,7 \text{ g}$$

$$m(Fe) = 2,8 - 2,1 = 0,7 \text{ g} \quad \text{أو بطريقة أخرى:}$$

$$(6) \text{ لتكن } n_o \text{ كمية مادة الحديد البدنية التي كان يجب استعمالها لكي يكون الخليط ستوكيميتري.}$$



معادلة التفاعل					
كميات المادة بالمول				النقدم	الحالات
$2H^+$	Fe	\rightarrow	H_2	0	ح. البدنية
$2,5 \cdot 10^{-2}$	n_o				ح. التحول
$2,5 \cdot 10^{-2} - 2x$	$n_o - x$	x	x	x	

ال الخليط ستوكيميتري يعني أن المتفاعلين كلها متساوية


$$n_o = x_{\max} = \frac{2,5 \cdot 10^{-2}}{2} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \Leftarrow \quad 2,5 \cdot 10^{-2} - 2x_{\max} = 0 \quad \text{و:} \quad n_o - x_{\max} = 0$$

$$n_o = x_{\max} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \Leftarrow$$

$$\text{إذن كتلة الحديد البدنية التي كان يجب استعمالها لكي يكون الخليط ستوكيميتري: } m = M(Fe) \times n_o = 56 \times 1,25 \cdot 10^{-2} = 0,7 \text{ g}$$



(1)



2) كمية مادة الفضة البدنية : $n_o(Ag) = CV = 0,1 \times 100 \times 10^{-3} = 10^{-2} mol$

3) جدول تقدم التفاعل :

$Zn + 2Ag^{+} \rightarrow 2Ag + Zn^{2+}$				معادلة التفاعل	
كميات المادة بالمول				الحالات	التقدم
n_o	0,01	0	0	0	ح. البدنية
$n_o - x$	$0,01 - 2x$	$2x$	x	x	ح. التحول
$n_o - x_{max}$	$0,01 - 2x_{max}$	$2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	ح. النهاية

بما أن الزنك مستعمل بوفرة فإن Ag^{+} هو المحد . إذن : $0,01 - 2x_{max} = 0$ ومنه : $0,01 - 2x_{max} = 0$

4) من خلال الجدول : كمية مادة الفضة الناتجة عند نهاية التفاعل : $n(Ag) = 2x_{max} = 2 \times 5 \cdot 10^{-3} = 10^{-2} mol$

$$m = M_{(Ag)} \times n_{(Ag)} = 107,9 \times 10^{-2} = 1,079 g \quad \leftarrow \quad \text{كتلة الفضة المتوضعة:} \quad n(Ag) = \frac{m}{M(Ag)} \quad \text{ونعلم أن:}$$

5) لدينا من خلال الجدول : كمية مادة الزنك المتفاعلة عند نهاية التفاعل : $n(Zn) = x_{max} = 5 \cdot 10^{-3} mol$

$$m = M(Zn) \times n = 65,4 \times 5 \times 10^{-3} = 0,327 g \quad \leftarrow \quad n(Zn) = \frac{m}{M(Zn)} \quad \text{ونعلم أن:}$$

6) تركيز أيونات الزنك في محلول المحصل عليه عند نهاية التفاعل: $[Zn^{2+}]_f = \frac{n_f(Zn^{2+})}{V} = \frac{x_{max}}{V} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-2} mol / L$

3) تصحيح التمرين رقم 3

1) تفاعل الأكسدة احتزال.



كمية مادة H^+ البدئية : $n_o(H^+) = CV = 0,1 \times 10 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} mol$

(2) جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل				
كميات المادة بالمول				الحالات
5,10 ⁻³	10 ⁻³	0	0	0 . ح. البدئية
5,10 ⁻³ - 2x	10 ⁻³ - x	x	x	x ح. التحول
5,10 ⁻³ - 2x _{max}	10 ⁻³ - x _{max}	x _{max}	x _{max}	x _{max} ح. النهاية

$$x_{max} = \frac{5,10^{-3}}{2} = 5,10^{-4} mol \text{ ومنه: } 5,10^{-3} - 2x_{max} = 0$$

إذا افترضنا أن H^+ هو المتفاعل المحد: $x_{max} = 10^{-3} mol$ ومنه: $10^{-3} - x_{max} = 0$

ولدينا: $5,10^{-4} < 10^{-3}$ إذن: $x_{max} = 5,10^{-4} mol$ وبالتالي فإن: H^+ هو المحد.

(4) حصيلة المادة:




معادلة التفاعل				
0	4,5.10 ⁻³ mol	5,10 ⁻⁴ mol	5,10 ⁻⁴ mol	ح. النهاية

(5) من خلال جدول تقدم التفاعل لدينا: كمية مادة H_2 الناتج عند نهاية التفاعل: $n_f(H_2) = 5,10^{-4} mol$

بتطبيق علاقة الغازات الكاملة $PV_{(H_2)} = n_{(H_2)} \cdot RT$ ومنه: $V_{(H_2)} = \frac{n_{(H_2)} \cdot RT}{P} = \frac{5,10^{-4} \times 8,314 \times 293}{10^5} = 12,18 \cdot 10^{-6} m^3 = 12,18 mL$

(4) تصحيح التمرين رقم 4

1) أيونات البوتاسيوم وايونات الكبريتات لا تتدخل في التفاعل وتفاعل الأكسدة احتزال يتم بين أيونات البرمنغتون وآيونات الحديد.



هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

(2) كمية مادة MnO_4^- البدئية : $n_o(\text{MnO}_4^-) = C_1 V_1 = 0,2 \times 30.10^{-3} = 6.10^{-3} \text{ mol}$

كمية مادة Fe^{2+} البدئية : $n_o(\text{Fe}^{2+}) = C_2 V_2 = 0,4 \times 50.10^{-3} = 0,02 \text{ mol}$

جدول تقدم التفاعل:

$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$						معادلة التفاعل	
كميات المادة بالمول						الحالات	التقدم
6.10^{-3}	بوفرة	0,02	0	0	بوفرة	0	ح. البدئية
$6.10^{-3} - x$	بوفرة	$0,02 - 5x$	x	$5x$	بوفرة	x	ح. التحول
$6.10^{-3} - x_{\max}$	بوفرة	$0,02 - 5x_{\max}$	x_{\max}	$5x_{\max}$	بوفرة	x_{\max}	ح. النهاية

إذا افترضنا أن MnO_4^- هو المتفاعل المحد : $x_{\max} = 6.10^{-3} \text{ mol}$ ومنه $6.10^{-3} - x_{\max} = 0$

$$x_{\max} = \frac{0,02}{5} = 4.10^{-3} \text{ mol}$$

إذا افترضنا أن Fe^{2+} هو المتفاعل المحد : $0,02 - 5x_{\max} = 0$ ومنه

ولدينا : $x_{\max} = 4.10^{-3} \text{ mol}$ إذن Fe^{2+} هو المحد .

حصيلة التفاعل للمجموعة عند نهاية التفاعل:

$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$						معادلة التفاعل	
2.10^{-3}	بوفرة	0	4.10^{-3}	2.10^{-2}	بوفرة		ح. النهاية




$n(K^+) = C_1 V_1 = 6.10^{-3} \text{ mol}$ بينما :

$n(SO_4^{2-}) = C_2 V_2 = 0,02 \text{ mol}$ و:

(5) تصحيح التمرين رقم 5

(1) في هذه التجربة يجب تفادي استنشاق غاز أحادي أوكسيد الأزوت الخانق المتصاعد .


(2) يدل اللون الأزرق على تكون أيونات النحاس Cu^{2+} .



$$n = \frac{m}{M} = \frac{2,12}{63,5} \approx 33,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

كمية مادة NO_3^- البدئية: $n_o(\text{NO}_3^-) = C V = 0,2 \times 250.10^{-3} = 5.10^{-2} \text{ mol}$

لرسم جدول تقدم التفاعل :



Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

5.10^{-2}	$33,4.10^{-3}$	غير محدد	0	0	بوفرة	0	ح.البدنية
$5.10^{-2} - 2x$	$33,4.10^{-3} - 3x$...	$2x$	$3x$	بوفرة	x	ح.التحول
$5.10^{-2} - 2x_{\max}$	$33,4.10^{-3} - 3x_{\max}$...	$2x_{\max}$	$3x_{\max}$	بوفرة	x_{\max}	ح.النهائية

إذا افترضنا أن NO_3^- محد: 0 أي: $5.10^{-2} - 2x_{\max} = 0$

إذا افترضنا أن Cu^- محد: 0 أي المحد $x_{\max} = 11,13.10^{-3} \text{ mol}$ إذن: $x_{\max} = 11,13.10^{-3} \text{ mol}$







ومن خلال الجدول يتضح انه عند نهاية التفاعل: $n_f(\text{NO}) = 2x_{\max} = 2 \times 11,13 = 22,26 \text{ mol}$

حصيلة المادة عند نهاية التفاعل:

$2\text{NO}_3^- + 3\text{Cu} + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{NO} + 3\text{Cu}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$						معادلة التفاعل
27,74 mol	0	...	22 mol	33,4 mol	بوفرة	ح.النهائية

بتطبيق علاقة الغازات الكاملة لدينا: $PV = nRT$ ومنه: $V_{(\text{NO})} = \frac{n_{(\text{NO})}RT}{P} = \frac{22,26 \times 8,314 \times 293}{10^5} = 535,9 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 535,9 \text{ mL}$

(6) تصحيح التمرين رقم 6



(4)

$2\text{H}^+ + \text{Fe} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Fe}^{2+}$				معادلة التفاعل	
كميات المادة بالمول				القدم	الحالات
5.10^{-2}	$0,714 \cdot 10^{-2}$	0	0	0	ح.البدنية
$5.10^{-2} - 2x$	$0,714 \cdot 10^{-2} - x$	x	x	x	ح.التحول
$5.10^{-2} - 2x_{\max}$	$0,714 \cdot 10^{-2} - x_{\max}$	x_{\max}	x_{\max}	x_{\max}	ح.النهائية

إذا افترضنا أن: H^+ هو المتفاعل المحد: $5 \cdot 10^{-2} - 2x_{\max} = 0$ ومنه: $x_{\max} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$



للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع: Talamid.ma

ولدينا : $0,714.10^{-2} < 2,5.10^{-2}$ إذن : $\text{Fe}_{\text{max}} = 0,714.10^{-2} \text{ mol}$ وبالتالي فإن : Fe هو المحد.

4) كمية مادة غاز ثانوي الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل: $n(H_2) = x_{\text{max}} = 0,7.10^{-2} \text{ mol}$


ومنه حجم غاز ثانوي الهيدروجين الناتج عن هذا التفاعل: $V_{(H_2)} = n(H_2) \times V_M = 0,714.10^{-2} \times 24 \approx 0,17L = 170 \text{ cm}^3$

:7) تصحيح التمرين رقم 7





2) تأكسد H_2O_2 لأن الأكسدة هي فقدان الألكترونات.

تفاعل أكسدة = فقدان الألكترونات. $2I^- \rightleftharpoons I_2 + 2e^- \quad (1)$



:8) تصحيح التمرين رقم 8



(4)

$$n_o(H^+) = CV$$

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{0,56}{56} = 10^{-2} \text{ mol}$$

5) جدول تقدم التفاعل:

Equation de la réaction		$2H^+ + Zn \rightarrow H_2 + Zn$			
états	avancement	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	0	CV	10^{-2}	0	0
Etat de	x	CV-2x	10^{-2}	x	x

transformation	هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma :				
Etat final	x_{\max}	$CV - 2x_{\max}$	$10^{-2} - x_{\max}$	x_{\max}	x_{\max}

$$x_{\max} = 10^{-2} \text{ mol} \iff 10^{-2} - x_{\max} = 0$$

حجم حمض الكلوريديك اللازم لتخفيف كل برادة الزنك يوافق 0

$$V = \frac{2x_{\max}}{C} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{5} = 4 \cdot 10^{-3} L = 4 mL \iff$$

KKK 'D7 %A5

ذ.عبد الكريم اسبيرو