

| | | |
|-------------|---------------------|--|
| 1BSM | <u>Mathématique</u> |  Anisse Groupes Scolaires |
| Trimestre 1 | Contrôle 2 | 2016/11/23 |

Durée : 2h

Exercice 1: (4.5 Points)

Soit f une application définie de $\mathbb{R} - \{2\}$ vers \mathbb{R} par :
$$f(x) = \frac{3x+5}{x-2}$$

1. Montrer que f est une application injective. 2pts
2. Déterminer : $f^{-1}(5)$ 0.5pts
3. Déterminer : $f([2; +\infty[)$ et $f^{-1}([-9; 3[)$. 2pts

Exercice 2: (4.5 Points)

Soit f une application définie par :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow x^2 - 8x + 7 \end{aligned}$$

1. Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $f(x) = 7$. f est-elle injective ? 1.5pts
2. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \geq -9$. f est-elle surjective ? 1.5pts
3. Soit g la restriction de f sur $[-\infty; 4]$:
Prouver que g est bijective de $[-\infty; 4]$ vers $[-9, +\infty[$ et donner l'expression de $g^{-1}(x)$ 1.5pts
Pour tout x de $[-9, +\infty[$.

Exercice 3: (4.5 Points)

On considère la fonction f une définie sur \mathbb{R} par :
$$f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 2}$$

- 1- a. Montrer que f est une fonction paire. 1pts
- b. Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = 3 - \frac{7}{x^2 + 2}$ 0.5pts
- c. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{-1}{2} \leq f(x) < 3$ 1.5pts
- 2- Etudier la monotonie de f sur $[0, +\infty[$ et déduire sa monotonie sur $]-\infty; 0]$. 1.5pts

Exercice 4: (5 Points)

On considère les deux fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \sqrt{x-3} \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 - 4x + 5$$

1-Dresser le tableau de variation de f et g .

1pts

2- Montrer que g admet une valeur minimale sur \mathbb{R} .

1pts

3-On considère la fonction h définie sur $[3, +\infty[$ par : $h(x) = g \circ f(x)$

a- Déterminer l'expression de $h(x)$ pour tout x de l'intervalle $[3, +\infty[$.

1pts

b- Etudier la monotonie de h sur les deux intervalles $[3, 7[$ et $[7, +\infty[$.

2pts

Exercice 5: (1.5 Points)

$$F: \mathbb{R}^+ \rightarrow [2; +\infty[$$

Montrer que l'application : est une bijection

$$x \rightarrow x^2 + 2x\sqrt{x} + x + 2$$

$$\text{et que : } F^{-1}(x) = \frac{1}{4} \left(\sqrt{1+4\sqrt{x-2}} - 1 \right)^2 \quad \text{pour tout } x \in [2, +\infty[$$

1.5pts

La logique est l'art de la démonstration

« Sans doute il serait plus simple de n'enseigner que le résultat. Mais l'enseignement des résultats de la science n'a jamais été un enseignement scientifique ». **Gaston Bachelard**.

Bon courage