

I. Introduction générale:

Les fonctions usuelles sont des fonctions simples et typiques dont les propriétés géométriques dépendent de leur formes et des leurs paramètres . Dans ce cours nous allons voir quelques unes de ces fonctions , nous citons les fonctions affines , les fonctions polynômes de second degré , les fonctions homographiques, quelques fonctions irrationnelles simples et les fonctions trigonométriques de base.

Pour chacune de ces fonctions f ; on pose : $T_f = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ tels que x et y deux éléments différents du domaine de définition D_f de f .

On désigne par (C_f) la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

II. La fonction Affine :



















Cette fonction s'écrit : $f(x) = ax + b$

f étant une fonction polynôme donc son domaine définition est $D_f = \mathbb{R}$.

Le taux d'accroissement est :

$$T_f = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{(ax + b) - (ay + b)}{x - y} = \frac{ax + b - ay - b}{x - y} = \frac{a(x - y)}{x - y} = a$$

Les variations de f dépendent de a , coefficient de la fonction def , d'où le résumé suivant :

| Tableau de Variations De La fonction f | $a > 0$ $T_f > 0$ f croissante sur \mathbb{R} | $a = 0$ $T_f = 0$ f constante sur \mathbb{R} | $a < 0$ $T_f > 0$ f décroissante sur \mathbb{R} | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|--------|---|--|--|-----|-----------|-----------|--------|--|--|---|-----|-----------|-----------|--------|---|---|
| | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td><td style="padding: 2px;">$-\infty$</td><td style="padding: 2px;">$+\infty$</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">$f(x)$</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> </table> <p>$f(x) = 2x - 1$ $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$</p>  | x | $-\infty$ | $+\infty$ | $f(x)$ |  |  | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td><td style="padding: 2px;">$-\infty$</td><td style="padding: 2px;">$+\infty$</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">$f(x)$</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> </table> <p>$f(x) = 0x + 2$ $f(0) = 2$ et $f(1) = 2$</p>  | x | $-\infty$ | $+\infty$ | $f(x)$ |  |  | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td><td style="padding: 2px;">$-\infty$</td><td style="padding: 2px;">$+\infty$</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">$f(x)$</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;"></td></tr> </table> <p>$f(x) = -2x + 1$ $f(0) = 1$ et $f(1) = -1$</p>  | x | $-\infty$ | $+\infty$ | $f(x)$ |  |  |
| x | $-\infty$ | $+\infty$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $f(x)$ |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | $-\infty$ | $+\infty$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $f(x)$ |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | $-\infty$ | $+\infty$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $f(x)$ |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III. Fonction polynôme de second degré :

la fonction s'écrit : $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$

f étant une fonction polynôme donc son domaine définition est $D_f = \mathbb{R}$.

Le taux d'accroissement est :

$$T_f = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{(ax^2 + bx + c) - (ay^2 + by + c)}{x - y} = \frac{a(x^2 - y^2) + b(x - y)}{x - y} = a(x + y) + b$$

d'où $: T_f = a(x + y) + b = a(x + y + \frac{b}{a}) = a\left((x + \frac{b}{2a}) + (y + \frac{b}{2a})\right)$

On en déduit que l'expression $\left(x + \frac{b}{2a}\right) + \left(y + \frac{b}{2a}\right)$ est négative sur $\left[-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ et positive sur $\left]-\frac{b}{2a}; +\infty\right[$

Les variations de f dépendent de a , d'où le résumé suivant :

Tableau de Variations De La fonction f

D'où le tableau de variations de f sur \mathbb{R}


| x | $-\infty$ | $-\frac{b}{2a}$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|--------------------|-----------|
| $f(x)$ | | $f(-\frac{b}{2a})$ | |

(C_f) est une parabole de sommet $\Omega\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$
et orientée vers le haut

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$$


$$f(1) = -1 \text{ et } f(0) = 1 \text{ et } f(-1) = 7$$

Exemple De Représentation graphique



$$f(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

$$f(1) = -1 \text{ et } f(0) = 1 \text{ et } f(-1) = 7$$



IV. Fonction homographique : la fonction s'écrit : $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $\Delta = ad - bc \neq 0$

On a $D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\} = \left[-\infty; -\frac{d}{c}\right] \cup \left[-\frac{d}{c}; +\infty\right]$

Le taux d'accroissement est : $T_f = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{\frac{ax+b}{cx+d} - \frac{ay+b}{cy+d}}{x - y}$

Après simplifications de calcul, on trouve : $T_f = \frac{ad - bc}{(cx+d)(cy+d)} = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)(cy+d)} = \frac{\Delta}{(cx+d)(cy+d)}$

L'expression $(cx+d)(cy+d)$ est positive sur chacun des intervalles $\left[-\infty; -\frac{d}{c}\right] \text{ et } \left[-\frac{d}{c}; +\infty\right]$

D'où les variations de f dépendent de $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Donc si $\Delta > 0$, alors f est croissante sur chacun des intervalles $\left[-\infty; -\frac{d}{c}\right] \text{ et } \left[-\frac{d}{c}; +\infty\right]$

et si $\Delta < 0$, alors f est décroissante sur chacun des intervalles $\left[-\infty; -\frac{d}{c}\right] \text{ et } \left[-\frac{d}{c}; +\infty\right]$

d'où le résumé :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc > 0$$

$T_f > 0$ sur les deux intervalles:

$$]-\infty; -\frac{d}{c}] \text{ et } [-\frac{d}{c}; +\infty[$$

D'où le tableau de variations de f sur \mathbb{R}

Tableau de Variations De La fonction f

| | | | |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | | | |


(C_f) est une hyperbole de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$

Et d'asymptotes: $(\Delta_1): x = \frac{a}{c}$ et $(\Delta_2): y = -\frac{d}{c}$

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$$

$$f(3) = 5/2 \text{ et } f(2) = 3 \text{ et } f(0) = 1 \text{ et } f(-1) = 3/2$$

Exemple De Représentation graphique



$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc < 0$$

$T_f < 0$ sur les deux intervalles:

$$]-\infty; -\frac{d}{c}[\text{ et }]-\frac{d}{c}; +\infty[$$

D'où le tableau de variations de f sur \mathbb{R}


| | | | |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | | | |

(C_f) est une hyperbole de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$

Et d'asymptotes: $(\Delta_1): x = \frac{a}{c}$ et $(\Delta_2): y = -\frac{d}{c}$

$$f(x) = \frac{2x-3}{x-1}$$

$$f(3) = 3/2 \text{ et } f(2) = 1 \text{ et } f(0) = 3 \text{ et } f(-1) = 5/2$$



V. La fonction polynôme de 3^{ème} degré ax^3 : f s'écrit : $f(x) = ax^3$ a $a \neq 0$

f étant une fonction polynôme donc son domaine définition est $D_f = \mathbb{R}$.

Le taux d'accroissement est :

$$T_f = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{ax^3 - ay^3}{x - y} = \frac{a(x^3 - y^3)}{x - y} = \frac{a(x - y)(x^2 + xy + y^2)}{x - y}$$

d'où : $T_f = a(x^2 + xy + y^2)$

On en déduit que l'expression $x^2 + xy + y^2$ est positive sur chacun des intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$

Les variations de f dépendent de a, d'où le résumé suivant :

a > 0

$T_f > 0$ sur \mathbb{R}
D'où le tableau de variations de f sur \mathbb{R}

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
|---|-----------|---|-----------|

a < 0

$T_f > 0$ sur \mathbb{R}
على f ومنه جدول تغيرات الدالة

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
|---|-----------|---|-----------|

Tableau de Variations De

La fonction f




On remarque que (C_f) est symétrique par rapport à l'origine du repère car f est une fonction impaire

$$f(x) = 2x^3$$

$f(1) = 2$ et $f(0) = 0$ et $f(-1) = -2$


Exemple De Représentation graphique



On remarque que (C_f) est symétrique par rapport à l'origine du repère car f est une fonction impaire

$$f(x) = -2x^3$$

$f(1) = -2$ et $f(0) = 0$ et $f(-1) = 2$



VI. Fonctions irrationnelles simples : $\pm\sqrt{x-a}$ et $\pm\sqrt{a-x}$:

1) Considérons les fonctions : $f_1(x) = \sqrt{x-a}$ et $f_2(x) = -\sqrt{x-a}$ avec $a \in \mathbb{R}$

On a $D_{f_1} = D_{f_2} = [a; +\infty[$

Le taux d'accroissement de f_1 est :

$$T_{f_1} = \frac{f_1(x) - f_1(y)}{x-y} = \frac{\sqrt{x-a} - \sqrt{y-a}}{x-y} = \frac{(x-y)}{(x-y)(\sqrt{x-a} + \sqrt{y-a})} = \frac{1}{\sqrt{x-a} + \sqrt{y-a}} > 0$$

d'où :

f_1 est croissante sur $[a; +\infty[$, et puisque $f_2(x) = -f_1(x)$ alors f_2 est décroissante sur $[a; +\infty[$

2) Considérons les fonctions : $g_1(x) = \sqrt{a-x}$ et $g_2(x) = -\sqrt{a-x}$ avec $a \in \mathbb{R}$

On a $D_{g_1} = D_{g_2} =]-\infty; a]$

Le taux d'accroissement de g_1 est :

$$T_{g_1} = \frac{g_1(x) - g_1(y)}{x-y} = \frac{\sqrt{a-x} - \sqrt{a-y}}{x-y} = \frac{-(x-y)}{(x-y)(\sqrt{a-x} + \sqrt{a-y})} = \frac{-1}{\sqrt{x-a} + \sqrt{y-a}} < 0$$

d'où :

g_1 est décroissante sur $]-\infty; a]$, et puisque $g_2(x) = -g_1(x)$ alors g_2 est croissante sur $]-\infty; a]$

D'où le résumé suivant :

$$f_1(x) = \sqrt{x-a} \text{ et } f_2(x) = -\sqrt{x-a}$$

Le tableau de variations de f_1 sur $[a; +\infty[$

| | | |
|----------|---|-----------|
| x | a | $+\infty$ |
| $f_1(x)$ | | |

$$g_1(x) = \sqrt{a-x} \text{ et } g_2(x) = -\sqrt{a-x}$$

Le tableau de variations de g_1 sur $[a; +\infty[$

| | | |
|----------|-----------|---|
| x | $-\infty$ | a |
| $g_1(x)$ | | |

Tableau de Variations

Le tableau de variations de f_2 sur $[a; +\infty[$

Le tableau de variations de g_2 sur $[a; +\infty[$

De
La fonction f

| X | a | +∞ |
|----------|---|----|
| $f_2(x)$ | | ↗ |

On remarque $(C_{f_1}) \cup (C_{f_2})$ est une parabole de sommet A(a; 0)
D'axe (Ox) et orientée vers la droite


| X | -∞ | a |
|----------|----|---|
| $g_2(x)$ | | ↗ |

On remarque $(C_{g_1}) \cup (C_{g_2})$ est une parabole de sommet A(a; 0)
D'axe (Ox) et orientée vers la gauche

Exemple
De
Représentation graphique


$$f_1(x) = \sqrt{x-a} \text{ et } f_2(x) = -\sqrt{x-a}$$

$$f(1)=2 \text{ et } f(0)=0 \text{ et } f(-1)=-2$$



$$g_1(x) = \sqrt{a-x} \text{ et } g_2(x) = -\sqrt{a-x}$$


$$f(1)=-2 \text{ et } f(0)=0 \text{ et } f(-1)=2$$




VII. Les fonctions trigonométriques :

Considérons les fonctions f ; g et h tels que : $f(x) = \sin x$; $g(x) = \cos x$ et $h(x) = \tan x$
Les courbes de ces fonctions sont tracées, en se basant sur le cercle trigonométrique :


$$f(x) = \sin x$$



$$g(x) = \cos x$$



$$h(x) = \tan x$$



Bonne Chance