

# Les Barycentres

**Exercice 1**

A et B sont deux points distincts. Construire, s'il existe, le barycentre :

1. G des points pondérés (A ; 1) et (B ; 3).
2. H des points pondérés (A ; 2) et (B ; 2).
3. J des points pondérés (A ; -1) et (B ; 2).
4. K des points pondérés (A ; -2) et (B ; -6).
5. L des points pondérés (A ; -2) et (B ; 2).

**Exercice 2**

Dans un plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points A(1 ; 1) et B(5 ; 3).

1. Calculer les coordonnées du barycentre G de (A ; 2) et (B ; 1).
2. Déterminer des réels a et b tels que H(-1 ; 0) soit le barycentre de (A ; a) et (B ; b).
3. Peut-on trouver a et b tels que O soit le barycentre de (A ; a) et (B ; b) ?

**Exercice 3**

Soit A et B deux points tels que  $AB = 4$ .

On considère le barycentre G de (A ; 1) et (B ; 3) et le barycentre K de (A ; 3) et (B ; 1).

1. Exprimer les vecteurs  $\vec{AG}$  et  $\vec{AK}$  en fonction de  $\vec{AB}$ . Placer sur un dessin les points A, B, G et K.
2. Montrer que les segments [AB] et [GK] ont le même milieu.

**Exercice 4**

Soit QUAD un quadrilatère.

Construire le barycentre G de (Q ; 1), (U ; 1), (A ; -2) et (D ; -1).

**Exercice 5**

Soit ABC un triangle, A', B', C' les milieux respectifs de [BC], [AC], [AB] et G le barycentre des points pondérés (A ; 1), (B ; 1) et (C ; 1).

1. Montrer que G est le barycentre de (C ; 1) et (C' ; 2).
2. En déduire la position de G sur le segment [CC'].
3. Démontrer que G appartient à [BB'] et à [AA']. Que peut-on en déduire ?

**Exercice 6**

Soit TRUC un quadrilatère.

On désigne par K, L, M, N les milieux respectifs de [TR], [RU], [UC], [CT] et par G l'isobarycentre des quatre points T, R, U et C.

Prouver que G est le milieu de [KM] et de

Que peut-on dire du quadrilatère KLMN ?

## Correction

### Exercice 1

1. G barycentre des points pondérés (A ; 1) et (B ; 3).

Comme  $1 + 3 \neq 0$ , alors le barycentre de ce système existe.

Par définition du barycentre, on a :  $\vec{GA} + 3\vec{GB} = \vec{0}$

En utilisant la relation de Chasles, on obtient :

$$\vec{GA} + 3\vec{GA} + 3\vec{AB} = \vec{0}$$

$$4\vec{GA} = -3\vec{AB}$$

$$\vec{AG} = \frac{3}{4}\vec{AB}$$

2. H barycentre des points pondérés (A ; 2) et (B ; 2).

Comme  $2 + 2 \neq 0$ , alors le barycentre de ce système existe.

Par définition du barycentre, on a :  $2\vec{HA} + 2\vec{HB} = \vec{0}$

En utilisant la relation de Chasles, on obtient :

$$2\vec{HA} + 2\vec{HA} + 2\vec{AB} = \vec{0}$$

$$4\vec{HA} = -2\vec{AB}$$

$$\vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{AB}$$

3. J barycentre des points pondérés (A ; -1) et (B ; 2).

Comme  $-1 + 2 \neq 0$ , alors le barycentre de ce système existe.

Par définition du barycentre, on a :  $-\vec{JA} + 2\vec{JB} = \vec{0}$

En utilisant la relation de Chasles, on obtient :

$$-\vec{JA} + 2\vec{JA} + 2\vec{AB} = \vec{0}$$

$$\vec{JA} = -2\vec{AB}$$

$$\vec{AJ} = 2\vec{AB}$$

4. K barycentre des points pondérés (A ; -2) et (B ; -6).

Comme  $-2 - 6 \neq 0$ , alors le barycentre de ce système existe.

Par définition du barycentre, on a :  $-2\vec{KA} + 6\vec{KB} = \vec{0}$

En utilisant la relation de Chasles, on obtient :

$$-2\vec{KA} + 6\vec{KA} + 6\vec{AB} = \vec{0}$$

$$-8\vec{KA} = 6\vec{AB}$$

$$\vec{AK} = \frac{3}{4}\vec{AB}$$

5. L barycentre des points pondérés (A ; -2) et (B ; 2).

Comme  $-2 + 2 = 0$ , alors le barycentre n'est pas défini.

### Exercice 2

1. Coordonnées du barycentre G de (A ; 2) et (B ; 1).

$$x_G = [(2 \times 1 + 1 \times 1) / 3] = [7/3] \quad \text{et}$$

D'où : G a pour coordonnées (7/3; 5/3).

2. H est le barycentre de (A ; a) et (B ; b) si et seulement si

$$x_H = \frac{a \times 1 + b \times 5}{a + b} \quad \text{et} \quad y_H = \frac{a \times 1 + b \times 3}{a + b}$$

$$\text{Or } \vec{H} \text{ a pour coordonnées } (-1; \vec{0}), \text{ donc: } \frac{a \times 1 + b \times 5}{a + b} = -1$$

$$\text{ce qui équivaut à: } \begin{cases} 2a + 6b = 0 \\ a + 3b = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ces deux équations sont équivalentes à } a = -3b.$$

Une solution du système est donc :  $a = -3$  et  $b = 1$ .

H est donc barycentre de (A ; -3) et (B ; 1).

Remarque :

en fait, H est barycentre de (A ; -3b) et (B ; b) avec  $-3b + b \neq 0$  c'est-à-dire  $b \neq 0$ .

3. O est le barycentre de (A ; a) et (B ; b) si et seulement si

$$x_O = \frac{a \times 1 + b \times 5}{a + b} \quad \text{et} \quad y_O = \frac{a \times 1 + b \times 3}{a + b}$$

Or O a pour coordonnées (0 ; 0), donc : 
$$\begin{cases} \frac{a + 5b}{a + b} = 0 \\ \frac{a + 3b}{a + b} = 0 \end{cases}$$

ce qui équivaut à :

$$\begin{cases} a + 5b = 0 \\ a + 3b = 0 \end{cases}$$

Ce système admet un unique couple solution (0 ; 0). Comme la somme des coefficients est nulle, alors O ne peut pas être barycentre de (A ; a) et (B ; b).

### Exercice 3

1. G étant le barycentre de (A ; 1) et (B ; 3), par définition, on a :

$$\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{0}$$

donc :

$$\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0}$$

$$4\overrightarrow{GA} = -3\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$$

De même, K étant le barycentre de (A ; 3) et (B ; 1), par définition du barycentre, on a :

$$3\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{0}$$

donc :

$$3\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0}$$

$$4\overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

2. Soit I le milieu du segment [AB]. On va montrer que I est aussi le milieu du segment [GK].

$$\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AK}$$

$$= 2\overrightarrow{IA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

Or, I étant le milieu du segment [AB],  $2\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BA}$ . On obtient donc :

$$\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0}$$

I est donc le milieu du segment [GK].

On a donc montré que les segments [AB] et [GK] ont le même milieu.

### Exercice 4

G étant le barycentre de (Q ; 1), (U ; 1), (A ; -2) et (D ; -1), on a :

$$\overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{GU} - 2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{QU} - 2\overrightarrow{GQ} - 2\overrightarrow{QA} - \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{DG} = -\overrightarrow{QU} + 2\overrightarrow{QA}$$

### Exercice 5

1. C' est le milieu de [AB], donc C' est le barycentre de (A, 1) (B, 1).

G est le barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1).

Donc d'après le théorème d'associativité du barycentre, on a :

G est le barycentre de (C', 2), (C, 1).

2. On vient de montrer que G est le barycentre de (C', 2), (C, 1), donc :

$$2\overrightarrow{GC'} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$$

$$2\vec{GC} + 2\vec{CC'} + \vec{GC} = \vec{0}$$

$$3\vec{GC} = -2\vec{CC'}$$

$$\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CC'}$$

3. A' est le milieu de [BC], donc A' est le barycentre de (B, 1) (C, 1).

G est le barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1).

Donc d'après le théorème d'associativité du barycentre, on a :

G est le barycentre de (A', 2), (A, 1).

On en déduit que G appartient à (A'A) [même au segment [A'A]].

B' est le milieu de [AC], donc B' est le barycentre de (A, 1)(C, 1).

G est le barycentre de (A,1), (B,1), (C,1).

Donc d'après le théorème d'associativité du barycentre, on a :

G est le barycentre de (B',2), (B, 1).

On en déduit que G appartient à (B'B) [même au segment [B'B]].

Les droites (AA'), (BB') et (CC') sont donc concourantes en G.

fait, G est le centre de gravité du triangle ABC.]

## Exercice 6

K milieu de [TR], donc K barycentre de (T,1)(R,1)

M milieu de [UC], donc M barycentre de (U,1)(C,1)

G barycentre des points (T,1)(R,1)(U,1)(C,1)

D'après le théorème d'associativité du barycentre, on en déduit que G est le barycentre de (K,2)(M,2).

G est donc le milieu du segment [KM].

De même :

L milieu de [RU], donc L barycentre de (R,1)(U,1)

N milieu de [TC], donc N barycentre de (T,1)(C,1)

G barycentre des points (T,1)(R,1)(U,1)(C,1)

D'après le théorème d'associativité du barycentre, on en déduit que G est le barycentre de (L,2)(N,2).

G est donc le milieu du segment

.

Le quadrilatère KLMN a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Ce quadrilatère est donc un parallélogramme.