



III. Applications de la fonction dérivée deuxième :

A. Position relative de la tangente et la courbe – la concavité :

a. Propriété et définition :

f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

$\forall x \in I : f''(x) > 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- La courbe (C_f) de f est située au dessus des tangentes des points x tel que $x \in I$.

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est convexe (ou sa concavité est dans le sens des ordonnées positives . on note \checkmark)

$\forall x \in I : f''(x) < 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- La courbe (C_f) de f est située au dessous des tangentes des $x \in I$.

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est concave (ou sa concavité est dans le sens des ordonnées négatives . on note \wedge) .


b. Exemple :

Exemple 1 :

La figure ci-contre représente la courbe d'une fonction f .

- Sur l'intervalle $[1, +\infty[$: la courbe (C_f) de f est convexe . (ou sa concavité est dans le sens des ordonnées positives) .
- Sur l'intervalle $]-\infty, 1[$: la courbe (C_f) de f est concave . (ou sa concavité est dans le sens des ordonnées négatives) .

Exemple 2 :



Le tableau ci-contre représente le signe de la fonction dérivée seconde f'' et la concavité de la courbe (C_f) de f

x	$-\infty$	-5	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	-	0
Concavité de (C_f)	\wedge	\checkmark	\wedge	\checkmark	

B. Points d'inflexions :

a. Propriété et définition :

f est une fonction dérivable deux fois sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

Si la fonction dérivée seconde f'' s'annule en x_0 et f'' change de signe au voisinage de x_0 alors le point d'abscisse $A(x_0, f(x_0))$ est un point d' inflexion au courbe (C_f) ; dans ce cas la tangente au point $A(x_0, f(x_0))$ coupe (ou traverse) la courbe.



b. Exemple :

Exemple 1 :


- Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

- (C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j})

Exemple 2 :

Le tableau suivant représente le signe de la fonction dérivée seconde f'' et la concavité de la courbe (C_f) de f

x	$-\infty$	-5	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	-	0
Concavité de (C_f)	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞



- Le point d'abscisse $x_0 = -5$ est un point d'inflexion au courbe (C_f) de f car $f''(-5) = 0$ et f'' change de signe au voisinage de $x_0 = -5$.
- Le point d'abscisse $x_1 = 2$ n'est pas un point d'inflexion au courbe (C_f) de f car f'' change de signe au voisinage de $x_1 = 2$

IV. Centre de symétrie – axe de symétrie de la courbe d'une fonction :


A. Centre de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. Propriété :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Le point $I(a, b)$ est centre de symétrie au courbe (C_f) $\Rightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a - x) + f(x) = 2b \end{cases}$

b. Exemple :






B. axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. Propriété :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

La droite d'équation $D: x=a$ est axe de symétrie au courbe (C_f) $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a-x)=f(x) \end{cases}$

b. Exemple :



V. Branches infinies d'une fonction :

A. Branches infinies :

a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Si au moins une des coordonnées d'un point M de la courbe de (C_f) tend vers l'infinie on dit que la courbe (C_f) admet une branche infinie.

B. Asymptote verticale :

a. Définition :


Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ alors la droite d'équation $x=a$ est une asymptote verticale à (C_f) (à droite de a ou à gauche de a).



b. Exemple :

Exemple : asymptote verticale d'équation $x = 1$.



C. Asymptote horizontale :

a. Définition :


Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $[[a, +\infty[\subset D_f$ ou $] -\infty, a[\subset D_f$)

dans un plan (P) est rapporté à un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$) alors la droite d'équation $y = b$ (ou $y = c$) est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).

b. Exemple :

Asymptote horizontale d'équation $y = 2$ au voisinage de $\pm\infty$.



D. Asymptote oblique :

a. Définition :

- Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $[[a, +\infty[\subset D_f$ ou $] -\infty, a[\subset D_f$) dans un plan (P) est rapporté à un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .


- $a \in \mathbb{R}^*$ ($a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$) et $b \in \mathbb{R}$

Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$ alors la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$.

b. Exemple :

$$\text{Soit } f(x) = x + 3 - \frac{(x+7)}{(x-1)}$$

(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation $y = x + 3$ voisinage de $\pm\infty$





c. Propriété :

Si la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$, donc pour déterminer a et b on calcule les limites suivantes :


- Pour déterminer a on calcule : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ (c.à.d. $a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$), donc on a deux cas particulières .
- Pour déterminer a on calcule : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$ (c.à.d. $b \neq \pm\infty$) . donc on a la troisième cas particulière .
- **Les cas particulières**
 - **1^{ère} cas particulière :** $a = \pm\infty$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des ordonnées .
 - **2^{ème} cas particulière :** $a = 0$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des abscisses .
 - **3^{ème} cas particulière :** $b = \pm\infty$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) la droite d'équation $y = ax$.

les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$


(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



cas particulier 2 : $a = 0$
 (C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses


Exemple $f(x) = \sqrt{x}$



cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnées

Exemple $f(x) = x^3$



VI. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .(complément)

a. Définition :

f est une fonction dérivable au point a

• La fonction u tel que : $u : x \rightarrow f(a) + (x-a)f'(a)$ (ou encore $(x-a=h)$; $v : h \rightarrow f(a) + hf'(a)$) est appelée la fonction affine tangente à la fonction f au point a .



- Quand x est très proche de a le nombre $f(a) + (x-a)f'(a)$ est une approximation affine de $f(x)$ au voisinage de a on écrit : $f(x) \approx f(a) + (x-a)f'(a)$.
- Ou encore le nombre $f(a) + hf'(a)$ est approximation affine de $f(a+h)$ au voisinage de zéro on écrit $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ avec $x-a=h$.

A. Exemple :

❖ Exemple 1 :

1. Trouver une approximation affine du nombre $f(1+h)$ avec $f(x) = x^2$ et $a=1$.

Correction :

f est une fonction dérivable au point 1 avec $f'(1) = 2$ approximation affine de $f(1+h)$ est :

$$f(1+h) \approx hf'(1) + f(1) \approx 2h + 1. \text{ Conclusion : } f(1+h) = (1+h)^2 \approx 2h + 1.$$

Application du résultat :

On prend $h = 0,001$ d'où : $f(1,001) = f(1+0,001) \approx 2 \times 0,001 + 1$ donc $f(1+0,001) \approx 1,002$.

On vérifie : $f(1,001) = (1,001)^2 = 1,002001$ donc $1,002 \approx 1,002001$.

Technique de calcul : $(1+h)^2$ avec h très proche de zéro on calcule $2h+1$.

❖ Exemple 2 : Trouver une approximation affine du nombre $\sqrt{9,002}$.

Correction :

On pose $f(x) = \sqrt{x}$ et $a = 9$ et $h = 0,002$ d'où $\sqrt{9,002} = f(9+0,002)$. On calcule $f'(9)$ on a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(9+h) - f(9)}{h} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{f(x) - f(9)}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\cancel{\sqrt{x}} - 3}{\cancel{(x-9)}(\sqrt{x}+3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{6} \in \mathbb{R} \text{ d'où } f'(9) = \frac{1}{6}.$$

On trouve une approximation affine du nombre $\sqrt{9,002}$.

On a : $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ d'où $f(9+0,002) \approx f(9) + 0,002 \times f'(9)$.

Donc : $f(9+0,002) \approx \sqrt{9} + 0,002 \times \frac{1}{6}$ par suite $f(9+0,002) \approx 3,000333333$.

On remarque que $\sqrt{9,002} \approx 3,000333333$ la calculatrice donne : $\sqrt{9,002} \approx 3,000333315$ d'où la précision est 3×10^{-8} .

1. Remarque :

- Pour la fonction : $f(x) = x^2$ et $a = 1$ on a : $f(1+h) = (1+h)^2 \approx 1+2h$.
- Pour la fonction : $f(x) = x^3$ et $a = 1$ on a : $f(1+h) = (1+h)^3 \approx 1+3h$.
- Pour la fonction : $f(x) = \sqrt{x}$ et $a = 1$ on a : $f(1+h) = \sqrt{1+h} \approx 1 + \frac{h}{2}$.
- Pour la fonction : $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 1$ on a : $f(1+h) = \frac{1}{1+h} \approx 1-h$.




VII. Résumer des branches infinies :

Asymptote horizontale

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$$

(C_f) admet une asymptote horizontale c'est la droite d'équation $y = a$ au voisinage de $\pm\infty$


Exemple : asymptote horizontale d'équation au voisinage de $\pm\infty$ $y = 2$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$$

(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation $y = ax + b$ au voisinage de $\pm\infty$

$$\text{Exemple } f(x) = x + 3 - \frac{(x+7)}{(x-1)}$$



Rq : position relative de (C_f) et (D) on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$

Asymptote oblique et les trois cas particuliers

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$$

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

$$\text{Exemple } f(x) = x + \sqrt{x-3}$$




les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

Asymptote verticale

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$$

(C_f) admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x = a$

Exemple : asymptote verticale d'équation $x = 1$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$$

cas particulier 2 : $a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

$$\text{Exemple } f(x) = \sqrt{x}$$



cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnées

$$\text{Exemple } f(x) = x^3$$

