

متوجهة منظمية: كل متوجهة \vec{n} متعمدة مع \vec{U} تسمى متوجهة منظمية على (D)

\vec{U} متوجهة موجهة لمستقيم (D)

معادلة مستقيم محدد بنقطة ومتوجهة منظمية :

(D) مستقيم مار من A و \vec{U} منظمية عليه

$$[\vec{AM} \cdot \vec{U} = 0] \Leftrightarrow [M \in (D)]$$

تعامد مستقيمين :

(D) و (D') مستقيمين في المستوى

\vec{U} و \vec{U}' موجهتين ل (D) و (D') على التوالي

\vec{n} و \vec{n}' منظيمتين على (D) و (D') على التوالي

العبارات التالية متكافئة :

① (D) و (D') متعمدان

② \vec{U} و \vec{U}' متعمدان

③ \vec{n} و \vec{n}' متعمدان

④ الموجهة لأحدهما والمنظمية على الآخر مستقيميتن

ملحوظة : إذا كان $(D) \perp (D')$ فإن الموجهة لأحدهما تكون منظمية على الثاني و المنظمية على أحدهما تكون موجهة للأخر

مسافة نقطة عن مستقيم

$$ax + by + c = 0$$

(D) مستقيم معادله $ax + by + c = 0$

و (D) نقطة مسافة $A(x_A, y_A)$ عن (D) هي :

$$d(A, (D)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

التمرين الأول:

حدد معادلة ديكارتية لمستقيم (D) في الحالات التالية

$\vec{U}(3,2)$ و $A(2,-1)$ مار من (D)

◀ مار من (D) مار من $(2,5)$ و $B(3,5)$ منظمية عليه

◀ مار من النقطة $I(1,-1)$ و عمودي على المستقيم $(\Delta): x + 3y - 2 = 0$

◀ عمودي على المستقيم $2x + y - 4 = 0$: (D') في النقطة $J(3,-2)$

التمرين الثاني:

نعتبر في المستوى النقط التالية $A(1,-2)$; $B(3,0)$; $C(2,1)$

◀ أسطع معادلة واسط القطعة $[AB]$

◀ أعط معادلة للارتفاع (AH) للمثلث ABC

التمرين الثالث:

◀ عدد إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة $A(1,-1)$ على المستقيم $(D): x - 2y + 3 = 0$

◀ نعتبر المستقيم $A(5,-2): 3x - y - 12 = 0$ و النقطة (D)

◀ أكتب معادلة المستقيم المار من A والعمودي على (D)

◀ حدد إحداثيات النقطة A' مماثلة A بالنسبة لمستقيم (D)

التمرين الرابع:

أحسب مسافة النقطة A عن المستقيم (D) في الحالات التالية:

⇨ $(D): 5x + 2y - 3 = 0$ و $A(2,3)$

⇨ $(D): 3x - 4y + 1 = 0$ و $A(-1,2)$

⇨ $2x - y + 3 = 0$ و $A(3,-1)$

التمرين الخامس:

نعتبر النقط التالية $A(5,7)$, $B(2,3)$, $C(9,4)$

1. أثبتت أن ABC مثلث قائم الزاوية في A .

2. أحسب أطوال أضلاع المثلث ABC .

3. أحسب $\cos(\overline{BA}, \overline{BC})$ و $\sin(\overline{BA}, \overline{BC})$

التمرين السادس:

أعط معادلة ديكارتية للدائرة (C) في الحالات التالية

1. مركزها النقطة $(2,-1)$ وشعاعها $r=2$

2. مركزها النقطة $(-3, \frac{1}{2})$ و تمر من النقطة $A(-1,1)$

3. قطرها القطعة $[AB]$ بحيث $B(-2,3)$; $A(0,1)$

التمرين السابع:

حدد المجموعة (Γ) للنقط (x,y) من المستوى (P) في الحالات التالية :

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

$x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$

$x^2 + y^2 + x - 4y + 5 = 0$

$x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 0$

التمرين الثامن:

أدرس الوضع النسبي للدائرة (C) و المستقيم (D) في الحالات

$(D): 3x + y - 3 = 0$; $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 25 = 0$

$(D): 3x + 4y - 3 = 0$; $(C): x^2 + y^2 - x - 7y = 0$

$(D) \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-2t \end{cases} t \in \mathbb{R}$; $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$

الجاء السلمي