

## الموضوع الاول الفيزياء ( 7 نقط )

- نعتبر جسما صلبا كتلته  $m=0.5\text{kg}$  يمكنه ان ينتقل فوق طريق  $ABCD$  يتكون من جزء مستقيم  $AB$  طوله  $AB=4\text{m}$  وجزء دائري  $BC$  شعاعه  $R=1.5\text{m}$  وجزء مستقيم  $CD$  طوله  $CD=3\text{m}$  كما يوضح الشكل جانبه :
- نعطي  $\theta=60^\circ$  ونعتبر حركة الجسم  $S$  في المدار  $ABC$  بدون احتكاك ونطلقه في الموضع  $A$  بدون سرعة بديئة.
- اجرد القوى المطبقة على الجسم  $S$
  - عرف الطاقة الميكانيكية.
  - متى تقول أن الطاقة الميكانيكية منحفة.
  - عبر عن طاقة الوضع التقليدية والطاقة الميكانيكية للجسم  $S$  في الموضع  $A$ . نختار الحالة المرجعية  $E_{pp}=0$  عند  $C$ 
    - أحسب قيمة طاقة الوضع التقليدية  $E_{pp}$  عند النقطة  $A$
    - أحسب قيمة الطاقة الميكانيكية  $E_m$  عند النقطة  $A$
  - احسب كلا من قيمتي طاقة الوضع التقليدية والطاقة الحركية للجسم  $S$  عند الموضع  $B$
  - احسب كلا من طاقة الوضع التقليدية والطاقة الحركية للجسم  $S$  عند الموضع  $C$
  - نعتبر سرعة المتحرك تتعدم عند النقطة  $D$ .
    - هل الطاقة الميكانيكية تحتفظ ؟ على الجواب.
    - أحسب شغل قوة الاحتكاك بين النقطتين  $C$  و  $D$
    - استنتج كمية الحرارة  $Q$  المحررة خلال الانتقال  $CD$

## الموضوع الثاني الفيزياء ( 6 نقط )

- نعتبر ساقا  $AB$  متجلسة كتلتها  $m=200\text{g}$  وطولها  $L=40\text{cm}$  يمكنها الدوران حول محور ثابت أفقى يمر من  $A$  بدون احتكاك. عزم قصور الساق هو  $J_\Delta=\frac{1}{3}mL^2\text{J}$ .

- 1- ندير الساق بسرعة زاوية ثابتة  $\omega=30.5\text{ rad/s}$  أحسب الطاقة الحركية للساق.
- 2- عبر عن تغير طاقة الوضع التقليدية للساق بدلالة  $m$  و  $g$  و  $L$  و  $\theta$  عند انتقالها من موضع التوازن المستقر الى موضع تكون فيه زاوية  $\theta$  مع الخط الرأسي المار من  $A$ .
- 3- استنتج تعبير تغير الطاقة الحركية للساق بين الموضعين  $0$  و  $\theta$
- 4- نزير من جديد الساق من موضع توازنه المستقر بزاوية  $\theta_m=60^\circ$  ثم نحررها بدون سرعة بديئة نختار المستوى الافقى المار من  $G_0$  كحالة مرجعية لطاقة الوضع التقليدية.
- أ- أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية بدلالة  $m$  و  $g$  و  $L$  و  $\theta$  و  $\omega$  السرعة الزاوية للساق.
- ب- بين أن الساق تمر لأول مرة من موضع التوازن المستقر بالسرعة الزاوية  $\omega=\sqrt{(3g(1-\cos\theta)m)/L}$  استنتاج  $V_B$  السرعة الخطية للطرف  $B$  اثناء مرور الساق لأول مرة من الموضع  $0$

## موضوع الكيمياء ( 7 نقط )

- نحضر  $100\text{ml}$  من محلول مائي بإذابة  $60\text{mg}$  من ميثانوات الصوديوم  $(\text{NaCOOH})$  في الماء المقطر.
- 1- أكتب معادلة الذوبان
- 2- احسب  $C$  التركيز المولى للمذاب المستعمل.
- 3- إذا علمت أن ذوبان ميثانوات الصوديوم يكون كليا.
- 4- اعط جدول تقدم التفاعل وحدد قيمة النقدم الاقصى  $Xm$  ثم عبر عن تراكيز الانواع الموجودة في محلول بدلالة  $Xm$
- 5- اعط تعبير موصلية محلول بدلالة تراكيز الايونات الموجودة في محلول واحسب قيمتها.
- 6- نضيف كمية من الماء المقطر الى محلول السابق ثم نقوم بقياس مواصلة جزء من محلول من جديد باستعمال خلية ذات الخصائص التالية:  $S=4\text{cm}^2$  و  $L=1\text{cm}$  نقيس قيم  $U$  او  $I$  فجدهم  $U=1\text{V}$  و  $I=2.5\text{ A}$
- أ- أحسب مواصلة  $G$  ثم استنتاج موصلية محلول الجديد
- ب- أحسب تراكيز الايونات الموجودة في محلول الجديد
- ج- استنتاج حجم الماء المضاف الى محلول الاول.
- نعطي: عند  $25^\circ$   $\lambda_{\text{Na}^+}=0.005\text{ S.m}^2/\text{mol}$ ,  $\lambda_{\text{HCOO}^-}=0.0055\text{ S.m}^2/\text{mol}$
- الكتل المولية:  $M(\text{H})=1\text{g/mol}$   $M(\text{Na})=23\text{g/mol}$   $M(\text{O})=16\text{g/mol}$
- وفقاً للله