


الشغل والطاقة الحركية Travail et énergie cinétique

ن^o 1: مفهوم الطاقة الحركية



نطلق نفس الكرينة من ارتفاعات مختلفة على عجین فنحصل على النتائج التالية: (الشكل أ)

نحر من نفس الارتفاع ثالث كرينة مختلفة الكتل فنحصل على النتائج التالية: (الشكل ب)

1. كف تغير قيمة السرعة التي تادها الكرينة مباشرة قبل اصطدام بقطعة العجین مع ارتفاع سقوط الكرينة

2. قارن بين قيمة سرعة الكرينة مباشرة قبل اصطدام بقطعة العجین مع ارتفاع سقوط الكرينة

3. قارن بين كتلة الكرينة ودرجة تشوّه العجین.

4. ما سبب تشوّه قطع العجین

5. حسب النتائج السابقة لماذا ترتبط الطاقة المكتسبة من قبل الكرينة؟

لتعريف تعبير هذه الطاقة نقوم بالتجربة التالية:

يتكون الترتيب التجاري من عارضة صلبة مدرجة ومشبة راسيا ، كهرمغنتيس ودراته الكهربائية مزودة بقاطع تيار ، كرينة فولاذية ، لاطق يمكن من قياس سرعة الكرينة ومقير رقمي


نحر كرينة فولاذية لتسقط سقطا رأسيا (بدون سرعة بدنية). ونحسب سرعتها عند مختلف قيم h .

6. أملأ الجدول، ثم مثل المنحنى (h) $v^2 = f(h)$.

7. حدد قيمة المعامل الموجة k ووحدته، ثم قارنه مع $g = 9.8 \text{ N.Kg}^{-1}$.

8. أطْعِنْ تعبير الشغل (W) بدلالة m و g و v ،

9. أكتب تعبير الشغل (W) من جديد بدلالة m و v ، ماذا تستنتج؟



$v^2 (\text{m}^2/\text{s}^2)$	$v (\text{m.s}^{-1})$	$h (\text{m})$
1,40	0.1	
1,98	0.2	
2,80	0.4	
3,43	0.6	
3,96	0.8	
4,42	1.0	
4,46	1.1	
4,85	1.2	


ن^o 2: صيغ عزوم القصور لبعض الأجسام المتجانسة

كرة	ساق	ساق	أسطوانة	حالة	قرص	الجسم
						عزوم القصور J_A
$J_A = \frac{2}{5} m.r^2$	$J_A = \frac{1}{3} m.l^2$	$J_A = \frac{1}{12} m.l^2$	$J_A = \frac{1}{2} m.r^2$	$J_A = m.r^2$	$J_A = \frac{1}{2} m.r^2$	



ن^o 3: مبرهنة الطاقة الحركية

نطبق على حامل ذاتي قوة \vec{F} ثابتة فوق منضدة هوائية ، ونسجل مواضع مركز قصوره G خلال مدد زمنية متساوية $\tau = 60\text{ms}$ (التسجيل بالسلم الحقيقى).



1. أجرد القوى المطبقة على الجسم S

2. أحسب أشغال القوى المطبقة على الحامل الذاتي بين المعدل M_2 و M_6 ، ثم أحسب المجموع الجري ل بهذه الأشغال $\sum W_{M_2 \rightarrow M_6}$.

3. أحسب الطاقة الحركية للحامل الذاتي في المعدل M_2 و M_6 .

4. قارن بين $\Delta E_C = E_{C_6} - E_{C_2}$ و $\sum W_{M_2 \rightarrow M_6}$ تغير الطاقة الحركية للحامل الذاتي. ماذا تستنتج؟


تمرين تطبيقي 1:

نزيح نحو الأعلى بواسطة حبل جسم صلبا S كتلته $m = 50 \text{ Kg}$ فوق سطح مائل بزاوية $\alpha = 60^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي. نعتبر تأثير الحبل على الجسم (S) ثابتا خلال إنتقاله والإحتكاك مهلهلة . نأخذ $g = 10 \text{ N. kg}^{-1}$

1. ينتقل الجسم (S) بدون سرعة بدنية من النقطة A ليصل الى النقطة B بطاقة حركية $J = 400 \text{ J}$ بين المعدل A و B

2. أحسب شغل وزن الجسم (S) عند إنتقاله من A الى B نعطي : $AB = 6 \text{ m}$

3. بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية ، أوجد قيمة شغل توتر الحبل خلال الإنتقال AB وإستنتاج توتره T



تمرين تطبيقي 2: تكون المجموعات من

• جسم صلب (S) كتلته $m = 0.8 \text{ Kg}$ قابل لإنزلاق فوق مستوى مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي

• بكرة متجانسة شعاعها $r = 10 \text{ cm}$ قابلة للدوران بدون احتكاك حول محورها الثابت وعزم قصورها $J_A = 10^{-2} \text{ Kg.m}^2$

• خيط غير مدور كتلته مهلهلة ، ملفوّع على مجربة البكرة وثبت طرفه الحر بالجسم (s)

يمثل المنحنى الممثل في الشكل 2 تغيرات السرعة الزاوية للبكرة بدلالة الزمن

1. حدد الطاقة الحركية للبكرة عند التاریخ $t_1 = 1 \text{ s}$

2. بين التاریخين t_0 و t_1 أجزت البكرة 3,19 trs (دور) بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية حدد T توتر الخيط

3. حدد المسافة d التي قطعها الجسم (S) بين التاریخين t_0 و t_1

4. حدد طبعة التماس بين الجسم (S) والمستوى المائل . نأخذ $g = 10 \text{ N. kg}^{-1}$