

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

سلسلة تمارين تتابع تحول كيميائي

تمرين 1

- أكتب معادلة احتراق الكربون في غاز ثانوي الأوكسجين.
- حرق $1,3\text{mol}$ من الكربون في 4mol من غاز ثانوي الأوكسجين.
- أنجز جدولًا لنطورة التفاعل الحاصل بين الكربون و غاز ثانوي الأوكسجين متضمناً الحالة البدئية و الحالة خلال التفاعل و الحالة النهائية.
- أحسب كمية مادة كل من الكربون و غاز ثانوي أوكسيد الكربون عندما يأخذ التقدم القيمة $x = 0,2\text{mol}$.
- تكون قيمة التقدم الأقصى هي: $x_{\text{max}} = 1,3\text{mol}$ ، أحسب كمية مادة كل متفاعلة متبق في الحالة النهائية، و استنتج المقادير المحددة.

تمرين 2

في كأس ، نصب حجماً $V=20\text{mL}$ من محلول (S) لحمض الكلوريدريك H^+_{aq} تركيزه $C=5,10^{-2}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ على كتلة $m=135\text{mg}$ من مسحوق الألومنيوم $\text{Al}_{\text{(s)}}$. فت تكون أيونات الألومنيوم $\text{Al}^{3+}_{\text{aq}}$ ، و يتضاعف غاز ثانوي الهيدروجين $\text{H}_2\text{(g)}$.

1 صف كيف يمكنك إبراز وجود أيونات الألومنيوم؟

2 نفس السؤال بالنسبة لغاز ثانوي الهيدروجين.

3 احسب كميّي المادّة البدائيّة للمتفاعلين.

4 أنشئ جدول التقدم و حدد المقادير المحددة و التقدم الأقصى.

5 حدد حصيلة المادّة عند نهاية التفاعل.

6 احسب التركيز المولّي لأيونات الألومنيوم في الكأس.

7 ما حجم غاز ثانوي الهيدروجين المتضاعف في شروط التجربة (25°C و 1bar) .

نعطي: $R = 8,314\text{ (SI)}$ و $M(\text{Al}) = 27\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

تمرين 3

في شروط معينة، تتفاعل كمية من الكربون كتلتها $m = 2,4\text{g}$ مع حجم $V = 3,6\text{ l}$ من ثانوي الأوكسجين فينتج ثانوي أوكسيد الكربون.

1- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل.

2- أنجز الجدول الوصفي لهذا التفاعل.

3- حدد المقادير المحددة ثم استنتج التقدم الأقصى.

4- أنجز حصيلة مادة التفاعل.

5- أرسم مخطط تغيرات كميات مادة المتفاعلات بدلالة تقدم التفاعل السلم: $(1\text{cm} \rightarrow 0,02\text{mol})$ بالنسبة لقدم التفاعل.

و $(1\text{cm} \rightarrow 0,05\text{mol})$ بالنسبة لكميات المادّة للمتفاعلات.

6- احسب حجم أحادي أوكسيد الكربون الناتج و حجم ثانوي الأوكسجين المتبقى عند نهاية التفاعل.

نعطي: $V_m = 24\text{l}\cdot\text{mol}^{-1}$ و $M(C) = 12\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

تمرين 4

نأخذ قارورة سعتها $V=0,51\text{ l}$ عند $C=25^\circ\text{C}$ و ندخل فيها قطعة من الزنك Zn كتلتها $m=0,22\text{g}$ ثم نصب عليها حجماً $V_s=20\text{ml}$ من محلول كلورور الهيدروجين $\text{H}^+_{\text{aq}} + \text{Cl}^-_{\text{aq}}$ تركيزه $C=2,0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1- الكشف عن نواتج التفاعل:

نضع في أنبوب اختبار قطعة من الزنك Zn ثم نصب عليها قليلاً من محلول حمض الكلوريدريك و نغلقه بعض الدقائق.

1-1: نفتح الأنبوب و نقربه من اللهب . ماذا تلاحظ؟ حدد الناتج الذي تم الكشف عنه.

1-2: نضيف إلى محلول قليلاً من محلول الصودا . ماذا تلاحظ؟ حدد الناتج الذي تم الكشف عنه.

2- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل.

3- أحسب كمية مادة المتفاعلات في الحالة البدئية.

4- أحسب قيمة x_{max} التقدم الأقصى للتفاعل.

5- احسب كمية المادّة لثانوي الهيدروجين الناتج.

6- اعتماداً على معادلة الحالة للغازات الكاملة احسب قيمة $P(\text{H}_2)$ ضغط ثانوي الهيدروجين الناتج

نعطي: $P(\text{H}_2) = 8,314\text{ (SI)}$ و $R = 8,314\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

تمرين 5

حرق عند درجة الحرارة $\theta = 20^\circ\text{C}$ ، كمية من الحديد Fe كتلتها m في قبضة حجمها $V = 500\text{ml}$ بها غاز ثانوي الكلور Cl_2 تحت ضغط P فينتج دخان أشقر لكلورور الحديد $\text{III}(\text{FeCl}_3)$. يمثل المخطط جانبه تطور كميّي مادة المتفاعلين بدلالة تقدم التفاعل x .

1- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل.

2- حدد مبيانيا التركيب المولّي للمجموعة عند الحالة البدئية و المقادير المحددة و التقدم الأقصى للتفاعل.

3- أحسب m و P .

4- أنجز حصيلة مادة التفاعل.

5- أحسب الضغط النهائي P داخل القارورة عندما تأخذ درجة الحرارة قيمتها $C = 20^\circ\text{C}$.

6- أرسم على المخطط السابق تطور كمية مادة كلورور الحديد III الناتج بدلالة التقدم x .

نعطي: $R = 8,134\text{ (S.I)}$ و $M(\text{Fe}) = 55,8\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

