

تمرين الكيمياء رقم 1 :

ننجز احتراق 0,10 mol من برادة الحديد في حوالة تحتوي على 0,10 mol من ثنائي غاز الكلور Cl_2 .

1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل ووزنها .

2- أنشئ جدول نغم التفاعل ثم استنتج المتفاعل المحد والتقدم الأقصى.

3- اوجد كتلة كلورور الحديد III الناتج.

نعطي : $M(Fe) = 55,8g/mol$ و $M(Cl) = 35,5g/mol$

تمرين الكيمياء رقم 2 :

ننجز احتراق قطعة من الكربون كتلتها $m = 0,96g$ في حجم $V = 120L$ من ثنائي الأوكسجين .

1 - اكتب معادلة التفاعل الحاصل.

2- حدد كمية المادة البدنية لكل من الكربون والأوكسجين .

3- أنشئ جدول التقدم المعبر عن حالات المجموعة البدنية والوسطية والنهائية .

4- أوجد قيمة التقدم الأقصى وحد المتفاعل المحد .

5- استنتج كتلة الكربون المتبقية وحجم ثنائي أوكسيد الكربون المتكون عند نهاية التفاعل .

نعطي : $M(C) = 12g/mol$ والحجم المولي : $V_M = 24L/mol$.

* تمرين الكيمياء رقم 3 :

يتكون ثنائي أوكسيد الكربون CO_2 في المغارات بتأثير المياه الحمضية على كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ الموجودة في الأحجار الكلسية.


معطيات: الكتل المولية الذرية ب (g/mol) : $M_C = 12$ ، $M_O = 16$ ، $M_H = 1$ ، $M_{Ca} = 40$.

كثافة غاز بالنسبة للهواء تعطى بالعلاقة التالية: $d = \frac{M}{29}$.

لدراسة هذا التفاعل نصب في حوالة حجما $V_s = 100mL$ من محلول حمض الكلوريدريك $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $c = 0,1mol/L$ ثم

نضيف إليه كتلة $m = 2g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$.

فيحدث تفاعل كيميائي نتمذجه بالمعادل الكيميائية التالية:



1 - احسب كثافة الغاز الناتج بالنسبة للهواء . حدد في أي جزء من المغارة يتكون هذا الغاز؟

2- لماذا أيونات الكلورور Cl^- لا تظهر في المعادلة الكيميائية؟

3- احسب كمية المادة البدنية لكل من المتفاعلين.

4- أتمم ملء جدول تقدم التفاعل التالي. ثم استنتج التقدم الأقصى والمتفاعل المحد.

$CaCO_3 + 2H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3H_2O$					معادلة التفاعل	
(mol) كميات المادة					التقدم	الحالة
		0	0	بوفرة	0	الحالة البدنية
				بوفرة	x	حالة التحول
				بوفرة	x max	الحالة النهائية

1-4) اجد الأيونات المتواجدة في المحلول خلال التحول.

4-2) أعط تعابير تراكيز الأيونات المتواجدة في المحلول خلال التحول.

تمرين الكيمياء رقم 4 :

نحرق 2,7 g من الألومنيوم Al في حوالة تحتوي على 5L من ثنائي الأوكسجين وذلك في الظروف التي يكون فيها الحجم

المولي $V_M = 24L/mol$ فنحصل على أوكسيد الألومنيوم (الألمين) Al_2O_3 .

1) اكتب معادلة التفاعل ووزنها .

2) احسب كمية مادة المتفاعلات في الحالة البدنية.

3) باستعمال جدول التقدم احسب التقدم الأقصى واستنتج المتفاعل المحد.

4) احسب كتل الأنواع الكيميائية المكونة للحالة النهائية وكذا حجم ثنائي الأوكسجين المتبقى.

نعطي : $M(Al) = 27g/mol$ ، $M(O) = 16g/mol$

تمرين الكيمياء رقم 5 :

نعتبر التفاعل التالي: $C + Fe_2O_3 \rightarrow CO_2 + Fe$

1) وازن هذه المعادلة.

2) علما أن هذا التفاعل ينتج عنه 56g من الحديد عند نهاية التفاعل.

(أوجد كمية مادة الحديد الناتجة عن التفاعل)

ب) باستعمال جدول التقدم عند نهاية التفاعل عند استعمال 16g من Fe_2O_3 ، و الكربون بوفرة ، وما كتلة الحديد الناتجة في هذه الحالة؟
 نعطى : $M(Fe) = 56g/mol$ $M(O) = 16g/mol$

تمرين الكيمياء رقم 6 :

نضيف كتلة $m = 0,1g$ من مسحوق الألومنيوم إلى حجم $V_s = 150mL$ من محلول حمض الكلوريدريك $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه $Co = 0,1mol/L$
 فيحدث التفاعل التالي : $2Al + 6H_3O^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$

(1) أنشأ جدول تقدم هذا التفاعل.


(2) استنتج المتفاعل المحد.

(3) احسب تراكيز الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول في الحالة النهائية.

نعطى : $M(Al) = 27g/mol$ والحجم المولي : $V_M = 24L/mol$

تمرين الكيمياء رقم 7 :

يحترق مسحوق الألومنيوم في ثنائي الأوكسجين حسب المعادلة التالية:



(1) وازن هذه المعادلة.

(2) باستعمال جدول التقدم احسب كمية مادة ثنائي الأوكسجين المستهلك وكمية مادة أوكسيد الألومنيوم المكون عندما تختفي : $4mol$ من الألمنيوم.

تمرين الكيمياء رقم 8 :

نعتبر الاحتراق الكامل للبروبان C_3H_8 في ثنائي الأوكسجين الذي ينتج عنه ثنائي أوكسيد الكربون والماء.

(1) اكتب معادلة التفاعل ووازنها.

(2) املأ جدول التقدم في كل من الحالتين التاليتين :

* إذا كانت الحالة البدئية تتكون من $2mol$ من البروبان و $7mol$ من ثنائي الأوكسجين ، حدد الحالة النهائية.


* إذا كانت الحالة البدئية تتكون من $1,5mol$ من البروبان و $7,5mol$ من ثنائي الأوكسجين ، حدد الحالة النهائية.

تمرين الكيمياء رقم 9 :

Al + O ₂ → Al ₂ O ₃				المعادلة
$n(Al)$	$n(O_2)$	$n(Al_2O_3)$	التقدم ب :	الحالة
(mol)	(mol)	(mol)	(mol)	
7	6	...	...	الحالة البدئية
$7-4x_1$		...	x_1	حالة التحول 1
...		...	$x_2 = 0,5$	حالة التحول 2
...		2,5	x_3	حالة التحول 3
.....			x_{max}	الحالة النهائية

تمرين الكيمياء رقم 10 :

نصب في كأس حجما $V_g = 100ml$ من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه $100mmol/l$ على 2g من كربونات



نقيس حجم ثنائي أوكسيد الكربون $V_{(CO_2)}$ الناتج عن التفاعل عند درجة الحرارة $20^\circ C$ وتحت الضغط $1013hPa$.

(1) احسب كمية مادة أيونات الأوكسونيوم البدئية وكمية مادة كربونات الكالسيوم البدئية ب: ال : $mmol$

(2) أنشئ جدول التقدم الموافق للتفاعل الحاصل ثم أوجد قيمة التقدم الأقصى.

(3) أوجد حجم غاز CO_2 الناتج عن التفاعل عند اللحظة التي يكون فيها التقدم $x = \frac{x_{max}}{2}$.

(4) حدد تركيز أيونات الكالسيوم عند نهاية التفاعل .

نعطى : $M(CaCO_3) = 100g/mol$ ، $R = 8,314J/mol.K$

التصحيح correction

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 1



معدلة التفاعل	$2Fe$	$+ 3Cl_2$	$\rightarrow 2FeCl_3$
الحالة البدئية	0,10	0,10	0
حالة التحول	$0,10-2x$	$0,10-3x$	$2x$
الحالة النهائية	$10-2x_f$	$0,10-3x_f$	$2x_f$

$$0,10-2x_{\max}=0 \Rightarrow x_{\max}=0,05\text{mol}$$

إذا كان Fe هو المحد

$$0,10-3x_{\max}=0 \Rightarrow x_{\max}=0,033\text{mol}$$

إذا كان Cl_2 هو المحد


$$x_{\max}=0,033\text{mol}$$

$0,033\text{mol} < 0,05\text{mol}$ إذن Cl_2 هو المحد

في الحالة النهائية : $n(FeCl_3)=2x_{\max}=0,066\text{mol}=m/M$

$$m=M(FeCl_3)*0,066 = 162,3*0,066 = 10,7\text{g}$$

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 2:



(2)-كمية مادة الكربون البدئية :

$$n_o(C) = \frac{m(C)}{M(C)} = \frac{0,96\text{g}}{12} = 0,08\text{mol}$$

$$n_o(O_2) = \frac{v(O_2)}{V_m} = \frac{120\text{L}}{24\text{L/mol}} = 5\text{mol}$$

كمية مادة الأوكسجين البدئية :

$C + O_2 \rightarrow CO_2$			معدلة التفاعل	
كميات المادة ب mol			التقدم	الحالة
0,08	5	0	0	البدئية
$0,08-x$	$5-x$	x	x	التحول
$0,08-x_f$	$5-x_f$	x_f	x_f	النهائية

(3)

(4) $x_{\max}=0,08\text{mol}$ المتفاعل المحد هو الكربون.

وحجم ثنائي أوكسيد الكربون المتكون $V(CO_2) = 1,92\text{L}$

(5) - كتلة الكربون المتبقية منعدمة لأنه يستهلك كلها .

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 3 :

$$M(CO_2) = M(C) + 2M(O) = 12 + 32 = 44\text{g/mol}$$

1- كثافة غاز CO_2 بالنسبة للهواء : $d = \frac{M}{29} = \frac{44}{29} \approx 1,5 > 1$ إذن غاز CO_2 أثقل من الهواء وبالتالي فهو يتكون في الجزء السفلي من المغارة.

2- Cl^- أيونات غير نشيطة - لا تشارك في التفاعل.

$$n(CaCO_3) = \frac{m}{M} = \frac{2}{100} = 2.10^{-2}\text{mol}$$

$$M(CaCO_3) = M_{Ca} + M_C + 3 M_O = 100\text{g.mol}^{-1} \quad (3)$$

$$n(H_3O^+) = CV = 0,1\text{mol/L} \cdot 0,1\text{L} = 10^{-2}\text{mol}$$

(4)

$CaCO_3 + 2H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3H_2O$					معدلة التفاعل	
كميات المادة (mol)					التقدم	الحالة
2.10^{-2}	10^{-2}	0	0	excès	0	الحالة البدئية
$2.10^{-2} - x$	$10^{-2} - 2x$	x	x	excès	x	حالة التحول
$2.10^{-2} - x_m$	$10^{-2} - 2x_m$	x_m	x_m	excès	x_m	الحالة النهائية

إذا كان $CaCO_3$ هو المحد : $2,0.10^{-2} - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 2,0.10^{-2}\text{mol}$

إذا كان H_3O^+ هو المحد : $10^{-2} - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 5.10^{-3}\text{mol}$

بما أن المتفاعل المحد يوافق أصغر تقدم أقصى فإن H_3O^+ هو المتفاعل المحد ومنه : $x_{\max} = 5.10^{-3}\text{mol}$

(5) 1-4 Ca^{2+} ، Cl^- ، H_3O^+

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-2} - 2x}{V} , [Ca^{2+}] = \frac{x}{V} , [Cl^-] = C \quad 2-4$$

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 4 :

$$n(O_2) = \frac{v(O_2)}{V_M} = \frac{5L}{24L/mol} = 0,21mol$$

$$n(Al) = \frac{m}{M} = \frac{2,7}{27} = 0,1mol \quad (2)$$

4Al	+	3 O ₂	----->	2 Al ₂ O ₃	
0,1 mol		0,21 mol		0	الحالة البدئية
0,1-4x _{max}		0,21-3. x _{max}		2x _{max}	حالة التحول

بالنسبة للألومنيوم: $x_{max} = 0,025mol \leq 0,1-4.x_{max}=0$
وبالنسبة لثنائي الأوكسجين: $x_{max} = 0,07mol \leq 0,21-3.x_{max}=0$
الألومنيوم هو المتفاعل المحد. هو الذي يختفي قبل ثنائي الأوكسجين.
إذن $x_{max} = 0,025mol$

4 كميات مادة الأنواع الكيميائية المكونة للحالة النهائية :

$$n(Al) = 0,1 - 4.x_{max} = 0,1 - 4.(0,025) = 0$$

$$n(O_2) = 0,21 - 3.(0,025) = 0,125 mol$$

$$n(Al_2O_3) = 2.x_{max} = 2(0,025) = 0,05mol.$$

كتل الأنواع الكيميائية المكونة للحالة النهائية :

$$m(Al) = n(Al).M(Al) = 0$$

$$n(O_2) = n(O_2).M(O_2) = 16g/mol.0,125 mol = 2g$$

$$M(Al_2O_3) = 2.(27) + 3.(16) = 102g/mol$$


$$n(Al_2O_3) = M.n = 102. 0,05 = 5,1g.$$

$$n(O_2) = \frac{V(O_2)}{V_M}$$

حجم ثنائي الأوكسجين عند نهاية التفاعل:

$$V_{(O_2)} = n.V_M = (0,125) . 24 = 3L$$

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 5 :



(1 معادلة الفاعل:

$$n(Fe) = \frac{m(Fe)}{M(Fe)} = \frac{56g}{56g/mol} = 1mol$$

(2 كمية مادة الحديد الناتجة عن التفاعل:




$$\begin{array}{cccc} n_o & n'o & 0 & 0 \\ n_o - 3x & n'o - 2x & 3x & 4x \end{array}$$

بما أننا نحصل عند نهاية التفاعل على 56g من الحديد ، فإن كمية مادة الحديد : $n(Fe) = 1mol = 4x_{max}$

$$x_{max} = 0,25mol \text{ :التقدم الأقصى}$$

$$n(Fe_2O_3) = \frac{m(Fe_2O_3)}{M(Fe_2O_3)} = \frac{16g}{160g/mol} = 0,1mol$$

(3



$$\begin{array}{cccc} \text{بوفرة} & 0,1 & 0 & 0 \\ \text{بوفرة} & 0,1-2x & 3x & 4x \end{array}$$

$$0,1-2x_{max}=0 \quad Fe_2O_3 \text{ هو المتفاعل المحد.}$$

$$x_{max} = 0,05mol$$

ومنه:

وبالتالي تركيب الخليط عند نهاية التفاعل هو كما يلي :



$$\begin{array}{cccc} \text{بوفرة} & 0 & 0,15 & 0,2 \end{array}$$

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 6 :

$$1 - \text{كمية مادة الألومنيوم البدئية} : n_o(Al) = \frac{m}{M(Al)} = \frac{0,1g}{27g/mol} = 3,7.10^{-3} mol$$

$$2 - \text{كمية مادة الأيونات } H_3O^+ \text{ البدئية} : n_o(H_3O^+) = CV = 0,1mol/L.0,150L = 1,5.10^{-2} mol$$

جدول التقدم : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

$3,7 \cdot 10^{-3}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$	0	0	بوفرة
$3,7 \cdot 10^{-3} - 2x$	$1,5 \cdot 10^{-2} - 6x$	$2x$	$3x$	بوفرة
$3,7 \cdot 10^{-3} - 2x_f$	$1,5 \cdot 10^{-2} - 6x_f$	$2x_f$	$3x_f$	بوفرة

$x_{\max} = 1,85 \text{ mol}$ لأن المفاعل المحد هو الألومنيوم.

$$[H_3O^+] = \frac{1,5 \cdot 10^{-2} - 6x_{\max}}{V} = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} , \quad [Al^{3+}] = \frac{2x_{\max}}{V} = 2,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \quad - 3$$

الأيونات Cl^- غير نشطة لم تتفاعل وبما أن حجم المحلول لم يتغير فإن تركيزها المولي الفعلي : $[Cl^-] = 0,1 \text{ mol/L}$.

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 7 :



(2) جدول تقدم التفاعل :

$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$		
n_1	n_2	0
$n_1 - 4x$	$n_2 - 3x$	$2x$

من خلال جدول التقدم لدينا :

$3x$ = كمية مادة الأوكسجين المستهلك (أي المتفاعل) .

$2x$ = كمية مادة الألومنيوم المكون (أي الناتج عن التفاعل) .


$4x$: تمثل كمية مادة أوكسيد الألومنيوم المستهلك أو المختفي (أي المتفاعل) .

أ) عندما تختفي 4 mol من الألومنيوم لدينا : $4x = 4 \text{ mol}$ ومنه : $x = 1 \text{ mol}$

وبالتالي : كمية مادة ثنائي الأوكسجين المستهلك : $n(O_2) = 3x = 3 \cdot (1 \text{ mol}) = 3 \text{ mol}$

وكمية مادة أو كسيد الألومنيوم المكون : $n(Al_2O_3) = 2 \cdot x = 2 \cdot (1 \text{ mol}) = 2 \text{ mol}$

تصحيح تمرين الكيمياء رقم 8 :



(2) * الحالة الأولى :

	C_3H_8	$5O_2$	$3CO_2$	$4H_2O$
الحالة البدئية $t=0$	2 mol	7 mol	0	0
حالة التحول	$2-x$	$7-5x$	$3x$	$4x$
الحالة النهائية	$2-x_{\max}$	0	$3x_{\max}$	$4x_{\max}$

التقدم الأقصى يوافق الاختفاء الكلي للمتفاعل المحد . $2-x_{\max} = 0 \rightarrow x_{\max} = 2 \text{ mol}$

$7-5x_{\max} = 0 \rightarrow x_{\max} = 1,4 \text{ mol}$

ومنه يتضح أن البروبان مستعمل بإفراط وبالتالي المتفاعل المحد هو الأوكسجين .

$x_{\max} = 1,4 \text{ mol}$

	C_3H_8	$5O_2$	$3CO_2$	$4H_2O$
الحالة النهائية	$2-1,4 = 0,6 \text{ mol}$	0	$3 \cdot 1,4 = 4,2 \text{ mol}$	$4 \cdot 1,4 = 5,6 \text{ mol}$

نعطي التركيب النهائي للخليط في الجدول التالي :

* الحالة الثانية :

	C_3H_8	$5O_2$	$3CO_2$	$4H_2O$
الحالة البدئية $t=0$	1,5 mol	7,5 mol	0	0
حالة التحول	$1,5-x$	$7,5-5x$	$3x$	$4x$

$1,5-x_{\max} = 0 \rightarrow x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$

$7,5-5x_{\max} = 0 \rightarrow x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$

لنحدد التقدم الأقصى :

ومنه يتضح أن البروبان وثنائي الأوكسجين مستعملان بقيم ستوكيومترية ، إذن هما متفاعلين محددين ، يختفي كل منهما عند نهاية التفاعل.

	C_3H_8	$5O_2$	$3CO_2$	$4H_2O$
الحالة نهائية	0	0	$3 \cdot (1,5) = 4,5 \text{ mol}$	$4 \cdot (1,5) = 6 \text{ mol}$

تمرين الكيمياء رقم 9 :

المعادلة	الحالة	التقدم ب : (mol)	$n(Al_2O_3)$	$n(O_2)$ (mol)	$4Al$
الحالة البدئية	0	0	0	6	7
حالة التحول 1	x_1	$2x_1$	$6-3x_1$	$7-4x_1$	
حالة التحول 2	$x_2 = 0,5$	1	4,5	5	
حالة التحول 3	$x_3 = 1,25$	2,5	2,25	2	
الحالة النهائية	$x_{max} = 1,75$	3,5	0,75	0	

تمرين الكيمياء رقم 10 :

$$n_{o(H_3O^+)} = c.V_S = 0,1l \times 100 \times 10^{-3} mol / L = 0,01 mol = 10 m.mol \quad (1)$$

$$n_o(CaCO_3) = \frac{m}{M} = \frac{2g}{100 g / mol} = 0,02 mol = 20 m.mol$$

معادلة التفاعل					الحالة	التقدم
$CaCO_3 + 2H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3H_2O$					الحالة البدئية	0
كميات المادة ب : mol					عند اللحظة t	x
20	10	0			بوفرة	x
$20 - x$	$10 - 2x$	x	x		بوفرة	x_{max}
$20 - x_{max}$	$10 - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}			

إذا اعتبرنا ان المتفاعل المحد هو $CaCO_3$ لدينا
 و إذا اعتبرنا أن المتفاعل المحد هو H_3O^+ لدينا
 التقدم الأقصى يوافق أصغر قيمة ل: x_{max}

ومنه فإن المتفاعل المحد هو H_3O^+

إذن: $x_{max} = 5 m.mol$

(3) لدينا :

ومن خلال جدول التقدم لدينا :

$$V_{(CO_2)} = \frac{x_{(t)} \cdot R \cdot T}{P} \quad \text{إذن:}$$

$$x = \frac{x_{max}}{2} = 2,5 \times 10^{-3} mol \quad (4)$$

وبذلك يمكننا تحديد حجم ثنائي اوكسيد الكربون :

$$V_{(CO_2)} = \frac{x \cdot R \cdot T}{P} = \frac{2,5 \times 10^{-3} mol \times 8,314 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \times 293 K}{1013 \times 10^2 Pa} = 6 \times 10^{-5} m^3 = 60 m L$$

لدينا من خلال المعادلة:



$$n(Ca^{2+}) = n(CO_2) = x$$

عند نهاية التفاعل ، لدينا ، من خلال جدول التقدم



$$n(Ca^{2+}) = n(CO_2) = x$$

لدينا من خلال المعادلة:

عند نهاية التفاعل ومن خلال جدول التقدم لدينا :

$$[Ca^{2+}] = \frac{n(Ca^{2+})}{V_S} = \frac{x_{max}}{V_S} = \frac{5 \times 10^{-3} mol}{0,1 L} = 0,05 mol / L$$