

## المتجهات في الفضاء

### (I)-تساوي متجهتين - جمع المتجهات 1- عناصر متجهة


$A$  و  $B$  نقطتين مختلفتين من الفضاء، إذا رمزاً للمتجهة  $\vec{AB}$  بالرمز  $\vec{u}$  فان :

- اتجاه  $\vec{u}$  هو اتجاه المستقيم  $(AB)$


- منحي  $\vec{u}$  هو المنحي من  $A$  إلى  $B$

- منظم  $\vec{u}$  هي المسافة  $AB$  و نكتب:


**ملاحظة:** لكل نقطة  $A$  من الفضاء المتجهة  $\vec{AA}$  ليس لها اتجاه و منظمها منعدم.  
 $\vec{AA} = \vec{0}$  تسمى المتجهة المنعدمة و نكتب



تكون متجهتان متساويتان اذا كان لهما نفس الاتجاه و نفس المنحي و نفس المنظم




لكل متجهة  $\vec{u}$  من الفضاء ولكل نقطة  $A$  في الفضاء  
 $\vec{u} = \vec{AM}$  حيث  $M$  توجد نقطة وحيدة



لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  أربع نقاط من الفضاء  
 $\vec{AC} = \vec{BD}$  إذا وفقط إذا كان  $\vec{AB} = \vec{CD}$  (تبديل الوسطين)  
 $\vec{DB} = \vec{CA}$  إذا وفقط إذا كان  $\vec{AB} = \vec{CD}$  (تبديل الطرفين)

### 3- مجموع متجهتين - علاقة شال

أ-  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتان في الفضاء  
 لتكن  $A$  نقطة من الفضاء،  
 $\vec{AB} = \vec{u}$  حيث  $B$  توجد نقطة وحيدة  
 $\vec{BC} = \vec{v}$  حيث  $C$  توجد نقطة وحيدة  
 في النقطتان  $A$  و  $C$  تحددان متجهة  
 $\vec{w} = \vec{AC}$  وحيدة



المتجهة  $\vec{w}$  هي مجموع المتجهتين  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$   
 $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$  نكتب  $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$


### ب- علاقة شال

مهما كانت النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  من الفضاء  
 $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$

### نتيجة

لتكن  $O$  و  $N$  و  $M$  و  $R$  أربع نقاط من الفضاء  
 $\vec{OM} + \vec{ON} = \vec{OR}$  إذا وفقط إذا كان  $OMRN$  متوازي الأضلاع

**ملاحظة:** اذا كانت  $\vec{u} = \vec{OM}$  و  $\vec{v} = \vec{ON}$  فان  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{OR}$   
 $\vec{u} + \vec{v} = \vec{OR}$  حيث  $OMRN$  متوازي الأضلاع



## ج- خصائص

- \*- لكل متوجهين  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$   $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- \*- لكل ثلاث متوجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$   $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- \*- لكل متتجة  $\vec{u}$   $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

## مقابل متوجهة - فرق متوجهين

### أ- مقابل متوجهة

لتكن  $\vec{u}$  متوجهة غير منعدمة في الفضاء مقابل المتوجهة  $\vec{u}$  هي المتوجهة التي لها نفس الاتجاه و نفس المنظم و منحها مضاد لمنحي المتوجهة  $\vec{u}$  نرمز لها بالرمز  $\vec{-u}$


$$\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0} : \text{لكل متوجهة } \vec{u}$$

$$\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0} : \text{لكل نقطتين } A \text{ و } B \text{ من المستوى لدينا } \vec{AB} = -\vec{BA}$$

$$\vec{AB} = -\vec{BA} \text{ و } \vec{BA} = -\vec{AB} : \text{المتجهتان } \vec{AB} \text{ و } \vec{BA} \text{ متقابلان}$$

### ب- فرق متوجهين تعريف

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) : \text{لكل متوجهين } \vec{u} \text{ و } \vec{v}$$



$$\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} : \text{لكل ثلاث نقاط } A \text{ و } B \text{ و } C$$

ملاحظة

أمثلة

مكعب  $ABCDEFGH$

$$\vec{ED} + \vec{EF} = \vec{EC}$$

$$\vec{BC} = -\vec{HE}$$

$$\vec{AB} = \vec{HG}$$

### ـ4 منتصف قطعة

$$(\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}) : \text{إذا وفقط إذا كان } I \text{ منتصف } [AB]$$

### II) الاستقامية- التعريف المتوجهي للمستقيم

#### 1- ضرب متوجهة في عدد حقيقي

##### تعريف


متوجهة غير منعدمة و  $k$  عدد حقيقي غير منعدم جداء المتوجهة  $\vec{u}$  في العدد الحقيقي  $k$  هي المتوجهة  $k\vec{u}$  حيث :

\*  $\vec{u}$  و  $k\vec{u}$  لهما نفس الاتجاه


$$\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\| *$$

منحي  $\vec{u}$  إذا كان  $k > 0$  منحي  $k\vec{u}$  هو \*

عكس منحي  $\vec{u}$  إذا كان  $k < 0$



$$k < 0$$



$$k > 0$$

\* لكل متوجهة  $\vec{u}$  ولكل عدد حقيقي  $k$   $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$  و  $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$  :

## 2 - خصائص

مهما تكون المتجهتان  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و مهما يكن العددان الحقيقيان  $\alpha$  و  $\beta$  فان

$$(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$


$$\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$$

$$(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u})$$

$$1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$$

$$\vec{u} = \vec{0} \text{ إذا وفقط إذا كان } \alpha = 0 \text{ أو } \alpha\vec{u} = \vec{0}$$

تكون متوجهان  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستقيميتين إذا و فقط كانت احداهما جداء الآخر في عدد حقيقي



**ملاحظة**

$\vec{0}$  مستقيمية مع أي متوجهة

**استقامة ثلاث نقط**

**تعريف**

لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  نقاطا من الفضاء حيث  $A \neq B$

تكون النقطة  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي  $\alpha$  حيث

**توازي مستقيمين**

لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  نقاطا من الفضاء حيث  $A \neq B$  و  $C \neq D$

إذا و فقط إذا كان  $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$  مستقيميدين

**التعريف المتوجهي لمستقيم في الفضاء**

**تعريف**

لتكن  $A$  و  $B$  نقطتين مختلفتين من الفضاء

كل متوجهة  $\vec{u}$  غير منعدمة و مستقيمية مع المتوجهة  $\overrightarrow{AB}$

تسمى متوجهة موجهة للمستقيم  $(AB)$

**خاصية**

لتكن  $A$  نقطة من الفضاء و  $\vec{u}$  متوجهة غير منعدمة

مجموعه النقاط  $M$  من الفضاء حيث  $\overrightarrow{AM} = \alpha \vec{u}$  و  $\alpha \in \mathbb{R}$

هي المستقيم المار من  $A$  و الموجه بـ  $\vec{u}$ . نرمز له بالرمز  $D(A; \vec{u})$

$$D(A; \vec{u}) = \{M \in (E) / \overrightarrow{AM} = \alpha \vec{u} ; \alpha \in \mathbb{R}\}$$


**تمرين**

ليكن  $\overrightarrow{AD} = \vec{i}$   $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$   $\overrightarrow{AH} = \vec{k}$  مكعبا نضع  $ABCDEFGH$

$[HG]$  منتصف  $\overrightarrow{HG} = \vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$  و  $\overrightarrow{AE} = \vec{k}$

1- بين أن  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(AI)$

2- ليكن المستقيم  $(\Delta)$  المار من  $G$  و الموازي للمستقيم  $(AI)$  و  $M$  نقطة من الفضاء حيث



$$M \in (\Delta) \text{ . بين أن } \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2 \overrightarrow{BG}$$

**الجواب**

1- نبين أن  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(AI)$

أي نبين أن  $\overrightarrow{AI}$  و  $\vec{u}$  مستقيميدين

$$\overrightarrow{HI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{HG} \text{ ومنه } [HG] \text{ منتصف } I \text{ لدينا}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HI} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EH} + \frac{1}{2} \overrightarrow{HG}$$

بما أن  $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{AB} = \vec{i}$  و  $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD} = \vec{j}$  فان  $\overrightarrow{AI} = \vec{k} + \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) = \frac{1}{2} \vec{u}$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{AI} = \vec{k} + \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) = \frac{1}{2} \vec{u}$$

إذن  $\overrightarrow{AI}$  و  $\vec{u}$  مستقيمييان و منه  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(AI)$

2- نبين أن  $M \in (\Delta)$

لدينا  $(\Delta)$  المار من  $G$  و الموازي للمستقيم  $(AI)$  أي  $(\Delta) = D(G; \vec{u})$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CG}$$


بما أن  $ABCDEF$  مكعب فان  $\overrightarrow{j}$  متجه من المستوى  $(P)$

$$\overrightarrow{GM} = -\overrightarrow{j} - \overrightarrow{k} + \frac{1}{2}\overrightarrow{i} + 2\overrightarrow{j} + 2\overrightarrow{k} = \frac{1}{2}\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j} + \overrightarrow{k} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{i} + 2\overrightarrow{j} + \overrightarrow{k}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{u}$$

و بالتالي  $M \in D(G; \overrightarrow{u})$  إذن  $M \in D(P; \overrightarrow{u})$

## III) الاستوائية- التعريف المتجهي للمستوى

### 1- تعريف



ليكن  $(P)$  مستوى من الفضاء و  $A$  و  $B$  و  $C$  نقط غير مستقيمية من المستوى  $(P)$   
نقول إن  $(P)$  هو المستوى المار من  $A$  و الموجه بالمتجهتين  $\overrightarrow{AC}$  و  $\overrightarrow{AB}$

### نتيجة

متجهتان  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  غير مستقيمييتين و نقطة من الفضاء تحدد مستوى وحيدا  $(P)$  هو المستوى المار من النقطة  $A$  و الموجه بالمتجهتين  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  نرمز له بالرمز  $P(A; \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$


### خاصية

لتكن  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  متجهتين غير مستقيمييتين و  $A$  نقطة من الفضاء.  
مجموعه النقاط  $M$  من الفضاء حيث  $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{u} + y\overrightarrow{v}$  و  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  هي المستوى  $(P)$  المار من  $A$  و الموجه بالمتجهتين  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  و نكتب  $(P) = P(A; \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$

### 2- الاستوائية تعريف

لتكن  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  و  $\overrightarrow{w}$  ثلاث متجهات في الفضاء  
نقول إن المتجهات  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  و  $\overrightarrow{w}$  مستوائية اذا وفقط وجدت أربع نقاط مستوائية  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  حيث  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{w}$  و  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{v}$

### أمثلة



لتكن  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  و  $\overrightarrow{w}$  متجهات متوازية المستطيلات  $ABCDEF$   
و  $\overrightarrow{BH}$  و  $\overrightarrow{BC}$  و  $\overrightarrow{BE}$  مستوائية لأن النقط  $B$  و  $C$  و  $E$  و  $H$  مستوائية  $[(BC) \parallel (EH)]$   
و  $\overrightarrow{BD}$  و  $\overrightarrow{BH}$  و  $\overrightarrow{BE}$  غير مستوائية لأن  $BDEH$  رباعي الأوجه

### خاصية

لتكن  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  متجهتين غير مستقيمييتين و  $\overrightarrow{w}$  متجهة في الفضاء  
المتجهات  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{v}$  و  $\overrightarrow{w}$  مستوائية إذا وفقط إذا وجد عددين حقيقيين  $x$  و  $y$  حيث  $\overrightarrow{w} = x\overrightarrow{u} + y\overrightarrow{v}$

### نتيجة

إذا وجد عددين حقيقيين  $x$  و  $y$  فان  $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$  حيث  $M$  و  $C$  و  $B$  و  $A$

### تمرين


هرم قاعدته المستطيل  $EABCD$  و  $I$  و  $J$  منتصف  $[AE]$  و  $[BC]$  على التوالي.

يبين أن المتجهات  $\overrightarrow{IJ}$  و  $\overrightarrow{EC}$  و  $\overrightarrow{AB}$  مستوائية

### الحل

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ}$$

و حيث  $I$  و  $J$  منتصف  $[AE]$  و  $[BC]$  فان :



$$\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \text{ و } \overrightarrow{IA} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EA}$$

و بالتالي

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \text{ ومنه}$$

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA} \text{ ومنه}$$

إذن  $\overrightarrow{EC}$  و  $\overrightarrow{AB}$  و  $\overrightarrow{IJ}$  متساوية