

## المقادير الفيزيائية المرتبطة بكميات المادة

### 1-المادة الصلبة والسائلة

#### 1-كمية المادة : Quantité de la matière :

كمية المادة  $n$  مقدار يتناسب اطراضا مع عدد الدقائق  $N$  المكونة للمادة ( ذرات ، أيونات ، جزيئات ....) وحدتها في النظام العالمي للوحدات المول يرمز لها ب (mol).  
تعبير  $n$  كمية المادة :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

مقدار بدون وحدة  
 $mol^{-1}$

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$  : تسمى ثابتة أفوکادرو قيمتها :

#### 2-العلاقة بين الكتلة وكمية المادة :

يمكن قياس الكتلة  $m$  من جسم صلب أو سائل (أو غاز) من تحديد  $n$  كمية المادة في هذه العينة بالعلاقة التالية :

$$n = \frac{m}{M}$$

$mol$  ←      →  $g$   
                →  $g \cdot mol^{-1}$

#### تطبيق 1:

أحسب كمية مادة جزيئات الماء الموجودة في  $100 g$  من الماء .

أحسب كمية مادة ذرات الحديد الموجودة في  $100 g$  من فلز الحديد .

نعطي :  $M(H) = 1 g \cdot mol^{-1}$  ،  $M(O) = 16 g \cdot mol^{-1}$  ،  $M(Fe) = 56 g \cdot mol^{-1}$

#### 3-العلاقة بين الحجم وكمية المادة :

يمكن قياس حجم  $V$  لعينة من جسم صلب أو سائل كتلته الججمية  $\rho$  من تحديد كمية المادة في هذه العينة بالعلاقة التالية :

$$n = \frac{\rho \cdot V}{M}$$

$g \cdot mL^{-1}$  ←      →  $mL$   
 $mol$  ←      →  $g \cdot mol^{-1}$

نذكر أن :  $\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V$

#### تطبيق 2:

ما الحجم  $V$  للهكسان ( $C_6H_{12}$ ) وهو سائل ذي كتلة حجمية  $\rho = 0,66 g \cdot mol^{-1}$  ، الذي يجب استعماله للحصول على كمية هكسان .

نكتب :  $V = \frac{n \cdot M}{\rho}$  ت.ع :  $V = 19,5 mL$

تساوي الكثافة  $d$  لجسم صلب أو سائل بالنسبة للماء ، خارج كتلته الحجمية  $\rho$  الى الكتلة الحجمية  $\rho_{eau}$  للماء :  
أي :  $d = \rho \cdot \rho_{eau}$  حيث  $d$  مقدار بدون وحدة و  $\rho_{eau} = 1 g \cdot ml^{-1}$  .

العلاقة السابقة تصبح :

$$n = \frac{d \cdot \rho_{eau} \cdot V}{M}$$

## II-حالة المادة الغازية

### 1-الحجم المولى :

الحجم المولى هو الحجم الذي يشغله مول واحد من جزيئات الغاز ، في ظروف معينة لدرجة الحرارة و الضغط يرمز له ب  $V_m$

في الشروط النظامية لدرجة الحرارة والضغط ( $\theta_0 = 0^\circ C$  ;  $P_0 = 1 atm$ ) الحجم المولى النظامي :  $V_0 = 22,4 L \cdot mol^{-1}$

### 2-العلاقة بين كمية المادة والحجم المولى :

كمية المادة  $n$  لغاز حجمه  $V$  في شروط معينة لدرجة الحرارة والضغط حيث  $V_m$  الحجم المولى تعطى بالعلاقة التالية

$$n = \frac{V}{V_m}$$

### 3-قانون بويل - ماريוט :

عند درجة حرارة ثابتة ، يكون جداء حجم كمية غاز في ضغطها ثابتا :  $P \cdot V = K$  .  
تناسب الثابتة  $K$  مع كمية مادة الغاز حيث :  $K = n \cdot A$  مع  $A$  ثابتة تتعلق بدرجة الحرارة .

### 4-درجة الحرارة المطلقة :

درجة الحرارة المطلقة لغاز ، نرمز لها ب  $T$  ووحدتها الكافيين  $K$  تربطها بدرجة الحرارة المئوية العلاقة :

$$T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273,15$$

### 5-معادلة الحالة للغازات الكاملة :

تنصرف جميع الغازات ، تحت ضغط منخفض ، كغاز مثالي يسمى الغاز الكامل .

الغاز الكامل هو الذي يخضع لقانون بويل - ماريوت .

معادلة الحالة للغازات الكاملة هي :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

حيث :  $P$  : ضغط الغاز ب (Pa)

$V$  : حجم الغاز ب ( $m^3$ )

$n$  : كمية مادة الغاز ب (mol)

$T$  : درجة الحرارة ب (K)

$R$  : ثابتة الغازات الكاملة قيمتها في النظام العالمي للوحدات  $R = 8,314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

### 6-كثافة غاز بالنسبة لغاز :

كثافة غاز بالنسبة للهواء تعطى بالعلاقة التالية :  $d = \frac{\rho}{\rho_0}$

حيث  $\rho$  : الكتلة الجمجمية للغاز و  $\rho_0$  : الكتلة الجمجمية للهواء .

باعتبار حجم الهواء يساوي حجم الغاز يساوي الحجم المولى  $V_m$  نكتب :

$d = \frac{M}{\rho_0 \cdot V_m} = \frac{M}{29}$  : الكتلة المولية للغاز .

تبقى هذه العلاقة صحيحة أيا كانت درجة الحرارة و الضغط .

**تطبيق 3 :**

أحسب كثافة غاز  $CO_2$  ثنائي أوكسيد الكربون واستنتج .  
الكتلة المولية :  $M = M(C) + 2M(O) = 12 + 16 \times 2 = 44 \text{ g.mol}^{-1}$   
 $d = \frac{44}{29} = > 1$  نستنتج أن غاز  $CO_2$  أثقل من الهواء .