

تصحيح تمارين المقادير المرتبطة بكمية المادة

تمرين 1:

- كمية مادة الساکاروز المذابة :

$$n = \frac{m}{M}$$

M الكتلة المولية للساکاروز حيث :

$$M = 12M(C) + 22M(H) + 11M(O) = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16$$

$$M = 342 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$n = \frac{5,9g}{342 \text{ g. mol}^{-1}} n = 1,7 \cdot 10^{-2} \leftarrow \text{ت.ع.}$$

- التركيز المولى :

$$C = \frac{n}{V} \text{ تركيز محلول الساکاروز :}$$

$$C = \frac{1,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{250 \cdot 10^{-3} \ell} C = 6,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.} \ell^{-1} \leftarrow \text{ت.ع.}$$

- كتلة الساکاروز ' m المذابة في الحجم ' V = 20ml من محلول (S) :

للعينة ذات الحجم ' V نفس التركيز للمحلول (S) نسمى ' n' كمية مادتها حيث:

$$n' = C \cdot V'$$

كما أن كمية المادة ' n' تكتب أيضا :

$$n' = \frac{m'}{M}$$

$$m' = C \cdot V' \cdot M \text{ نستنتج أن : } \frac{m'}{M} = C \cdot V' \text{ ومنه :}$$

$$\text{ت.ع. : } m' = 6,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.} \ell^{-1} \times 20 \cdot 10^{-3} \ell \times 342 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$m' = 0,46 \text{ g}$$

تمرين 2:

- تساوي كثافة جسم صلب خارج كتلة m حجم معين من الجسم وكتلة ' m' نفس الحجم من الماء .

$$d = \frac{m}{m'} = \frac{\rho \cdot V}{\rho_e \cdot V} d = \frac{\rho}{\rho_e} \leftarrow$$

حيث : ρ الكتلة الحجمية للجسم الصلب .

و ρ_e : الكتلة الحجمية للماء .

$$\rho = d \rho_e$$

$$\text{بما أن : } \rho_e = 1 \text{ g. cm}^{-3}$$

$$\text{نستنتج : } \rho(Ti) = 4,51 \text{ g. cm}^{-3}$$

- حساب كمية المادة الموجودة في الحجم ' V من التيطان :

نعلم أن :

$$m = \rho \cdot V \quad n = \frac{m}{M}$$

ومنه :

$$n = \frac{\rho \cdot V}{M}$$

ت.ع:

$$n = \frac{4,51 \text{ g.cm}^{-3} \times 1,32 \text{ cm}^3}{48 \text{ g.mol}^{-1}}$$

$$n = 0,12 \text{ mol}$$

تمرين 3:

1- حساب الكتلة المولية للأسيتون ذي الصيغة الأجمالية : $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$

$$M = 3M(C) + 6M(H) + M(O)$$

$$M = 3 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 58 \text{ g.mol}^{-1}$$

2- كثافة جسم سائل هو جارج كتلة حجم V للجسم على كتلة نفس الحجم من الماء .
نكتب :

$$d = \frac{m}{m'} = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$$

نستنتج :

$$\rho = d \cdot \rho_{eau}$$

$$\rho = 0,79 \text{ g.cm}^{-3}$$

3- استنتاج كمية المادة الموجودة في الحجم $V=1\ell$ لدينا :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \cdot V}{M}$$

ت.ع:

$$n = \frac{0,79 \text{ g.cm}^{-3} \times 1 \cdot 10^3 \ell}{58 \text{ g.mol}^{-1}} n = 13,62 \text{ mol} \leftarrow$$

تمرين 4:

1- حساب كمية مادة الإيثانول في العينة :

$$C = \frac{n}{V} \Rightarrow n = C \cdot V$$

ت.ع: $n = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \ell^{-1} \times 100 \cdot 10^{-3} \ell$

2- حساب الكتلة المولية للإيثانول :

$$M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2M(C) + 6M(H) + M(O)$$

$$M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g.mol}^{-1}$$

3- حساب الكتلة المذابة في هذا محلول :

نعلم أن: $m = n \cdot M$ و منه :

$$m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \times 46 \text{ g.mol}^{-1} = 0,92 \text{ mol}$$

ت.ع:

تمرين 5:

1- كمية مادة الهواء داخل الإطار :

حسب معادلة الغازات الكاملة : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

ت.ع:

$$n = \frac{2,10 \cdot 10^5 \times 30 \cdot 10^{-3}}{2,57 \times (20 + 273)} n = 2,57 \text{ mol} \leftarrow$$

2- درجة حرارة الهواء داخل الإطار :

نطبق من جديد معادلة الغازات الكاملة :

$$T = \frac{P \cdot V}{n \cdot R}$$

ت.ع :

$$T = \frac{2,30 \cdot 10^5 \times 30 \cdot 10^{-3}}{2,57 \times 8,314} T = 322,9 \text{ K} \leftarrow$$

$$\theta = 322,9 - 273 = 49,9^\circ \text{C}$$

3- العلاقات السابقة تبقى صالحة لكل الغازات طالما اعتبرت كاملة ، إذن كمية مادة الغاز المحصل عليها تبقى بدون تغيير والضغط كذلك أما الذي يتغير فهو كتلة الغاز .

إذا عوضنا الهواء بثنائي الأزوت أي عوضنا أوكسجين الهواء بالأزوت دون تغيير كمية المادة فإن الضغط سيكون نفسه و الكتلة ستتغير قليلا لأن $n=m/M$ و $M(O_2)=32 \text{ g/mol}$ و $M(N_2)=28 \text{ g/mol}$

القيم المنصوص بها تبقى صالحة لأن الذي سيتغير هو كتلة الغاز داخل الإطار ولكن بشكل ضعيف .

تمرين 6:

1- حساب كمية مادة O_2 الموجود في العينة :

$$n = \frac{v}{V_m} n = \frac{416}{104} = \text{mol}$$

2- حساب كتلة العينة :

$$n = \frac{m}{M(O_2)} m = n \cdot M(O_2)$$

ت.ع:

$$m = 4 \text{ mol} \times 2 \times 16 \text{ g/mol}^{-1} = 128 \text{ g}$$

تمرين 7:

ليكن m كتلة حمض الإيثانويك في الخل m' كتلة الخل حيث: $100 \times$

$\rho \cdot V = m'$ مع V حجم الخل و ρ كتلته الحجمية

نستنتج من العلاقات :

$$m = \frac{X}{100} m' m = \frac{X}{100} \rho \cdot V$$

كمية مادة الحمض :

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{X}{100} \frac{\rho \cdot V}{M}$$

التركيز المولى لحمض الإيثانوليك :

$$C = \frac{n}{V}$$

نستنتج العلاقة :

$$C = \frac{X}{100} \frac{\rho}{M}$$

ت.ع:

$$C = \frac{6}{100} \times \frac{1,02 \cdot 10^3 g \cdot mol^{-1}}{60 g \cdot mol^{-1}}$$

$$C = 1,02 mol \cdot \ell^{-1}$$

تمرين 8:

1- مدلول معطيات اللصيقة :

$M = 36,46 g/mol$ يمثل الكتلة المولية للغاز HCl المذاب في محلول 37% يمثل النسبة المئوية الكتليلية لكلورور الهيدروجين المذابة : أي $100g$ من محلول تحتوي على $37g$ من HCl .

$d = 1,15$ يمثل كثافة محلول (بالنسبة للماء).

2- التركيز المولى لهذا محلول :

ليكن m كتلة كلورور الهيدروجين الموجودة في محلول حيث :

حيث m' كتلة محلول نكتب : $m' = \rho \cdot V$

كتلته الحجمية و V حجمه

كثافة محلول تكتب : $d = \frac{\rho}{\rho_e} \rho = d \cdot \rho_e \Leftrightarrow$

ومنه $m' = \rho_e \cdot d \cdot V$

تعبير m يكتب :

$$m = \frac{37}{100} \rho_e \cdot d \cdot V$$

كمية مادة كلورور الهيدروجين هي :

$$n = \frac{m}{M}$$

نعرض m بتعبيره نحصل على :

$$n = \frac{37}{100} \frac{\rho_e \cdot d \cdot V}{M}$$

التركيز المولى لكلورور الهيدروجين :

$$C = \frac{n}{V}$$

$$C = \frac{37}{100} \times \frac{\rho_e \cdot d}{M}$$

ت.ع:

$$C = \frac{37}{100} \times \frac{1.10^3 (g \cdot mol^{-1}) \times 1,15}{36,46 g \cdot mol^{-1}} C = 11,67 mol \cdot \ell^{-1}$$

تمرين 9

1- كمية مادة ثنائي الأوكسيجين داخل البالون :

باعتبار غاز ثنائي الأوكسيجين غازا كاملا نكتب :

$$n_1 = \frac{P_1 \cdot V}{R \cdot T_1}$$

ت.ع:

$$n_1 = \frac{1020.10^2 \times 1,50.10^{-3}}{8,314 \times (273 + 22)} n_1 = 6,24.10^{-2} mol \leftarrow$$

2- كمية مادة غاز ثنائي الأزوت :

باعتبار الخليط غازا كاملا .

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

ت.ع :

$$n = \frac{1050.10^5 \times 1,5.10^{-3}}{8,314 \times (273 + 22)} n = 6,42.10^{-2} mol \leftarrow$$

كمية مادة ثنائي الأزوت :

$$n = n_1 + n_2$$

$$n_2 = n - n_1$$

ت.ع:

$$n_2 = 6,42.10^{-2} - 6,24.10^{-2} = 1,8.10^{-2} mol$$

3- كتلة الخليط :

$$m = m_1 + m_2$$

- كتلة غاز ثنائي الأوكسيجين :

$$m_1 = n_1 M(O_2)$$

$$m_1 = 6,42.10^{-2} \times 2 \times 16 = 2,0g$$

- كتلة غاز ثنائي الأزوت :

$$m_2 = 1,8.10^{-2} \times 2 \times 14 = 0,05g$$

- كتلة الخليط :

$$m = 2 + 0,05 = 2,05g$$

تمرين 10

1- حساب الحجم المولى للغازات :

معادلة الحالة للغازات الكاملة : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

لدينا : $V = V_m$ عندما تكون $n=1$

معادلة الحالة تكتب :

$$P \cdot V_m = R \cdot T V_m = \frac{R \cdot T}{P} \leftarrow$$

$$V_m = \frac{8,314 \times (20+273)}{1,013 \cdot 10^5} = 2,4 \cdot 10^{-2} m^3 mol^{-1}$$

$$V_m = 24 \ell \cdot mol^{-1}$$

2- كمية مادة الغازات :

$$n = \frac{V}{V_m} n = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{24} \leftarrow n = 6,25 \cdot 10^{-2} mol \leftarrow$$

3- كتلة غاز كل من O_2 و N_2 :

$$n(O_2) = \frac{20}{100} n = 0,2 \times 6,25 \cdot 10^{-2} = 1,25 \cdot 10^{-2} mol$$

$$n(N_2) = \frac{80}{100} n = 0,8 \times 6,25 \cdot 10^{-2} = 5 \cdot 10^{-2} mol$$

$$m(O_2) = n(O_2) \times M(O_2)$$

$$m(O_2) = 1,25 \cdot 10^{-2} \times 2 \times 16 m(O_2) = 0,4 g \leftarrow$$

$$m(N_2) = n(N_2) \times M(N_2)$$

$$m(N_2) = 5 \cdot 10^{-2} \times 2 \times 14 m(N_2) = 1,4 g \leftarrow$$

4- عندما نغير درجة الحرارة ، يبقى الحجم ثابتا وكذلك كمية المادة ، بينما يتغير الضغط .

$$\begin{cases} P \cdot V = n \cdot R \cdot T \\ P' \cdot V = n \cdot R \cdot T' \end{cases} \Rightarrow \frac{P}{P'} = \frac{T}{T'} \Rightarrow P' = \frac{T'}{T} P$$

ت.ع:

$$P' = \frac{(100 + 273)}{(20 + 273)} \times 1,013 \cdot 10^5 Pa P' = 1,29 \cdot 10^5 Pa \leftarrow$$

يرتفع الضغط بارتفاع درجة الحرارة

5.1) عندما نفتح القنية ، يبقى الضغط بداخلها مساويا للضغط الجوي P_{atm}

$$n' = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

ت.ع:

$$n' = \frac{1,013 \cdot 10^5 \times 1,5 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times (100 + 273)} n' = 4,9 \cdot 10^{-2} mol \leftarrow$$

5.2) حساب الحجم المولى عند $100^\circ C$

$$V'_m = \frac{V}{n'} \leftarrow n' = \frac{V}{V'_m}$$

$$V'_m = \frac{1,5}{4,9 \cdot 10^{-2}} V'_m = 30,6 \ell \cdot mol^{-1} \leftarrow$$