

تطبيقات ل تتبع تحول كيميائي Application au suivi d'une transformation chimique


I - كيفية تتبع تطور تحول كيميائي وتحديد حالته النهائية

1- التحول الكيميائي

عند مزج مختلف الأنواع الكيميائية التي تكون مجموعة كيميائية (الحالة البدئية)، يحدث تحول كيميائي إذا اختفت بعض الأنواع (المتفاعلات) وتكونت أنواع جديدة (النواتج)، نقول إن المجموعة تتطور Evolve. **ملحوظة:**

تُوصف المجموعة المكونة من أنواع كيميائية بتحديد طبيعة النوع، حالته الفيزيائية، كمية مادته وكذا درجة الحرارة θ والضغط P بالنسبة للمجموعة.

2- نشاط تجريبي



II - تقدم التفاعل والجدول الوصفي ومحصلة المادة

1- تقدم التفاعل: Avancement

خلال التحول يرافق تكون $1mol$ من $Ca_3(PO_4)_{2(S)}$ اختفاء $3mol$ من الأيونات Ca_{aq}^{2+} و $2mol$ من الأيونات PO_{4aq}^{3-} بصفة عامة:

يرافق $xmol$ من $Ca_3(PO_4)_{2(S)}$ اختفاء $3xmol$ من Ca_{aq}^{2+} و $2xmol$ من PO_{4aq}^{3-} .

- نسمى كمية المادة X ، تقدم التفاعل ويعبر عنها بالمول (mol) ؛
- يمكن التقدم من تحديد كميات المادة لمختلف النوع الكيميائي المساهمة في التفاعل خلال تطور المجموعة.

2- الجدول الوصفي وحصيلة المادة

❖ كميات المادة البدئية:

$$n_i(\text{Ca}_{aq}^{2+}) = C_1 V_1 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_i(\text{PO}_{4aq}^{3-}) = C_2 V_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

❖ جدول التقدم:

<u>معادلة التفاعل</u>			x (mol)	حالة المجموعة
كميات المادة بالتحول				
6 \cdot 10 $^{-3}$	2 \cdot 10 $^{-3}$	0	0	الحالة البدئية
6 \cdot 10 $^{-3}$ - 3x	2 \cdot 10 $^{-3}$ - 2x	x	x	حالة التحول

3- التقدم الأقصى والمتفاعل الحدي

الحالة النهائية لمجموعة كيميائية هي الحالة التي تتوقف فيها هذه المجموعة عن التطور. عندما يختفي كلها أحد المتفاعلات، المسمى الحدي، عندئذ يساوي التقدم النهائي التقدم الأقصى . x_{\max}

مثال:

✓ إذا كان Ca_{aq}^{2+} هو المتفاعل الحدي فإن: $n(\text{Ca}^{2+}) = 0,006 - 3x = 0 \Rightarrow x_{\max} = \frac{0,006}{3} = 0,002 \text{ mol}$

✓ إذا كان PO_{4aq}^{3-} هو المتتفاعل الحدي فإن: $n(\text{PO}_4^{3-}) = 0,002 - 2x = 0 \Rightarrow x_{\max} = \frac{0,002}{2} = 0,001 \text{ mol}$

يوافق التقدم الأقصى x_{\max} أصغر قيمة.

إذن $x_{\max} = 0,001 \text{ mol}$ ، وبالتالي فإن PO_{4}^{3-} هو المتفاعل الحدي الذي يختفي كلها.

<u>معادلة التفاعل</u>			x_{\max}	الحالة النهائية
$3\text{Ca}_{aq}^{2+} + 2\text{PO}_{4aq}^{3-} \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_{2(S)}$				
0,006 - 3 \cdot 0,001 = 0,003 mol	0	0,001 mol	= 0,001 mol	

4- الخليط stoichiometrique

الخليط stoichiometric هو عندما يختفي المتفاعلان معاً.

مثال:

$$n_i(\text{Ca}^{2+}) - 3x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = \frac{n_i(\text{Ca}^{2+})}{3}$$

$$n_i(\text{PO}_4^{3-}) - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = \frac{n_i(\text{PO}_4^{3-})}{2}$$

أي: $\frac{n_i(\text{Ca}^{2+})}{3} = \frac{n_i(\text{PO}_4^{3-})}{2}$

بصفة عامة: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}$$

يكون الخليط البدئي للمتفاعلين استوكيومترياً إذا كانت: