

## TD-ETUDE DES FONCTIONS

**Exercice1 :** Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \frac{1}{12}x^4 - 2x^2 + x + \frac{2}{3}$$

1. Déterminer les dérivées première et seconde de la fonction  $f$ .
2. Dresser le tableau de signe de  $f''(x)$ . et étudier la concavité de la courbe de  $f$  et déterminer les points d'inflexions s'ils existent

**Exercice2 :** Soit la fonction  $f$  définie sur  $I = [0; \pi]$

par :  $f(x) = \sin^2 x$  Étudier la concavité de la courbe de  $f$  et déterminer les points d'inflexions s'ils existent sur  $I$

**Exercice3 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = x^2 \sqrt{1+x}$$

1. étudier la dérivabilité de  $f$  à droite en  $x_0 = -1$ .
2. donner une interprétation géométrique

**Exercice4 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{2x-1}{3x-6}$$

déterminer les limites aux bornes de  $D_f$  et (Donner une interprétation géométrique des résultats)

**Exercice5 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$$

Montrer que la droite  $(\Delta): y = -1$  est une asymptote horizontale à la courbe  $C_f$  au voisinage de  $-\infty$

**Exercice6 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* : f(x) = 2 + \frac{x-1}{x^2}$$

étudier la position de courbe  $(C_f)$  avec son asymptote horizontale à la courbe  $C_f$  au voisinage de  $\infty$

**Exercice7 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* - \{3\} : f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x-3}$$

montrer que la courbe  $C_f$  que la fonction  $f$  admet une asymptote oblique au voisinage de  $+\infty$  et au voisinage de  $-\infty$  que l'on déterminera

**Exercice8 :** Soit la fonction définie par :

$f(x) = \sqrt{x}$  étudier les branches paraboliques au voisinage de  $+\infty$

**Exercice9 :** Soit la fonction définie par :

$f(x) = x^3$  étudier les branches paraboliques au voisinage de  $+\infty$

**Exercice10 :** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^+$  par :

$$f(x) = x + \sqrt{x}$$

**Exercice11 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \sqrt{x^2+1}$$

1) Déterminer  $D_f$

2) montrer que la courbe  $C_f$  que la fonction  $f$  admet une asymptote oblique au voisinage de  $+\infty$  et au voisinage de  $-\infty$  que l'on déterminera

**Exercice12 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \sqrt{x-x^2}$$

1) Déterminer  $D_f$

2) montrer que la droite  $(\Delta): x = \frac{1}{2}$  est un axe de symétrie de la courbe  $C_f$

**Exercice13 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

montrer que la droite  $(\Delta): x = \frac{1}{3}$  est un axe de symétrie de la courbe  $C_f$

**Exercice14 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-3}$$

montrer que la droite  $(\Delta): x = 2$  est un axe de symétrie de la courbe  $C_f$

**Exercice15 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \cos x$$

montrer que la droite  $(\Delta): x = k\pi ; k \in \mathbb{Z}$  est un axe de symétrie de la courbe  $C_f$



**Exercice16 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x+1}$$

- 1) montrer que :  $\forall \in D_f : f(x) = x - 2 + \frac{2}{x+1}$
- 2) montrer que le point  $\Omega(-1; -3)$  est un centre de symétrie de  $(C_f)$

**Exercice17 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \sin x - \cos x$$

montrer que le point  $\Omega\left(\frac{\pi}{4}; 0\right)$  est un centre de symétrie de  $(C_f)$

**Exercice18 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \sqrt{4x^2 + 2x - 2}$$

- 1) Déterminer  $D_f$
- 2) Déterminer le domaine de dérivabilité de  $f$  et calculer  $f'(x)$
- 3) calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- 4) montrer que la courbe  $C_f$  que la fonction  $f$  admet une asymptote oblique au voisinage de  $-\infty$  que l'on déterminera

**Exercice19 :** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 3$$

- 1) Déterminer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$
- 2) étudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$
- 3) dresser le tableaux de variation de  $f$
- 4) Étudier la concavité de la courbe de  $(C_f)$  et déterminer les points d'inflexions s'ils existent sur  $\mathbb{R}$
- 5) montrer que le point  $I(0; 3)$  est un centre de symétrie de  $(C_f)$  et déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(C_f)$  en  $I(0; 3)$
- 6) on utilisant le tableaux de variation de  $f$  montrer que l'équation :  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  tel que :  $\alpha < -1$  et vérifier que  $-2.2 < \alpha < -2.1$  et déterminer le signe de  $f(x)$
- 7) Tracer la courbe  $C_f$  et discuter suivant les valeurs du paramètre  $m$  le nombre de solutions de l'équation :  $x^3 - 3x + 3 = m$

**Exercice20 :** soit  $f$  une fonction définie par :

$$f(x) = 2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1}$$

- 1) déterminer  $D_f$  ensemble de définition de  $f$
- 2) étudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$
- 3) étudier la position de courbe  $(C_f)$  avec son asymptote horizontal
- 4) étudier les variations de  $f$  et dresser le tableaux de variation de  $f$
- 5) déterminer les points d'intersections de  $(C_f)$  avec l'axe des abscisses  $f$
- 6) montrer que la droite d'équation  $x = \frac{1}{2}$  est un axe de symétrie de  $(C_f)$
- 7) tracer la courbe  $(C_f)$

**Exercice21 :** soit  $f$  une fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 3}$$

- 1) déterminer les limites aux bornes de  $D_f$
- 2) déterminer les réels  $a$  et  $b$  tel que :  
$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3} \quad \forall x \in D_f$$
- 3) étudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$
- 4) étudier les variations de  $f$  et dresser le tableau de variation de  $f$
- 5) montrer que le point  $\Omega(3; 4)$  est un centre de symétrie de  $(C_f)$
- 6) calculer  $f''(x) \quad \forall x \in D_f$  et étudier la concavité de la courbe de  $f$
- 7) étudier la position de courbe  $(C_f)$  et son asymptote oblique  $(\Delta)$
- 8) Déterminer les points d'intersection de la courbe  $(C_f)$  avec les axes du repère
- 9) déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(C_f)$  en  $x_0 = 2$
- 9) tracer la courbe  $(C_f)$

**Exercice 22:** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x - 2}$$

- 1) Déterminer  $D_f$
- 2) Déterminer les limites aux bornes de  $D_f$
- 3) étudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$
- 4) étudier la dérivabilité de  $f$  adroite de 2 et à gauche de -1



5) étudier les variations de  $f$  et dresser le tableaux de variation de  $f$

6) tracer la courbe  $(C_f)$

**Exercice23:** soit  $f$  une fonction définie par :

$$f(x) = 2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

1) déterminer  $D_f$  ensemble de définition de  $f$

2) montrer que  $f$  est périodique de période  $T = \pi$  et en déduire le domaine d'étude de  $f$

3) déterminer  $f'(x)$  et dresser le tableaux de variation de  $f$

4) tracer la courbe  $(C_f)$  sur l'intervalle  $[-\pi; \pi]$

**Exercice24:** soit  $f$  une fonction définie par :

$$f(x) = 4 \sin x + \cos 2x$$

1) déterminer  $D_f$  ensemble de définition de  $f$

2) montrer que  $f$  est périodique de période  $T = 2\pi$  et en déduire le domaine d'étude de  $f$

3) déterminer  $f'(x)$  et dresser le tableaux de variation de  $f$

4) donner l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe de  $f$  en  $x_0 = 0$

5) calculer  $f''(x)$  en fonction de  $\sin x$

6) déterminer les points d'inflexions de la courbe  $(C_f)$

7) tracer la courbe  $(C_f)$  sur l'intervalle  $[-2\pi; 4\pi]$

**Exercice25:** soit  $f$  une fonction définie par :

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$$

1) déterminer  $D_f$  ensemble de définition de  $f$

2) montrer qu'il suffit d'étudier  $f$  sur  $[0; \pi]$

3) déterminer  $f'(x)$  et dresser le tableaux de variation de  $f$

4) tracer la courbe  $(C_f)$  sur l'intervalle  $[-2\pi; 2\pi]$

## Autre exercices

**Exercice1 :** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = 2x^2 + 2x - 1$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
2. Déterminer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$ .
3. Interpréter géométriquement les résultats obtenus.

**Exercice2 :** Soit  $g$  la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{2x^2 - x}{x - 1}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition  $D_g$ .
2. Déterminer les limites aux bornes de  $D_g$
3. Effectuer la division de

$$P(x) = 2x^2 - x \text{ sur } (x - 1)$$

puis en déduire que  $(\forall x \in D_g) \quad g(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x - 1}$

4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - (2x + 1)$

On dit que la droite  $(\Delta): y = 2x + 1$  est une asymptote oblique à la courbe  $C_f$  au voisinage de  $+\infty$

**Exercice3 :** Soit la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

1. Déterminer le domaine de définition de  $h$  et étudier sa parité.
2. Etudier les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$
3. Déterminer la fonction dérivée de la fonction  $h$  et dresser le T.V
4. Déterminer l'équation de la tangente en  $O(0,0)$
5. Etudier les positions relatives de  $T$  et la courbe
6. Tracer la courbe  $C_f$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron »

Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien

