

دالة عكسية f^{-1} محددًا مجموعة تعريفها D

(2) أحسب $f\left(\frac{1}{16}\right)$ و استنتج أن $(f^{-1})\left(\frac{1}{8}\right)$

(3) أحسب $f^{-1}(x)$ لكل x من D

التمرين الخامس

لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R}^+ بما يلي :

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x}$$

1- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

2- بين أن $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ و أول هندسيا النتيجة

3- بين أن $f'(x) = \frac{2\sqrt[3]{x} - 1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ و أنجز جدول تغيرات f

4- أكتب معادلة المماس للمنحنى C_f في النقطة $A(1,0)$

5- دالة معرفة على $I = \left[\frac{1}{8}, +\infty\right[$ بما يلي :

$$g(x) = f(x)$$

أ- بين أن g تقبل دالة عكسية من I نحو مجال J يتم تحديده

ب- أحسب $g^{-1}(x)$ حيث x من J

ج- أحسب $(g^{-1})'(0)$

د- قارن $g^{-1}(\sqrt[5]{4})$; $g^{-1}(\sqrt[4]{3})$

6- ليكن a, b من المجال $]1, +\infty[$ بحيث $a > b$

$$\text{بين أن } \frac{a}{b} > \frac{b - b^{\frac{1}{3}}}{a - a^{\frac{1}{3}}}$$

التمرين السادس

لتكن f دالة عددية معرفة بما يلي : $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos 2x}$

و (C_f) منحنها في $M \times M$ م $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f

2. بين أن f دورية ودورها π

3. بين أن f زوجية

4. أستنتج D_E حيز دراسة الدالة f

5. أحسب $f'(x)$ ثم أعط جدول التغيرات على D_E

6. حدد الفروع اللانهائية للمنحنى (C_f)

أنشئ المنحنى (C_f)

التمرين الأول

لتكن f الدالة المعرفة على \mathbb{R}^+ بما يلي :

$$f(x) = 2(x-2)\sqrt{x} - x$$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) ادرس قابلية اشتقاق f على يمين $x_0 = 0$ و أول

النتيجة هندسيا

(3) بين أن $f'(x) = (\sqrt{x} - 1)\left(3 + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)$

(4) ضع جدول تغيرات الدالة f

(5) أعط معادلة المماس في النقطة $x_0 = 4$

(6) أرسم المنحنى C_f والمماس

التمرين الثاني

لتكن f الدالة المعرفة ب: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+2} - 1}$

① حدد D_f ثم أحسب نهايات عند محددات D_f

② أدرس الفرع اللانهائي للمنحنى C_f عند $+\infty$

③ أدرس قابلية اشتقاق f في النقطة $x_0 = -2$ على اليمين

④ بين أن $f'(x) = \frac{1 + (\sqrt{x+2} - 1)^2}{2\sqrt{x+2}(\sqrt{x+2} - 1)^2}$

⑤ أنجز جدول تغيرات f

⑥ ليكن g دالة معرفة على $I =]-1, 2]$ بما يلي :

$f(x) = g(x)$ بين أن g تقبل دالة عكسية من I نحو مجال J يتم تحديده

⑦ ارسم المنحنى C_f ومنحنى الدالة g^{-1} في نفس المعلم

التمرين الثالث

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2+1} & ; x \geq 0 \\ f(x) = x+1-2\sqrt{1-x} & ; x < 0 \end{cases}$$

(1) أحسب النهايتين $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f في النقطة 0

(3) بين أن f تقبل من $]0, +\infty[$ نحو مجال I دالة عكسية

التمرين الرابع

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $\left[0, \frac{1}{4}\right]$

بما يلي : $f(x) = (1-2\sqrt{x})^3$

(1) أدرس رقابة الدالة f و استنتج أن f تقبل