



. 01

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{2}{1+u_n} ; \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

. 01 نبين أن: $3 \leq u_n \leq 0$. $\forall n \geq 0$

نستدل على ذلك بالترجع :

• نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=0$.

لدينا : $u_0 = 3 \leq 0$ ومنه : $0 \leq u_0 \leq 3$ وبالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n=0$.

• نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $0 \leq u_n \leq 3$ صحيحة (معطيات الترجع)

• نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $0 \leq u_n \leq 3 \Rightarrow 0+1 \leq u_n+1 \leq 3+1$.

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{u_n+1} \leq \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{1}{4} \leq 2 \times \frac{1}{u_n+1} \leq 2 \times 1 ; (2 > 0)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{2}{u_n+1} \leq 2$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq 2 \leq 3$$

$$\Rightarrow 0 \leq u_{n+1} \leq 3$$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة : $\forall n \geq 0 : 0 \leq u_n \leq 3$

. 02 نعتبر المتتالية العددية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يلي: $\forall n \in \mathbb{N} ; v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$

أ- نبين أن المتتالية (v_n) هندسية وحدد عناصرها المميزة.

لدينا :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$$

$$= \frac{\frac{2}{u_n+1}-1}{\frac{2}{u_n+1}+2}$$

$$= \frac{2-u_n-1}{2+2u_n+2}$$



سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية

الصفحة



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \times \frac{-u_n + 1}{u_n + 2} \\
 &= \frac{-1}{2} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \\
 &= \frac{-1}{2} \times v_n \\
 v_{n+1} &= \frac{-1}{2} \times v_n \quad \text{ومنه}
 \end{aligned}$$

خلاصة: المتالية (v_n) هندسية أساسها: $q = -\frac{1}{2}$ وحدتها الأول هو $v_0 = 3$

بـ: نكتب v_n بدلالة n ثم نستنتج

• المتالية (v_n) هندسية أساسها: $q = -\frac{1}{2}$ وحدتها الأول $v_0 = -\frac{1}{2}$ إذن حدتها العام هو

$$\begin{aligned}
 v_n &= \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-n_0} \times v_{n_0} \quad (n_0 = 0) \\
 &= \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-0} \times \frac{2}{5} \quad \left(v_{n_0} = v_0 = \frac{2}{5}\right) \\
 &= \left(\frac{-1}{2}\right)^n \times \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

خلاصة: كتابة v_n بدلالة n ثم نستنتج

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

لدينا: $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n \times \frac{2}{5} = 0$ (حسب خاصية)

خلاصة: $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

. 02

نعتبر المتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يلي: $u_0 > 0$; $\forall n \in \mathbb{N}$

(1) نبين أن: $u_n > 0$. $\forall n \geq 0$

نستدل على ذلك بالترجع :

• نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n = 0$.

لدينا: $u_0 > 0$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$.

• نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $u_n > 0$ صحيحة (معطيات الترجع)



سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية



الصفحة

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.

سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية



الصفحة

- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن: $u_{n+1} > 0$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $0 < u_n$ و $0 < 2 + (u_n)^2$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{u_n}{2 + (u_n)^2} > 0 \\ &\Rightarrow u_{n+1} > 0 \end{aligned}$$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة: $\forall n \geq 0 : u_n > 0$

(2) نبين أن: u_n تناقصية ثم استنتج أنها متقاربة.

- نبين أن: u_n تناقصية :

لدينا :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n}{2 + (u_n)^2} - u_n \\ &= \frac{u_n - u_n(2 + (u_n)^2)}{2 + (u_n)^2} \\ &= \frac{u_n(1 - 2 - (u_n)^2)}{2 + (u_n)^2} \\ &= \frac{-u_n(1 + (u_n)^2)}{2 + (u_n)^2} < 0 \quad ; \quad (u_n > 0) \end{aligned}$$

ومنه: $u_{n+1} < u_n$ أي $u_{n+1} - u_n < 0$

خلاصة: u_n تناقصية

استنتج أنها متقاربة.

لدينا :

- $\forall n \geq 0 : u_n > 0$ أي مصغررة ب 0 .

- u_n تناقصية .

ومنه: u_n متقاربة (حسب خاصية).

خلاصة: u_n متقاربة .

(3)

أ- نبين أن: $\forall n \geq 0 : u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$

لدينا :

$$\begin{aligned} u_n > 0 &\Rightarrow (u_n)^2 > 0 \\ &\Rightarrow 2 + (u_n)^2 > 2 \end{aligned}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{2 + (u_n)^2} < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow u_n \times \frac{1}{2 + (u_n)^2} < u_n \times \frac{1}{2} ; (u_n > 0)$$

$$\Rightarrow u_{n+1} < \frac{u_n}{2}$$

. $u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$

خلاصة : $\forall n \geq 0 : u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$

بـ نستنتج أن: $\forall n \geq 0 : u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$

لدينا: $u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$

• بالنسبة ل: $n = 0$ إذن: $u_1 \leq \frac{u_0}{2}$

• بالنسبة ل: $n = 1$ إذن: $u_2 \leq \frac{u_1}{2}$

• بالنسبة ل: $n = 2$ إذن: $u_3 \leq \frac{u_2}{2}$

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

• بالنسبة ل: $n - 2$ إذن: $u_{n-1} \leq \frac{u_{n-2}}{2}$

• بالنسبة ل: $n - 1$ إذن: $u_n \leq \frac{u_{n-1}}{2}$

جاء المتفاوتات السابقة طرف بطرف مع العلم أن كل طرف موجب نحصل بعد الاختزال

على ما يلي: $u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$ أي $u_n \leq \underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}}_{n \text{ fois}} u_0$

خلاصة : $\forall n \geq 0 : u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$

ملحوظة : يمكن الاستدلال على ذلك بالترجع.

جـ نستنتج نهاية المتتالية u_n

لدينا:

• $u_n > 0$ حسب السؤال الأول

• $u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$ حسب السؤال الأخير



سلسلة رقم

لسنة 2015 - 2016

تصحيح تمارين : نهاية متتالية عددية

الصفحة



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.

$$\text{إذن: } 0 < u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_0}{2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \times u_0 = 0 ; \left(-1 < \frac{1}{2} < 1\right)$$

ومنه حسب أحد مصادق التقارب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

خلاصة: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

. 03

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يلي:

.01 .. أحسب: u_1 و u_2 .

$$\text{لدينا: } u_2 = \frac{u_1}{5+4u_1} = \frac{3}{17} \times \frac{1}{5+4 \times \frac{3}{17}} = \frac{3}{97} \text{ و } u_1 = \frac{u_0}{5+4u_0} = \frac{3}{5+4 \times 3} = \frac{3}{17}$$

خلاصة: $u_2 = \frac{3}{97}$ و $u_1 = \frac{3}{17}$

بـ بين أن: $u_n > 0$. $\forall n \geq 0$

نستدل على ذلك بالترجع :

• نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=0$.

لدينا : $u_0 = 3 > 0$ و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $0 = 0$.

• نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $u_n > 0$ صحيحة (معطيات الترجع)

• نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $u_{n+1} > 0$.

لدينا : حسب معطيات الترجع : $u_n > 0$ و $u_n > 0$.

$$\Rightarrow \frac{u_n}{5+4u_n} > 0$$

$$\Rightarrow u_{n+1} > 0$$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة: $\forall n \geq 0 : u_n > 0$

جـ بين أن: u_n تنافصية.

لدينا :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n}{5+4u_n} - u_n \\ &= \frac{u_n - u_n(5+4u_n)}{5+4u_n} \end{aligned}$$



سلسلة رقم

لسنة 2015 - 2016

تصحيح تمارين : نهاية متتالية عدديّة

الصفحة



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.

$$\begin{aligned} &= \frac{u_n(1-5-4u_n)}{5+4u_n} \\ &= \frac{-4u_n(1+u_n)}{5+4u_n} < 0 \quad ; \quad (u_n > 0) \end{aligned}$$

ومنه : $u_{n+1} < u_n$ أي $u_{n+1} - u_n < 0$

خلاصة : u_n تنقصية

د استنتج تقارب المتتالية u_n .

لدينا :

- $u_n > 0$ حسب السؤال الأول إذن u_n مصغورة

- u_n تنقصية.

- u_n متقارب (حسب خاصية).

خلاصة : u_n متقارب

.....02

أ بين أن: $\forall n \geq 0 : u_{n+1} \leq \frac{1}{5}u_n$

لدينا :

$$u_n > 0 \Rightarrow 5 + 4u_n > 5$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5 + 4u_n} < \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow u_n \times \frac{1}{5 + 4u_n} < u_n \times \frac{1}{5} ; (u_n > 0)$$

$$\Rightarrow u_{n+1} < \frac{u_n}{5}$$

و منه : $u_{n+1} \leq \frac{u_n}{5}$

خلاصة : $\forall n \geq 0 : u_{n+1} \leq \frac{u_n}{5}$

ب بين أن: $\forall n \geq 0 : u_n \leq 3\left(\frac{1}{5}\right)^n$

لدينا : $u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$

- بالنسبة ل: $u_1 \leq \frac{u_0}{5}$ إذن: $n = 0$

- بالنسبة ل: $u_2 \leq \frac{u_1}{5}$ إذن: $n = 1$

- بالنسبة ل: $u_3 \leq \frac{u_2}{5}$ إذن: $n = 2$



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.



سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متتالية عددية

الصفحة

•

• بالنسبة ل : $2 - n$ إذن : $\frac{u_{n-2}}{5}$

• بالنسبة ل : $n - 1$ إذن : $\frac{u_{n-1}}{5}$

جاء المتفاوتات السابقة طرف بطرف مع العلم أن كل طرف موجب نحصل بعد الاختزال

على ما يلي : $\forall n \geq 0 : u_n \leq 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n$ أي $u_n \leq \frac{3}{5^n}$ ومنه $u_n \leq \underbrace{\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \dots \times \frac{1}{5}}_{n \text{ fois}} u_0$

خلاصة : $\forall n \geq 0 : u_n \leq 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n$

ملحوظة : يمكن الاستدلال على ذلك بالترجع .

ج استنتج أن : $\forall n \geq 0 : 0 < u_n \leq 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n$

لدينا :

• $u_n > 0$ حسب السؤال الأول

• $u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$ حسب السؤال الأخير

• إذن : $0 < u_n \leq \frac{u_0}{2^n}$

خلاصة : $\forall n \geq 0 : 0 < u_n \leq 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n$

د أوجد النهاية التالية : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_0}{2^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n \times u_0 = 0$; $\left(-1 < \frac{1}{2} < 1 \right)$

• ومنه حسب أحد مصادق التقارب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

خلاصة : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$



لتكن u_n و v_n متتاليتين معرفتين بما يلي : لكل n من \mathbb{N} :

$$\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \frac{3v_n + 1}{4} ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n + 1}{4} ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

• طريقة 1 لتحديد نهاية u_n .

1. لنعتبر المتессالية s_n المعرفة ب : $\forall n \in \mathbb{N} , s_n = u_n + v_n$

بين بالترجع أن المتессالية s_n ثابتة .

نستدل على ذلك بالترجع :



سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية



الصفحة

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.

$$\text{لدينا: } s_n = u_0 + v_0 = 0 + 2 = 2 \quad \text{إذن نبين أن: } s_n = 2$$

نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n = 0$.

$$\text{لدينا: } s_{n+1} = u_0 + v_0 = 0 + 2 = 2 \quad \text{و بالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل } n = 1.$$

نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $s_n = 2$ صحيحة (معطيات الترجع)

$$\text{نبين أن العلاقة صحيحة ل } n+1. \quad \text{أي نبين أن: } s_{n+1} = 2$$

لدينا:

$$s_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{3u_n + 1}{4} + \frac{3v_n + 1}{4} = \frac{3(u_n + v_n) + 2}{4} = \frac{3s_n + 2}{4} = \frac{3 \times 2 + 2}{4} = 2$$

إذن: $s_{n+1} = 2$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة: المتالية s_n ثابتة مع 2

. 2. نعتبر المتالية d_n المعرفة ب: $d_n = v_n - u_n$

بين أن المتالية d_n هندسية محددا عناصرها المميزة.

لدينا:

$$d_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{3v_n + 1}{4} - \frac{3u_n + 1}{4} = \frac{3(v_n - u_n) + 1 - 1}{4} = \frac{3}{4}(v_n - u_n) = \frac{3}{4}d_n$$

$$\text{ومنه: } d_{n+1} = \frac{3}{4}d_n$$

خلاصة: المتالية d_n هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ وحدها الأول 2

. 3. استنتج: $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - u_n$

لدينا: المتالية d_n هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ إذن: $q = \frac{3}{4}$

$$\text{ومنه: } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n - u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0 ; \quad \left(-1 < \frac{3}{4} < 1\right)$$

خلاصة: $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - u_n = 0$

4.

أ. نكتب u_n بدلالة s_n و d_n ; ثم u_n بدلالة s_n .

لدينا:

$$\begin{cases} s_n = u_n + v_n \\ d_n = v_n - u_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s_n + d_n = 2v_n \\ s_n - d_n = 2u_n \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v_n = \frac{s_n + d_n}{2} & (1) \\ u_n = \frac{s_n - d_n}{2} & (2) \end{cases}$$



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ.



سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية

الصفحة

$$\text{و منه: } u_n = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$\therefore u_n = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$

b- نكتب v_n بدلالة s_n و d_n : ثم v_n بدلالة n .

$$\therefore v_n = \frac{s_n + d_n}{2} = \frac{2 + 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n}{2} = 1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$\therefore v_n = 1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n$

c- نستنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n = 1 ; \quad \left(-1 < \frac{3}{4} < 1\right)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n = 1 ; \quad \left(-1 < \frac{3}{4} < 1\right)$$

خلاصة : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

طريقة 2 لمعرفة نهاية u_n مبيانا.

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي : $f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$. الرسم أسفله (C_f) يمثل منحنى الدالة f والمستقيم (Δ)

ذو المعادلة : $y = x$: في معلم متعامد منظم (O, \vec{i}, \vec{j}) وحدة القياس 5 cm

1. نمثل على محور الأفاسيل النقط A_0 و A_1 و A_2 و A_3 و A_4 التي أراتتها منعدمة وأفاصيلها هي u_0 و u_1 و u_2 و u_3 و u_4

$$\therefore u_4 = \frac{175}{256} \approx 0,69 \quad u_3 = \frac{37}{64} \approx 0,58 \quad u_2 = \frac{7}{16} \approx 0,44 \quad u_1 = \frac{1}{4} = 0,25$$

على التوالي . مع على المنحنى نضع المثلث الذي تتبعه للحصول على قيم هذه الحدود و هي ممثلة على محور الأفاسيل بدون استعمال قيم u_1 و u_2 و

u_3 و u_4

أنظر الشكل المولاي :



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ج. أ


10

سلسلة رقم

لسنة 2016 - 2015

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية

الصفحة



ما هو النتئن الذي نحصل عليه؟ 2.

- المتالية u_n تزايدية .
- المتالية u_n مكورة ب 1 .
- الحدود u_n محصورة بين 0 و 1 أي $0 \leq u_n \leq 1$.
- المتالية متقاربة .
- نهاية المتالية هي 1 .
- طريقة 3 لتحديد نهاية u_n .

1.

أ- نعطي جدول تغيرات f على \mathbb{R} .

$$\text{جدول تغيرات الدالة } f. \text{ لدينا : } f'(x) = \frac{3}{4}$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	\nearrow	$+\infty$

ب- نبين أن : $f([0;1]) \subset [0;1]$



سلسلة رقم

لسنة 2015 - 2016

تصحيح تمارين : نهاية متالية عددية



الصفحة

لدينا :

- الدالة f متصلة على $[0;1]$ (حدودية)

- الدالة f تزايدية قطعا على $[0;1]$

$$\therefore f([0;1]) = [f(0), f(1)] = \left[\frac{1}{4}; 1 \right] \subset [0;1] \quad \text{ومنه :}$$

ج - أكتب المتالية (u_n) مستعملا الدالة f .

$$\text{لدينا : } u_{n+1} = f(u_n)$$



أ - بين ان : $0 \leq u_n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

نستدل على ذلك بالترجع :

- نتحقق أن العلاقة صحيحة ل $n=0$.

لدينا : $u_0 = 0$ و منه : $0 \leq u_0 = 0 \leq 1$ وبالتالي العلاقة صحيحة بالنسبة ل $n=0$.

- نفترض أن العلاقة صحيحة إلى n أي $0 \leq u_n \leq 1$ صحيحة (معطيات الترجع)

- نبين أن العلاقة صحيحة ل $n+1$. أي نبين أن : $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

لدينا : حسب معطيات الترجع $0 \leq u_n \leq 1 \Rightarrow \frac{3}{4} \times 0 \leq \frac{3}{4} \times u_n \leq \frac{3}{4} \times 1$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} \times u_n + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} \times 1 + \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} \times u_n + \frac{1}{4} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{4} \leq u_{n+1} \leq 1$$

ومنه : $0 \leq u_{n+1} \leq 1$

إذن العلاقة صحيحة ل $n+1$.

خلاصة : $\forall n \geq 0 : 0 \leq u_n \leq 1$

ب - بين أن (u_n) تزايدية.

لدينا :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 1}{4} - u_n$$

$$= \frac{-u_n + 1}{4} \geq 0 \quad ; \quad (0 \leq u_n \leq 1 \Rightarrow 1 - u_n \geq 0)$$

ومنه : $u_{n+1} \geq u_n$ أي $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

خلاصة : u_n تزايدية

ج - استنتج أن : (u_n) لها نهاية منتهية .

لدينا :

- u_n حسب السؤال الأول إذن u_n مكبورة ب 1 .



- u_n تزايدية.
- u_n متقارب (حسب خاصية).
- خلاصة :** u_n متقارب إذن لها نهاية منتهية.
- ٤-** بين أن : $\ell \leq 1$
- بما أن جميع الحدود محصورة بين 0 و 1 إذن u_n تتحقق $0 \leq u_n \leq 1$
- ٥-** حدد قيمة ℓ .
- لدينا :
- الدالة f متصلة على $[0;1]$.
- . $f([0;1]) \subset [0;1]$
- . $u_n = 0 \in [0;1]$
- u_n متقارب.
- إذن : ℓ نهاية u_n هي حل للمعادلة $x = f(x)$
- حل المعادلة :
- لدينا :

$$\begin{aligned} f(x) = x &\Leftrightarrow \frac{3x+1}{4} = x \\ &\Leftrightarrow 3x+1 = 4x \\ &\Leftrightarrow -x+1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

ومنه : $\ell = 1$

خلاصة : قيمة ℓ نهاية المتتالية u_n هي 1.