



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الهورة العادية 2009
عناصر الإجابة

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي
وتكوين الأطر
والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات



C:NR35

5	المعامل:
3	مدة الإنجاز:

المادة:	علوم الحياة والأرض
الشعب(ة) أو المسلك:	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقط
	التمرين الأول: 4 نقط يجب أن تتضمن الأجوبة العناصر الآتية: الأعلاف: مجموعة من المواد التي تدعم تغذية الحيوان و تكون ذات مردودية عالية و تستعمل بكيفية تتناسب مع الكتلة الغذائية للحيوان و حاجاته (الصيانة ، النمو) و إنتاجيته (لحم ، حليب ، بيض...) مثال: - أعلاف خضراء (الفصاة، الذرة الكلنية...) - أعلاف مركزة (حبوب، قطاني، نخالة، ميلاص...) الهرمونات: حقن بهرمونات تنشط النمو عبر امتصاص الأوزوت و الرفع من إنتاجية البروتينات و زيادة كتلة الحيوان مثال: الهرمونات الستيرويدية (جسفرون، أوستراديول...) المكملات: إضافة أنزيمات و فيتامينات و أملاح معدنية إلى أغذية الحيوانات أمثلة: - معدنية: إضافة أملاح معدنية من قبيل: Ca و P و K - بروتينية: دقيق اللحم أو السمك، كسب بذور النباتات الزيتية - أنزيمات نوعية للاستفادة من بعض الفيتامينات * الدور: تستعمل هذه المواد للصيانة أو (و) للرفع من إنتاجية الحيوانات و التقليل من تكلفة الإنتاج من خلال تحسين ظروف حياة الحيوان (مقاومة الأمراض...) أو تثبيت بعض العناصر المعدنية. * السلبيات: ظهور أمراض و اضطرابات صحية عند الحيوان و عند المستهلكين (جنون البقر، تلوث بالديوكسين، تسممات غذائية، حساسية...)	1 1 0.75 0.75 0.5
1	التمرين الثاني: 6 نقط المبدأ: نقل المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين السام ضد أسروعة النارية من البكتيريا <i>Bacillus thuringiensis</i> إلى نبات الذرة قصد إكسابه مقاومة ضد هذه الأسروعة. - التعليق على المراحل: A: عزل المورثة المسؤولة عن مقاومة أسروعة النارية؛ B: عزل الناقل (Plasmide) من بكتيريا (<i>Agrobacterium</i>) ؛ C: دمج المورثة داخل البلاسميد و تكاثر البكتيريا؛ D: إدخال البلاسميد داخل خلايا الذرة؛ E: تكاثر خلوي للخلايا التي أدمجت المورثة و إنباتها	0.5 1
2	أ - تبين الوثيقة 2 أن نسبة المساحات المزروعة بالذرة المعدلة وراثيا تفوق بكثير نسبة المساحة المزروعة بالذرة الغير معدلة وراثيا. نستنتج أن التعديل الوراثي للذرة هو الذي سمح بانتشارها الواسع نظرا لمردودها المرتفع (مقاومة الحشرات) و الذي يساهم في تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان كما أن هذه العملية تساهم في التخفيف من استعمال المبيدات الحشرية و النقص من تلويث الأوساط الطبيعية. ب - السلبيات: * انتقال الخاصية المرغوب فيها عند الذرة (مقاومة حشرات) إلى نباتات أخرى لا يرغب الإنسان في اكتسابها هذه الصفة (انتشار واسع للأعشاب الضارة). * زيادة الحساسية الغذائية تجاه بعض المواد المعدلة وراثيا	1 0.5

0.75	3	c - بيضة - d - أمشاج - p - نبات مشيجي.....
0.25	4	- موقع الإخصاب: بين b و c
0.25		. موقع الانقسام الاختزالي: على مستوى نبات مشيجي P
0.75	5	- الدورة الصبغية: دورة أحاديّة ثنائية الصيغة الصبغية.....
1		. إنجاز الدورة
0.5	1	التمرين الثالث : 5 نقط
	2	- سيادة صفتي البذور الممتلئة و حبيبات ألورون ملونة، جميع أفراد الجيل F ₁ هجاء.....
0.5		- المورثتان مرتبطتان لأن التزاوج الاختباري أعطى نسبة قليلة من التراكيب الجديدة.....
0.25	3	التزاوج الأول: P : [R l] x [r L]
		<u>Rl</u> Rl RC = <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> rL RC = <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 100% <u>Rl</u> 100% <u>rL</u> 1

0.5	4	- النمط الوراثي لأفراد الجيل F_1' [R A] $\frac{R a}{r A}$
0.25	5	- الخريطة العاملية للمورثات الثلاث: • المسافة بين المورثتين " شكل البذور " و " لون حبيبات الألورون " : نسبة التراكيب الجديدة = $100 \times \frac{115 + 120}{6732} = 3.5 \%$ اذن المسافة بين المورثتين " شكل البذور " و " لون حبيبات الألورون " هي: 3.5 cMg
0.25		• المسافة بين المورثتين " شكل البذور " و " طبيعة النشا " : نسبة التراكيب الجديدة = $100 \times \frac{603 + 630}{6732} = 18.3 \%$ ادن المسافة بين المورثتين " شكل البذور " و " طبيعة النشا " هي: 18.3 cMg
0.5		• المسافة بين المورثتين " طبيعة النشا " و " حبيبات الألورون " هي: $21.8 \text{ cMg} = 3.5 \text{ cMg} + 18.3 \text{ cMg}$ اذن الخريطة العاملية هي: $\frac{A \quad 18.3 \text{ cMg} \quad R \quad 3.5 \text{ cMg} \quad L}{\quad}$
0.75	1	<u>التمرين الرابع: 5 نقط</u> - بين 76 و 83 كان عمق السديمة قريبا من السطح و كان عدد الآبار ثابتا في قيمة منخفضة (حوالي 1000بئر) بالمنطقة . يرجع ذلك لوفرة المياه بالمنطقة التي كانت تفوق حاجياتها (أكثر من مليار متر مكعب)
0.75		- بين 83 و 86 ارتفع عمق السديمة و ارتفع عدد الآبار بالمنطقة و ذلك ناتج عن تراجع المياه السطحية بسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة (المياه المتوفرة لا تلبي الحاجيات)
0.75		- بين 86 و 94 تحسن نسبي للموارد السطحية بالمنطقة نتيجة ارتفاع التساقطات الشيء الذي يفسر انخفاض عمق السديمة.
0.75		- ابتداء من 94 نفسر التزايد الملحوظ في عمق السديمة بفترة طويلة من الجفاف الذي عرفته المنطقة وباستمرار استغلال مياه الآبار
1	2	- تزايد حجم أملاح النترات التي تصل إلى السديمة و الناتج عن الإفراط في التسميد و الذي يظهر من نسبة الفلاحين الذين يستعملون كميات تفوق المقادير الموصى بها و بالتالي تلوث المياه الجوفية
1		- قبول حل لتلوث السديمة المائية من قبيل: • توعية الفلاحين لاستعمال كميات مناسبة من الأسمدة • اللجوء لتطبيق التناوب الزراعي (زراعات ذات حاجيات مختلفة من الأسمدة)