

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2016 - عناصر الإجابة -

٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٤ | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٢ | ٢٠٠١ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٤ | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٢ | ٢٠٠١ | ٢٠٠٠



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقدير
والامتحانات والتوجيه


NR 35

3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والارض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلك

رقم السؤال	السؤال	النقطة
I	الاقتراحات الصحيحة: 4×0.5 ن	2 ن
II	تعريف: 2×0.5 ن معامل الاستهلاك: حاصل كمية المادة الغذائية المستعملة على كمية المادة الحيوانية المستهلكة من طرف الإنسان. المقاومة البيولوجية: طريقة يتم من خلالها توظيف كائنات حية لمكافحة كائنات حية أخرى مضرة.	1 ن
III	الاقتراحات الصحيحة والخاطئة: 4×0.25 ن أ - خطأ ب - خطأ ج - خطأ د - صحيح	1 ن
IV	الاسم المناسب لكل مرحلة: 4×0.25 ن <input type="checkbox"/> التلقيح الاصطناعي لبقرة منتجة <input type="checkbox"/> عزل الأجنة <input type="checkbox"/> نقل أو زرع الأجنة في رحم بقرة مستقبلة <input type="checkbox"/> ولادة عدة عجول وعجلات بصفات مرغوب فيها	1 ن


رقم السؤال	السؤال	النقطة

0.25 ن	<p>أ- مراحل إنتاج الإثيلين في خلية الطماطم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مرحلة النسخ: نسخ المورثة a إلى ARNm ونسخ المورثة b إلى ARNm - مرحلة الترجمة: ترجمة ARNm المورثة a إلى إنزيم ACC Synthase وترجمة ARNm المورثة b إلى إنزيم ACC Oxydase - تحفيز تحول SAM إلى ACC بواسطة إنزيم ACC Synthase وتحفيز تحول ACC إلى إثيلين بواسطة إنزيم ACC Oxydase 	1
0.25 ن	<p>ب- اقتراح طريقتين لكبح إنتاج الإثيلين من قبيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - كبح النسخ. - كبح الترجمة. 	2
0.25 ن	<p>أ- كيفية الحصول على ADNc المورثة a انطلاقا من ARNm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تركيب خيط ADNc منفرد انطلاقا من ARNm باستعمال الإنزيم الناسخ العكسي ونيكلويتيدات حرة. - تركيب خيط ADNc المكمل لـ ADN أحدى اللولب للحصول على ADNc مضاعف باستعمال إنزيم ADN بولميراز ونيكلويتيدات حرة. 	2
0.25 ن	<p>ب- تفسير كيفية الحصول على البلاسميد الهجين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فتح البلاسميد في موقع محددة باستعمال أنزيمات الفصل النوعية. - دمج المورثة بالبلاسميد المفتوح باستعمال إنزيم الرابط. 	3
0.25 ن	<p>تفسير كيفية إنتاج ثمار بطينة النضج من نبتة الطماطم المعدلة وراثيا:</p> <p>الوثيقة 3: في ثمار الطماطم العادية، ترتفع نسبة الإثيلين المنتجة بينما تبقى نسبته ثابتة وجد منخفضة في ثمار الطماطم المعدلة وراثيا.</p> <p>المرحلة ⑤ من الوثيقة 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إنتاج ARN معكوس (مضاد المعنى) وارتباطه بـ ARNm العادي. - استحالة ترجمة ARNm العادي وعدم إنتاج إنزيم ACC Synthase. - عدم تحول SAM إلى ACC وبالتالي منع إنتاج الإثيلين والحصول على نبتة طماطم ذات ثمار متأخرة النضج. 	3
0.25 ن	<p>تعرف أطوار الانقسام غير المباشر: (يعتبر تعرف الطور صحيحا إذا كان مصحوبا بالتعليل).</p> <p>A الطور الانفصالي: انتشار الجزيء المركزي وانفصال صبغيا كل صبغي وهجرة كل مجموعة من الصبغيات نحو أحد قطبي الخلية نتيجة تقصير الألياف الصبغية.</p> <p>B الطور التمهيدي: تكافف الصبغين على شكل خيوطات تتلوب لتشكل الصبغيات. تلاشي النوية.</p> <p>C الطور النهائي: تكون النواة والنوية. تكون جدار فاصل بين سيتوبلازم الخلتين البنتين.</p> <p>D الطور الاستوائي: الصبغيات أكثر وضوحا: كل صبغي مكون من صبغتين مرتبطتين على مستوى الجزيء المركزي وتكون الصفيحة الاستوائية.</p>	4
0.5 ن	<p>كيفية الحفاظ على ثبات الخبر الوراثي من خلية لأخرى خلال دورة خلوية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خلال الفترة S من مرحلة السكون تحدث مضاعفة ADN بكيفية نصف محافظة. تتكون صبغيات مضاعفة بحيث كل صبغي يتكون من صبغتين متماثلتين فيما بينهما ومماثلتين لصبغي الخلية الأم. - خلال الطور الانفصالي من الانقسام غير المباشر يننشر صبغيا كل صبغي على مستوى الجزيء المركزي فتتكون مجموعتان متماثلتان من الصبغيات الابن ومماثلتان لصبغيات الخلية الأم. 	5
النقطة	التمرين الثاني: (5 نقط)	رقم السؤال

		تحليل نتائج التزاوج الأول:	1
0.25 ن		- هجونة ثنائية: انتقال صفتين وراثيتين: صفة حساسية أو مقاومة الفطر وصفة صعوبة أو سهولة القطف.	
0.25 ن		- الجيل F_1 متجانس: تحقق القانون الأول لماندل إذن الآباء من سلالة نقية.	
0.25 ن		- يتكون الجيل F_1 من أفراد مقاومة للفطلي وصعبة القطف:	
0.25 ن		الحليل R المسؤول عن مقاومة الطفلي سائد على الحليل r المسؤول عن الحساسية تجاه الطفلي.	
0.25 ن		الحليل N المسؤول عن ثمار صعبة القطف سائد على الحليل n المسؤول عن ثمار سهلة القطف.	
		تحليل نتائج التزاوج الثاني:	
0.25 ن		- تزاوج اختياري: تزاوج أفراد F_1 مع أفراد ثنائية التنجي.	
		- تم الحصول على أربع مظاهر خارجية موزعة كالتالي:	
		39% [R,N]	
		39% [r,n]	
		11% [R,n]	
0.25 ن		11% [r,N]	
0.25 ن		نسبة المظاهر الأبوية (TP) هي 78% ونسبة المظاهر جديدة التركيب (TR) هي 22%.	
0.25 ن		نسبة المظاهر الأبوية أكبر من نسبة المظاهر جديدة التركيب: المورثتان مرتبطتان.	
0.5 ن		تبين الوثيقة 2 صبغيات متماثلة تشكل رباعيات تظهر تقاطعات على مستوىها يحدث تبادل قطع صبغية: إنه العبور.	
		رسم تخطيطي يفسر كيفية الحصول على أمشاج بائمات وراثية جديدة التركيب عند F_1 :	2
1 ن			

		التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني:	3
0.5 ن		$F_1: [R,N] \times [r,n]$	
		$R,N // r,n$	
		$R,N / R,n / r,N / r,n /$	
		39 % 11 % 11 % 39 %	
		$r,n / r,n // r,n$	
		100 %	
		ال�性 المظاهر الجديدة (TR):	
		$R,N / 39 \%$	
		$R,n / 11 \%$	
		$r,N / 11 \%$	
		$r,n / 39 \%$	
		ال�性 المظاهر الأبوية (TP):	
		$R,N // r,n$	

ن 0.5	100 % (x1)	39 % [R, N]	11 % [R, n]	11 % [r, N]	11 % [r, n]	تطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية
		TP = 39 %		TR = 22 %	TP = 39 %	

ن 0.25	حساب المسافة بين المورثتين:					4
ن 0.25	$11 + 11 = 22\% \text{ CMg}$					
ن 0.25	 <p>تمثيل الخريطة العاملية:</p>					

رقم السؤال	التمرين الثالث: (5 نقط)	النقطة
1	أنواع السدائم الممثلة في المقطع مع التعليق:	
	السديمة 1 حبيسة (أو معلقة) داخل حملماء من الكلس وتوجد تحت صخور غير نفوذة.....	ن 0.5
	السديمة 2 حبيسة (أو معلقة) داخل حملماء من الطبشور توجد بين صخرتين غير نفوذتين.....	ن 0.5
	السديمة 3 حرة (أو سطحية) داخل حملماء من الرمل وتتغذى مباشرة من السطح.....	ن 0.5
2	التغير الملاحظ في وضعية السدائم عند المرور من الموقع (أ) إلى الموقع (ب): في الموقع (ب) السديمة 3 غير موجودة نظر لعدم وجود الحملماء الرملية والسديمة 2 تحولت من سديمة حبيسة إلى سديمة حرة، بينما السديمة 1 بقيت حبيسة.....	ن 0.5
3	الخصائص الفيزيائية التي تجعل صخور منطقة Mélantois تشكل حملماءاً لكل سديمة: صخور الكلس لها نفاذية تحصر بين 10^{-3} m/s و 10^{-6} m/s وهو ما يجعلها تشكل حملماءاً للسديمة 1..... صخور الطبشور لها نفاذية تحصر بين 10^{-3} m/s و 10^{-5} m/s وهو ما يجعلها تشكل حملماءاً للسديمة 2..... صخور الرمل لها نفاذية تحصر بين 10^{-2} m/s و 10^{-4} m/s و مسامية فعالة مرتفعة تحصر بين 100 l/m^3 و 250 l/m^3 مما يجعلها تشكل حملماءاً للسديمة 3.....	ن 0.25
4	تفسير وجود المستوى التغمازي β للبئر B فوق سقف السديمة: وجود الماء في السديمة 2 بين طبقتين غير نفوذتين تحت ضغط مرتفع.....	ن 0.5

رقم السؤال	النقطة	تممة عناصر الإجابة التمرين الثالث
5	ن 0.25	أ- تطور صبيب الأخذ الإجمالي: ارتفاع صبيب الأخذ الإجمالي من 0 إلى $100000 \text{ m}^3/\text{jour}$ بين سنة 1870 وسنة 1890 ..

ن 0.25	انخفاض صبيب الأخذ الإجمالي من $70000 \text{ m}^3/\text{jour}$ إلى حوالي $100000 \text{ m}^3/\text{jour}$ بين 1890 إلى 1960.....	
ن 0.25	ارتفاع صبيب الأخذ الإجمالي من جديد من $70000 \text{ m}^3/\text{jour}$ إلى $150000 \text{ m}^3/\text{jour}$ سنة 1960 وسنة 1980.....	
	ب- تفسير انخفاض صبيب الآبار المتفجرة: - ارتفاع عدد الآبار المنجزة من 0 إلى 125 بئرا - ارتفاع صبيب الأخذ الإجمالي	
ن 0.25	قبول كل اقتراح صحيح من قبيل: - الإستغلال المعقّل لمياه السديمة - تقبّل حفر الآبار في السديمة.	6
ن 0.25		