

الصفحة	1
6	
***	1

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2020

- عناصر الإجابة -

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NR 35

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكنولوجيا المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي



والتكنولوجيا المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للنقوش والامتحانات

المادة

الشعبة أو المسلك

علوم الحياة والأرض

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

3 مدة الإنجاز

5 المعامل

استرداد المعرف (5 نقط)

السؤال	النقطة	عناصر الإجابة
I	0.5ن	تعاريف: أ- مياه جوفية: مجموع الكتل المائية المخزنة في الصخور النفوذة تحت التربة ب- بئر أرتواري: بئر يوجد به ماء تحت الضغط ويخرج منه بشكل متغير بعد التنقيب ج- مياه سطحية: مجموع الكتل المائية الجارية أو الراكدة في اتصال مباشر مع الغلاف الجوي
II	0.5ن 0.5ن	1- د 2- ب
III	1.5ن	صحيح أو خطأ: $6 \times 0,25$ ن أ- صحيح ب- خطأ ج- خطأ د- خطأ ه- صحيح و- خطأ
IV	1ن	ذكر تقنيتين حديثتين لاستكشاف المياه الجوفية من بين التقنيات: $2 \times 0,5$ ن - تقنيات زلزالية - تقنيات كهربائية - تقنيات جيولوجية (أو جيوفيزيكية)

الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبصري (15 نقطة)

النقطة	عناصر الإجابة: التمرين الأول (8 نقط)	السؤال																
0.5 ن	وصف النتائج في كل من التجارب 1 و 2: - في غياب Aflatoxine B1 ، لا تتمو البكتيريات - His في وسط دون هيستيدين - بوجود Aflatoxine B1 ، تظهر البكتيريات + His في الزمن T1 ثم تتكاثر لتشكل مستعمرات في وسط دون هيستيدين (الزمن T2) استنتاج: نستنتج أن Aflatoxine B1 عامل يحدث طفرات وهو مسؤول عن تحول البكتيريات - His إلى + His	1																
0.5 ن	تفسير: ارتفاع جرعة Aflatoxine B1 يؤدي إلى زيادة حدوث الطفرات، مما يرفع من عدد المستعمرات البكتيرية + His	2																
0.5 ن	- مقارنة: a- نسبة نجاة السلالة A ثابتة تقربيا في 100% ، بينما تختفي نسبة النجاة بشكل حاد عند السلالة B لعدم هذه النسبة بعد 250 يوما - تفسير : b- عند الفئران من سلالة B ، وجود حليل طافر للمورثة p53 لا يسمح بتركيب بروتين عادي p53 الذي يحمي الفئران من سرطان HCC، مما يؤدي إلى موت الفئران	3																
0.75 ن	المتالية البينية المطابقة للحليب العادي <table border="1"> <tr> <td>247 248 249 250 251 252 253</td> <td>رقم الوحدة الرمزية</td> </tr> <tr> <td>TTG GCC TCC GGG TAG GAG TGG</td> <td>قطعة ADN المستنسخة</td> </tr> <tr> <td>AAC CGG AGG CCC AUC CUC ACC</td> <td>ARNm</td> </tr> <tr> <td>Asn - Arg -Arg - Pro -Ile - Leu -Thr</td> <td>متالية الأحماض الأمينية</td> </tr> </table> المتالية البينية المطابقة للحليب الطافر <table border="1"> <tr> <td>247 248 249 250 251 252 253</td> <td>رقم الوحدة الرمزية</td> </tr> <tr> <td>TTG GCC TCA GGG TAG GAG TGG</td> <td>قطعة ADN المستنسخة</td> </tr> <tr> <td>AAC CGG AGU CCC AUC CUC ACC</td> <td>ARNm</td> </tr> <tr> <td>Asn - Arg -Ser - Pro -Ile - Leu -Thr</td> <td>متالية الأحماض الأمينية</td> </tr> </table>	247 248 249 250 251 252 253	رقم الوحدة الرمزية	TTG GCC TCC GGG TAG GAG TGG	قطعة ADN المستنسخة	AAC CGG AGG CCC AUC CUC ACC	ARNm	Asn - Arg -Arg - Pro -Ile - Leu -Thr	متالية الأحماض الأمينية	247 248 249 250 251 252 253	رقم الوحدة الرمزية	TTG GCC TCA GGG TAG GAG TGG	قطعة ADN المستنسخة	AAC CGG AGU CCC AUC CUC ACC	ARNm	Asn - Arg -Ser - Pro -Ile - Leu -Thr	متالية الأحماض الأمينية	4
247 248 249 250 251 252 253	رقم الوحدة الرمزية																	
TTG GCC TCC GGG TAG GAG TGG	قطعة ADN المستنسخة																	
AAC CGG AGG CCC AUC CUC ACC	ARNm																	
Asn - Arg -Arg - Pro -Ile - Leu -Thr	متالية الأحماض الأمينية																	
247 248 249 250 251 252 253	رقم الوحدة الرمزية																	
TTG GCC TCA GGG TAG GAG TGG	قطعة ADN المستنسخة																	
AAC CGG AGU CCC AUC CUC ACC	ARNm																	
Asn - Arg -Ser - Pro -Ile - Leu -Thr	متالية الأحماض الأمينية																	
0,75 ن 0,25 ن	ب- العلاقة مورثة - بروتين في حالة سرطان HCC - على مستوى ADN المورثة p53 حدث استبدال النيكلويوتيد C ، وهو النيكلويوتيد الثالث ضمن الثلاثية رقم 249 ، بالنيكلويوتيد A مما ينتج عنه تركيب بروتين غير عادي حيث تم استبدال حمض أميني واحد وهو الأرجينين Arginine بحمض السيرين Sérine - التغيير الذي طرأ على ADN أدى إلى تغيير البروتينين، ومنه نستنتج العلاقة مورثة - بروتين																	

الصفحة	3	NR 35	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية	
--------	---	-------	---	--

النقطة	السؤال	التمرين الأول (تنمية)
0.5	5	العلاقة بين Aflatoxine B1 وسرطان HCC عند الانسان: - بالنسبة للوحدات الرمزية 140 و 300 من المورثة p53 ، عدد الطفرات منخفض جدا أو منعدم في البلدان الأقل والأكثر تعرضاً لـ Aflatoxine B1 على حد سواء - بالنسبة للوحدة الرمزية 249 من المورثة p53 ، عدد الطفرات مرتفع جدا في البلدان الأكثر تعرضاً لـ Aflatoxine B1 مقارنة مع البلدان الأقل ← التعرض الشديد لـ Aflatoxine B1 يؤدي إلى ارتفاع تردد الطفرات على مستوى الوحدة الرمزية 249 من المورثة p53. البروتين المركب غير عادي ولا يقي من سرطان HCC ...
0.25	6	آلية تدخل البروتين p53 العادي في الوقاية من السرطان HCC عندما يحدث خلل على مستوى ADN، يتدخل البروتين p53 على مستوى الدورة الخلوية محدثاً توقفاً على مستوى الطور G1 - إذا تم إصلاح ADN، يتم رفع التوقف في الطور G1 الذي أحدثه البروتين p53 وتنافس الدورة الخلوية : استئناف الانقسام الخلوي العادي - إذا لم يتم إصلاح ADN، يصبح التوقف في الطور G1 المحدث من طرف البروتين p53 نهائياً مما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية - إذا كان البروتين p53 غير عادي، لا يحدث توقف الدورة الخلوية في G1، ولا يحدث إصلاح خلل ADN. تتوالى الانقسامات الخلوية بشكل عشوائي محدثة سرطان HCC .

الصفحة 6	4 NR 35	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العاشرة 2020 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية
-------------	------------	---

النقطة	السؤال	التمرين الثاني (7 نقط)																								
0,25	1	علاقة السيادة والتنحى بين الحليات في التزاوج الأول: - كل أفراد الجيل F1 ذوو عرف وردي الشكل، فهو جيل متجانس والمظهر الخارجي يشبه المظهر الخارجي لأحد الأبوين. تحقق القانون الأول لماندل. - إذن الحليل المسؤول عن العرف على وردي الشكل سائد (R) بالنسبة للليل المسؤول عن العرف على شكل بسيط (s) المتنحى. استنتاج: - الآباء من سلالة ندية والنمط الوراثي هو: R//R و s//s																								
0,25		التمزوج الثاني: - يعطي هذا التزاوج جيلا غير متجانس يتكون من أفراد ذوو أرجل قصيرة وأفراد ذوو أرجل عادية. هذه النتيجة لا تخضع للقانون الأول لماندل. - في نتائج هذا التزاوج يظهر أفراد بمظاهر خارجي متنحى وهو أرجل عادية. الحليل المسؤول عن هذا المظاهر الخارجي أرجل عادية متنحى (n) بالنسبة للليل المسؤول عن المظاهر الخارجية أرجل قصيرة (C). استنتاج: الأبوان مختلفا الاقتران ونمطهما الوراثي هو: C//n																								
0,75	2	شبكة التزاوج الثاني: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">الأمشاج الأنثوية</td> <td>C/</td> <td>n/</td> </tr> <tr> <td colspan="2">الأمشاج الذكرية</td> <td>1/2</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>C/</td> <td></td> <td>C//C</td> <td>n//C</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>25% [C]</td> <td>25% [C]</td> <td>25% [C]</td> </tr> <tr> <td>n/</td> <td></td> <td>n//C</td> <td>n//n</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>25% [C]</td> <td>25% [n]</td> <td>25% [n]</td> </tr> </table>	الأمشاج الأنثوية		C/	n/	الأمشاج الذكرية		1/2	1/2	C/		C//C	n//C	1/2	25% [C]	25% [C]	25% [C]	n/		n//C	n//n	1/2	25% [C]	25% [n]	25% [n]
الأمشاج الأنثوية		C/	n/																							
الأمشاج الذكرية		1/2	1/2																							
C/		C//C	n//C																							
1/2	25% [C]	25% [C]	25% [C]																							
n/		n//C	n//n																							
1/2	25% [C]	25% [n]	25% [n]																							
0,25		نظريا يتم الحصول على: - 1/4 مظاهر خارجي متنحى [n] و 3/4 مظاهر خارجي سائد [C]. - النتيجة التجريبية في التزاوج الثاني تتضمن 2/3 مظاهر خارجي سائد [C] و 1/3 مظاهر خارجي متنحى [n]. - يمكن تفسير هذه النتيجة باختفاء الأفراد ذوو النمط الوراثي السائد المميت C//C																								
0,25																										
0,25																										

الصفحة	5	NR 35	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العاشرة 2020 - عناصر الإجابة
6			- مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

النقطة	السؤال	التمرين الثاني (تنمية)												
	3	تفسير نتائج التزاوج الثالث: - الأفراد ذوو عرف بسيط وأرجل عادية لهم مظهر خارجي متاحي بالنسبة للصفتين، نمطهم الوراثي متشابه الاقتران بالنسبة للمورثتين. يتعلق الأمر بتزاوج اختباري. - عدم ظهور مظاهر خارجية جديدة التركيب يدل على عدم تحقق القانون الثالث لماندل (قانون استقلالية أزواج الحليلات). المورثتان مرتبطتان. - بالنسبة للصفة طول الأرجل: 50% من أفراد الجيل 1' F' ذوو أرجل قصيرة و 50% ذوو أرجل عادية. إذن، الآباء ذوو المظاهر الخارجي السائد مختلفو الاقتران.												
0,25		مظهر خارجي [R, C] x [s, n]												
0,25		نمط وراثي $\frac{\underline{R} \underline{C}}{R \ n}$ $\frac{\underline{s} \ \underline{n}}{s \ n}$												
0,25		أمشاج $1/2 \ \underline{R} \underline{C} ; 1/2 \ \underline{R} \ \underline{n}$ $100\% \ \underline{s} \ \underline{n}$												
0,5		شبكة التزاوج: <table border="1"> <tr> <td>الأمشاج الذكرية</td> <td>$\underline{R} \ \underline{C}$</td> <td>$\underline{R} \ \underline{n}$</td> </tr> <tr> <td>الأمشاج الأنثوية</td> <td>1/2</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>$\underline{s} \ \underline{n}$</td> <td>$\frac{\underline{R} \ \underline{C}}{s \ n}$</td> <td>$\frac{\underline{R} \ \underline{n}}{s \ n}$</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>50% [R, C]</td> <td>50% [R, n]</td> </tr> </table>	الأمشاج الذكرية	$\underline{R} \ \underline{C}$	$\underline{R} \ \underline{n}$	الأمشاج الأنثوية	1/2	1/2	$\underline{s} \ \underline{n}$	$\frac{\underline{R} \ \underline{C}}{s \ n}$	$\frac{\underline{R} \ \underline{n}}{s \ n}$	100%	50% [R, C]	50% [R, n]
الأمشاج الذكرية	$\underline{R} \ \underline{C}$	$\underline{R} \ \underline{n}$												
الأمشاج الأنثوية	1/2	1/2												
$\underline{s} \ \underline{n}$	$\frac{\underline{R} \ \underline{C}}{s \ n}$	$\frac{\underline{R} \ \underline{n}}{s \ n}$												
100%	50% [R, C]	50% [R, n]												
0,75		نظريا يتم الحصول في F'1 على: - 50% من الأفراد ذوو عرف وردي الشكل وأرجل قصيرة. - 50% من الأفراد ذوو عرف وردي الشكل وأرجل عادية. هذه النتيجة النظرية توافق النتيجة التجريبية.												
0,25														
0,25														

النقطة°	السؤال	التمرين 2 (تممة)																		
	4	تفسير نتائج التزاوج الرابع: - في F'1 الأفراد ذوو عرف وردي الشكل وأرجل قصيرة مختلفو الاقتران بالنسبة للصفتين معا.																		
0,5		<p>المظهر الخارجي [R, C] x [R, C]</p> <p>النمط الوراثي $\frac{R}{s} \frac{C}{n}$ ↓ $\frac{R}{s} \frac{C}{n}$</p> <p>الأمشاج 1/2 $\frac{R}{s} \frac{C}{n}$; 1/2 $\frac{s}{n}$ 1/2 $\frac{R}{s} \frac{C}{n}$ 1/2 $\frac{s}{n}$</p> <p>شبكة التزاوج:</p> <table border="1"> <tr> <td>الأمشاج الذكرية</td> <td>$\frac{R}{C}$</td> <td>$\frac{s}{n}$</td> </tr> <tr> <td>الأمشاج الأنثوية</td> <td>1/2</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>$\frac{R}{C}$</td> <td>$\frac{R}{C}$ $\frac{R}{C}$</td> <td>$\frac{R}{s} \frac{C}{n}$</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>$\frac{R}{C}$</td> <td>1/3 $\frac{R}{C}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{s}{n}$</td> <td>$\frac{R}{C}$ $\frac{s}{n}$</td> <td>$\frac{s}{n}$ $\frac{s}{n}$</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>1/3 $\frac{R}{C}$</td> <td>1/3 $\frac{s}{n}$</td> </tr> </table>	الأمشاج الذكرية	$\frac{R}{C}$	$\frac{s}{n}$	الأمشاج الأنثوية	1/2	1/2	$\frac{R}{C}$	$\frac{R}{C}$ $\frac{R}{C}$	$\frac{R}{s} \frac{C}{n}$	1/2	$\frac{R}{C}$	1/3 $\frac{R}{C}$	$\frac{s}{n}$	$\frac{R}{C}$ $\frac{s}{n}$	$\frac{s}{n}$ $\frac{s}{n}$	1/2	1/3 $\frac{R}{C}$	1/3 $\frac{s}{n}$
الأمشاج الذكرية	$\frac{R}{C}$	$\frac{s}{n}$																		
الأمشاج الأنثوية	1/2	1/2																		
$\frac{R}{C}$	$\frac{R}{C}$ $\frac{R}{C}$	$\frac{R}{s} \frac{C}{n}$																		
1/2	$\frac{R}{C}$	1/3 $\frac{R}{C}$																		
$\frac{s}{n}$	$\frac{R}{C}$ $\frac{s}{n}$	$\frac{s}{n}$ $\frac{s}{n}$																		
1/2	1/3 $\frac{R}{C}$	1/3 $\frac{s}{n}$																		
0,25		<p>نظريا يتم الحصول في F'2 على:</p> <p>- 3/4 من الأفراد ذوو عرف وردي الشكل وأرجل قصيرة</p> <p>- 1/4 من الأفراد ذوو عرف بسيط وأرجل عادية.</p> <p>النتائج التجريبية للتزاوج الرابع تتضمن:</p> <p>- 2/4 من الأفراد ذوو عرف وردي الشكل وأرجل قصيرة</p> <p>- 1/4 من الأفراد ذوو عرف بسيط وأرجل عادية</p> <p>- 1/4 بيض لا يفقس.</p> <p>يمكن تفسير البيض الذي لا يفقس بوجود نمط وراثي متشابه الاقتران بالنسبة للصفتين $\frac{R}{C}$ $\frac{R}{C}$ $\frac{C}{C}$ يتضمن النمط الوراثي المميت.</p>																		
0,25																				