

الصفحة 1 6 *** _____	<p style="text-align: center;">الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا</p> <p style="text-align: center;">الدورة الاستدراكية 2020</p> <p style="text-align: center;">- الموضوع -</p> <p style="text-align: center;">SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</p>	 <p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتفقييم والامتحانات</p>
3 مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	RS 35
5 المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية	المادة الشعبة أو المسلك

المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

I- عرف(ي) العبارتين الآتىين: (1ن)

ب. تخليط صبغي.

أ. مورثة مميّة.

II- أجب (أجيبي) باختصار عن السؤالين الآتىين: (1ن)

ب. ذكر(ي) دورين أساسيين لـإخصاب.

أ. اعط(ي) القانون الثاني لـماندل.

III- أنقل(ي) الأزواج (1،....) و(2،....)، على ورقة تحريرك ثم أتمم (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراب الوحد الصحيح. (1ن)

1. أنزيمات البلمرة:

أ. يتدخل كل من ARN بوليميراز و ADN بوليميراز في عملية نسخ ARN

ب. يتدخل كل من ARN بوليميراز و ADN بوليميراز في عملية نسخ ADN

ج. يتدخل ARN بوليميراز في عملية نسخ ARN و يتدخل ADN بوليميراز في عملية نسخ ADN

د. يتدخل ARN بوليميراز في عملية نسخ ADN و يتدخل ADN بوليميراز في عملية نسخ ARN

2. الصِّبَغِيَّات، الصِّبَغِيَّات والأنقُسَامُ غير المباشر.

أ. تتضاعف الصِّبَغِيَّات خلال الطور التمهيدي وتفترق الصِّبَغِيَّات خلال الطور الانفصالي.

ب. تتضاعف الصِّبَغِيَّات في فترة ما قبل الطور التمهيدي وتفترق الصِّبَغِيَّات خلال الطور الانفصالي.

ج. تتضاعف الصِّبَغِيَّات خلال الطور الانفصالي وتفترق الصِّبَغِيَّات خلال الطور التمهيدي.

د. تتضاعف الصِّبَغِيَّات في فترة ما قبل الطور الانفصالي وتفترق الصِّبَغِيَّات خلال الطور التمهيدي.

IV- أنقل(ي) على ورقة تحريرك الأزواج (1 ،)، (2 ،)، (3 ،)، و(4 ،) ثم أكتب(ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراب في العمود B الذي يناسب تعريف المصطلح في العمود A. (1ن)

العمود A	العمود B
ADN - 1	أ- جزيئة تنتج عن تعبير الخبر الوراثي
ARNm - 2	ب- مركب جزيئي يساهم في ترجمة الخبر الوراثي
3 - بروتين	ج- جزيئة مكونة من خيط بسيط تمكن من نسخ الخبر الوراثي
4 - ريبوزوم	د- جزيئة لولبية مكونة من خيطين تمثل دعامة الخبر الوراثي

IV- أنقل(ي) على ورقة تحريرك الحروف أ- ب - ج - د، ثم أكتب(ي) أمام كل اقتراح "صحيح" إذا كان الاقتراح صحيحًا أو "خطأً" إذا كان الاقتراح خاطئا. (1ن)

أ. خلال الانقسام غير المباشر، تتوصل كل خلية بنت من الخلية الأم بنصف الخبر الوراثي.

ب. تتكون الدورة الخلوية من ثلاثة أطوار فقط: الطور G1، الطور S، والطور G2.

ج. قبل الانقسام غير المباشر وقبل الانقسام الاختزالي، تتم مضاعفة ADN الخلية.

د. يؤدي الانقسام المنصف إلى اختزال عدد الصبغيات إلى النصف.

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبصري (15 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقط)


يعتبر بعوض *Culex pipiens* حشرة ناقلة لأمراض فيروسية. من أجل الحد من انتقال هذه الأمراض، كان استعمال مبيدات الحشرات مثل الكربمات (**les carbamates**) ضد السلالة المتوجهة "S" ناجعاً. مع مرور الزمن، أصبح تأثير هذه المبيدات أقل فعالية. من أجل تحديد مصدر مقاومة الكربمات عند بعوض *Culex pipiens*, تم إنجاز العديد من الدراسات.

- المعطى الأول: تمت معالجة سلالي بعوض *Culex pipiens* "S" و "R" بواسطة تراكيز مختلفة من مبيد الكربمات. تقدم الوثيقة 1 نتائج هذه الدراسة.

جرعات ضعيفة ← جرعات قوية								تركيز الكربمات mg/l → (les carbamates)	نسبة الفتك (%) (الإماتة) بـ	الوثيقة 1
1000	140	120	100	10	1	0,5	0			
100	100	100	100	100	95	50	0	"S"	نسبة الفتك (%) (الإماتة) بـ	الوثيقة 1
95	50	10	0	0	0	0	0	"R"		


1. قارن(ي) نسبة الفتك عند سلالي بعوض *Culex pipiens*. (0,75ن)

- المعطى الثاني: الأستيل كوليستراز AChE (Acetylcholinesterase) إنزيم ذو طبيعة بروتينية أساسى لعمل الجهاز العصبى للبعوض. تمت دراسة نشاط إنزيم AChE عند السلالتين "S" و "R" بوجود وفي غياب مبيد الكربمات. تقدم الوثيقة 2 النتائج المحصلة. (les carbamates)



2. صف(ي) نتائج الوثيقة 2، واستنتج(ي) تأثير مبيد الكربمات على نشاط إنزيم AChE. (0,75ن)

المعطى الثالث: يتم استعمال أنزيمات القطع لقطع جزيئة ADN في موقع خاصة بكل إنزيم. الإنزيم *Alu I* إنزيم قطع يرتبط بالموقع AGCT ويقطع جزيئة ADN في هذا المستوى. يوضح الشكل 1 من الوثيقة 3 كيفية عمل إنزيم القطع بعد عزل المورثة «ace-1», المسئولة عن تركيب الإنزيم البروتيني AChE، ومعالجتها بإنزيم القطع *Alu I*, يتم تعريض المورثة لتقنية الهجرة الكهربائية وذلك بوضعه في حفر صفيحة من هلام الأغاروز (gel d'agarose). ترتبط ADN سرعة الهجرة الكهربائية لـ ADN بـ $\frac{\text{الجزيئ المقدار}}{\text{pb}}$ (عدد أزواج قواعد النيكلويتيدات). يقدم الشكل 2 من الوثيقة 3 شروط ونتائج هجرة ADN المورثة ace-1 فوق صفيحة من هلام الأغاروز.



3. بالاعتماد على معطيات الوثيقة 3، فسر(ي) نتائج هجرة ADN على هلام الأغاروز. (1ن)

المعطى الرابع: تم إنجاز تسلسل (sequencing) المورثة ace-1 عند السلالة الحساسة للكربمات والسلالة مقاومة له. تقدم الوثيقة 4 قطعة ADN غير المنسوخ للحليل "S" ace-1 وقطعة ADN غير المنسوخ للحليل "R" ace-1. كما تقدم الوثيقة 5 مقتطفاً من جدول الرمز الوراثي.

116	117	118	119	120	121	122
TTC	GGC	GGC	GGC	TTC	TAC	TCC

أرقام ثلاثيات النيكلويوتيدات
قطعة ADN غير منسوخ من الحليل "S" ace-1

116	117	118	119	120	121	122
TTC	GGC	GGC	AGC	TTC	TAC	TCC

أرقام ثلاثيات النيكلويوتيدات
قطعة ADN غير منسوخ من الحليل "R" ace-1

الوثيقة 4

								الوحدة الرمزية
								الحمض الأميني
UUU	UGA	UAC	UCC	AAA	GGA	UGC	GAU	
UUC		UAU	AGC		GGC			
Phe	Stop	Tyr	Ser	Lys	Gly	Cys	Asp	


الوثيقة 5

4. من خلال استئثار معطيات الوثائق 4 و 5، اربط(ي) العلاقة بين المورثة والبروتين. (2ن)

5. بالاعتماد على المعطيات السابقة، فسر(ي) مصدر ظهور مقاومة الكربمات عند بعض *Culex pipiens*. (0,5ن)

التمرين 2: (5 نقط)

قصد دراسة بعض مظاهر انتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصبغية عبر التوالد الجنسي، نقترح المعطيات الآتية.
نتوفر على ثلاثة سلالات من نباتات الطماطم:



- سلالة A تتواجد على ساق بدون أشواك وثمار ذات شميرخات.

- سلالة B تتواجد على ساق ذات أشواك وثمار بدون شميرخات.

- سلالة C تتواجد على ساق بدون أشواك وثمار بدون شميرخات.

التزاوج الأول: أعطى تزاوج نباتات من السلالة A مع نباتات من السلالة B جيلا F1 يتكون من نباتات تتواجد على ساق ذات أشواك وثمار ذات شميرخات.

1. باستغلال نتائج التزاوج الأول، حدد (ي) كيفية انتقال الصفات الوراثية المدرستة ثم استنتج (ي) المظاهر الخارجية للأباء والأفراد الجيل F1. (1,75ن)
- استعمل (ي) الرموز E أو e بالنسبة لصفة "وجود أو غياب الأشواك"، والرموز B أو b بالنسبة لصفة "وجود أو غياب الشميرخات".

التزاوج الثاني: بين نباتات من F1 ونباتات من السلالة C. تم الحصول على جيل 2' F2 يتكون من:

1191 نبتة تتواجد على ساق بدون أشواك وثمار ذات شميرخات


308 نبتة تتواجد على ساق بدون أشواك وثمار بدون شميرخات

2. أعط (ي) التفسير الصبغي للتزاوج الثاني مستعينا (مستعينة) بشبكة التزاوج. (2ن)
3. أجز (ي) الخريطة العالمية للموروثتين مع إبراز مراحل إنجازها. (0,5ن)
4. فسر (ي)، مستعينا (ة) برسوم تخطيطية، كيفية تشكيل أمشاج أفراد الجيل F1 مبرزا الظاهرة المسؤولة. (0,75ن)

التمرين الثالث: (5 نقط)


يلعب سهل سايس، الذي ينتمي لحوض سبو، دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة فالس مكناس ويتوفر السهل على موارد مائية كبيرة. رغم ذلك، تم الشروع في إنجاز مشروع نقل المياه من سد مدرز إلى السهل. من أجل تعرف دوافع إنجاز هذا المشروع، نقترح استثمار المعطيات الآتية:

- يسمح استعمال الممتارات الضغطية بتتبع مستوى السديمة المائية. تقدم الوثيقة 1 تطور المستوى التغمازي للسديمة المائية لسهل سايس مقارنة مع وضعيتها سنة 1970.



1. صف (ي) تطور السديمة المائية واقتصر (ي) فرضيتين مفترضتين لهذا التطور. (1ن)

- تم إنجاز العديد من الدراسات الهيدروجيولوجية على مستوى النظام الحملائي (système aquifère) لساليس. تقدم الوثيقة 2 مقطعاً هيدروجيولوجياً لسهل ساليس والهضبة الأطلسية.



2. استخرج(ي) من الوثيقة 2 الخصائص الهيدرو جيولوجية للنظام الحملائي لساليس. (1ن)


- يتم حساب الحصيلة السنوية للمياه المغذية (الواردة) والمياه الخارجة (الصادرة) حسب مصدرها بالنسبة للسدائم المائية لحوض سبو منذ سنة 1939. تقدم الوثيقة 3 المعدلات السنوية للمياه المغذية للسديمة المائية لسهل ساليس والمياه الخارجة منها قبل سنة 2003.

الكمية بـ Mm^3 / an	المياهخارجة من السديمة المائية لسهل ساليس	الكمية بـ Mm^3 / an	المياه المغذية للسديمة المائية لسهل ساليس
160	ضخ المياه للاستعمال الفلاحي	104,5	رشح مياه الأمطار
100	ضخ مياه الشرب	101	تغذية عميقه انطلاقاً من سديمه الهضبة الأطلسية
47	جريان مياه العيون	36	رشح مياه السقي
34,5	جريان مياه الأودية		

الوثيقة 3


- احسب(ي) الحصيلة السنوية للمياه المغذية للسديمة والمياه الخارجة منها والرصيلة الإجمالية لسديمة سهل ساليس؛ ثم استنتج(ي) وضعية هذه السديمة المائية. (0,75ن)

▪ خلال سنة 2014، تم إنجاز دراسة حول تطور عدد منشآت ضخ المياه لأغراض فلاحية، في ثلاث جماعات قروية بالحاجب، والتي تقع في الحدود الجنوبية لسهل سايس. نوعان من المنشآت يستعملان عموما وهي الآبار للاستثمارات الفلاحية التقليدية والثقوب بالنسبة للاستثمارات الفلاحية العصرية. تقدم الوثيقة 4 معطيات خاصة بمنشآت الضخ (الآبار والثقوب) المنجزة ضمن هذه المنطقة ما بين 1970 و2014.



4. بالاعتماد على تحليل معطيات الوثيقة 4، فسر(ي) تطور المستوى التعماري للسديمة المائية لسهل سايس. (25ن)

▪ يقع سد مذز على ارتفاع 740 مترا بينما يتراوح ارتفاع سهل سايس بين 400 و700 مترا. تبلغ الحقيقة المرتبطة لسد مذز 760 Mm^3 وستسمح بنقل 125 Mm^3 سنويا اتجاه سهل سايس. تقدم الوثيقة 5 خريطة تمثل نقل المياه من سد مذز.



5. بين(ي) أهمية سد مذز بالنسبة لأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بسهل سايس مع تعليق إجابتك. (1ن)