

المكون الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

١- عرف(ي) العبارتين الآتيتين : (1ن)

1- مسامية الصخرة،

2- حوض مائی.

II-انقل(ي) الأزواج (-1...)، (-2...)، (-3...) و (-4...)، ثم اكتب(ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الوحيد الصحيح. (2ن)

<p>1- السديمة المائية الكارستية :</p> <p>أ- لها نفس المستوى التغمazi في كل مكان،</p> <p>ب- مصدر لآبار ارتوازية،</p> <p>ج- تتكون داخل صخور طينية مشققة،</p> <p>د- تتكون داخل صخور كلسية مشققة.</p>	<p>2- تجديد مياه السديمة الحرة :</p> <p>أ- يتم عن طريق ترشح المياه السطحية،</p> <p>ب- يتم عن طريق صعود المياه العميقة،</p> <p>ج- ينخفض عندما تزداد التساقطات المطرية،</p> <p>د- يزداد عند ضخ الماء بشكل كبير.</p>
<p>3- يؤدي الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية إلى :</p> <p>أ- تلوث وتخاصب مياه البحار،</p> <p>ب- تلوث وتخاصب مياه البحيرات،</p> <p>ج- زيادة التنوع البيولوجي في الوسط المائي،</p> <p>د- تكاثر الحيوانات المائية.</p>	<p>4- تنقية المياه العادمة:</p> <p>أ- تسمح بإنتاج ماء صالح للشرب،</p> <p>ب- تسمح بخفض حمولة التلوث في الماء،</p> <p>ج- تسمح برفع قيمة DBO5،</p> <p>د- تستعمل لمعالجة مياه البحر.</p>

III- انقل(ي) الرقم المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية ثم أكتب(ي) أمام رقم كل اقتراح صحيح أو خطأ. (1ن)

1- التنافذ العكسي تقنية تستعمل لمراقبة جودة الماء.

2- يعتمد تحديد المؤشر الإحيائي على توزيع بعض اللافقاريات المائية.

3- المياه الجوفية لا تتأثر ابدا بتلوث المياه السطحية.

4- المستوى التغمازي هو أعلى مستوى لتشبع الصخرة المخزنة للماء.

IV- أسئلة ذات أجوبة قصيرة : (1ن)

1- اعط(ى) الفرق بين السديمة المائية والحملماء.


2- اذكر (ي) خاصيتين للسديمة الحبيسة.

الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (5 نقط)

في إطار دراسة طبيعة المادة الوراثية وتعبير الخبر الوراثي نقترح المعطيات الآتية.
■ الجزء الأول:

العاثية فيروس يتطفل على البكتيريات ويتكاثر بداخلها مستعملا المكونات الخلوية.




لإبراز طبيعة دعامة الخبر الوراثي، أنجز HERSHEY التجربة التالية:
تم تحضير مجموعتين من العاثيات. المجموعة الأولى موسومة بالكبريت المشع ^{35}S والمجموعة الثانية موسومة بالفوسفور المشع ^{32}P . الكبريت (S) يدخل في مكونات البروتينات والفوسفور (P) يدخل في مكونات ADN.

نتيجة التجربة	ظروف التجربة	
يظهر الاشعاع على مستوى جدار الخلية البكتيرية.	- إيسام العاثية بالكبريت المشع ^{35}S . - وضع العاثية صحبة الخلية البكتيرية.	المجموعة الاولى
يظهر الاشعاع على مستوى سيتوبلازم الخلية البكتيرية.	- إيسام العاثية بالفوسفور المشع ^{32}P . - وضع العاثية صحبة الخلية البكتيرية.	المجموعة الثانية

الوثيقة 2


1- ماذا تستنتج (ي) من نتيجتي هذه التجربة ؟ (ن1)

تم تتبع تغير كميات ADN والبروتينات الفيروسية وكمية ADN البكتيري، وذلك بعد تثبت الفيروس على الخلية البكتيرية. أعطى هذا النتائج المبينة في الوثيقة 3.



2- صف (ي) النتائج المقدمة في مبيان الوثيقة 3، ثم فسر (ي) هذه النتائج. (ن0,75)

تقدم الوثيقة 4 دورة تكاثر العاثية.



3- صف (ي) المراحل ① و ② و ③ و ④ لدورة تكاثر العاثية. (ن1)
4- باستغلال معطيات الوثائق السابقة، بين (ي) أن ADN هو دعامة الخبر الوراثي للعاثية. (ن0,5)

■ الجزء الثاني :

ترمز المورثة 43 لدى العاثية T2 لبروتين يتكون من 848 حمضا أمينيا (ADN بوليميراز gp43)، وهو أنزيم مسؤول عن نسخ ADN العاثية T2. تبين الوثيقة 5 قطعة من الخيط غير المنسوخ للمورثة 43 كما تقدم الوثيقة 6 مستخلصا من جدول الرمز الوراثي.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	رقم الثلاثية
ATG	AAA	GAA	TTT	TAT	ATC	TCT	ATC	GAA	ACA...	قطعة من الخيط غير المنسوخ للمورثة 43
اتجاه القراءة →										الوثيقة 5


الوحدة الرمزية	الحمض الأميني	GAA	UUU	UCU	UAU	UAA	AUG	AUU	ACC	AAA	CCC
GAG	UUC	UCA	UAC	UAG		AUC	ACA	AAG	CCA		
UGA	UCG			UGA		AUA	ACG		CCG		
Glu	Phe	Ser	Tyr	Stop	Met	Ile	Thr	Lys	Pro		
الوثيقة 6											

5- باستعمال مستخلص جدول الرمز الوراثي، اعط (ي) متتالية الاحماض الامينية الناتجة عن تعبير قطعة ADN المورثة 43. (ن0,75)
6- بين (ي) تأثير الطفرة على دورة تكاثر الفيروس، في حالة استبدال النيكليوتيد G في الثلاثية 9 بـ T على مستوى الخيط غير المنسوخ للمورثة 43. (ن1)


التمرين الثاني (5 نقط)

في إطار دراسة بعض مظاهر تحسين المردود الزراعي نقترح المعطيات الآتية:

■ القمح هو نتاج لتاريخ طويل مع الإنسان. مكنت الدراسات الخلوية والجزيئية من التوصل إلى أصل نبات القمح المزروع حاليا انطلاقا من أنواع القمح المتوحشة. تلخص الوثيقة 1 سيرورة ظهور القمح.



يُنتج التزاوج بين افراد من أنواع متقاربة جيلا عقيما. ويمكن أن تتعرض الذخيرة الوراثية الهجينة الناتجة عن هذا التزاوج لتضاعف الصبغيات. هذه الظاهرة شائعة لدى العديد من النباتات الزهرية كالقمح وتؤدي إلى استعادة الخصوبة كما توضح الوثيقة 2.



1- باستغلال الوثيقتين 1 و 2، بين (ي) الآليات المعتمدة لتحسين القمح الطري. (1ن)


قبل أكثر من 10000 سنة، كان لدى القمح الطري الأصلي المزروع سنبلة ذات محور غير متماسك يؤدي إلى تساقط البذور وتناثرها فوق التربة وبالتالي يصعب جنيها. تقدم جدول الوثيقة 3 بعض خصائص بعض أنواع القمح.

النوع	Egilo de sars	Egilo de tausch	Engrain	Amidonier	Blé dur قمح صلب	Blé tendre قمح طري
تناثر البذور	نعم	نعم	نعم	ضعيف	لا	لا
أغلفة ملتصقة بالبذور	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	لا
مقاومة البرودة	لا	لا	لا	لا	لا	نعم
المردود الزراعي	ضعيف جدا	ضعيف جدا	ضعيف	ضعيف	مرتفع	مرتفع

الوثيقة 3

2. استخراج(ي) من الوثيقتين 1 و 3 التحسينات التي ظهرت خلال تاريخ نبات القمح. (1,75ن)


يعتبر الاستهلاك الفردي للقمح في المغرب من أعلى المستويات في العالم بيد أن إنتاجه لا يغطي كل الحاجيات. تمثل الوثيقة 4 كمية القمح الطري المنتج وكمية التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال الفترة من 1998 إلى 2004.



الوثيقة 4

3- بيّن(ي) انطلاقا من الوثيقة 4 تأثير التساقطات المطرية على إنتاج القمح الطري بالمغرب. (0,75ن)

في موسم 1992-1993 تم إنجاز تجارب باستعمال مقادير من المخصبات الأزوتية في ثلاثة مواقع بمنطقة دكالة باستعمال السلالة Marzak. كما تم قياس كمية الآزوت بالتربة (الشكل أ) وكذا مردود البذور بكل موقع (الشكل ب). تبين الوثيقة 5 نتائج هذه الدراسة.



الشكل أ

رقم الموقع	نسبة الآزوت الكلي في التربة (Nt)
الموقع 1	Nt = 3,09 %
الموقع 2	Nt = 1,85%
الموقع 3	Nt = 1,35%


الوثيقة 5

4- قارن(ي) استجابات القمح للمخصبات الأزوتية في المواقع الثلاث ثم فسر(ي) الاختلافات الملاحظة. (1,5ن)

التمرين الثالث (5 نقط)


Dictyota Dichotoma طحلب بحري يظهر في ثلاث أشكال؛ نبات بوغي و نبات مشيجي ذكري و نبات مشيجي أنثوي. لإبراز بعض مظاهر التوالد الجنسي عند هذا الطحلب نقترح المعطيات الآتية:

عند النضج، تشكل بعض خلايا النبات البوغي أكياسا بوغية تتعرض بداخلها خلايا أم للانقسام اختزالي. تعطي كل خلية أربعة أبواغ. يعطي شكلا الوثيقة 1 رسوما تخطيطية لطورين من الانقسام الاختزالي للخلايا الأم. (من أجل التبسيط نأخذ $2n=6$)



1- استخراج (ي) خاصيات كل طور انطلاقا من الوثيقة 1. (1ن)

تبين الوثيقة 2 تطور كمية ADN (بوحدة إصلاحية UA) لخلية تتعرض لانقسام اختزالي وتنتج الأبواغ.




2- صف (ي) تطور كمية ADN في الخلية الأم المنتجة للأبواغ. (1ن)

3- فسر (ي) تطور كمية ADN على المستويين الصبغي والجزيئي. (1ن, 25)

الصيغة الصبغية للنبات البوغي لـ *Dictyota Dichotoma* هي $2n=16$.

4- بين (ي) أهمية التخليط البصبغي للانقسام الاختزالي لدى نبات *Dictyota Dichotoma* خلال تشكل الأبواغ. (0, 75ن)

بعد تشكل الابواغ (D) يتم تحريرها في الماء وتنمو لتعطي نوعين من النباتات المشيجية :
- نبات مشيجي ذكري يتوفر على أكياس مشيجية ذكورية (A) تحرر خلايا صغيرة ومتحركة (a).
- نبات مشيجي أنثوي يتوفر على أكياس مشيجية أنثوية (B) تحرر خلايا كبيرة القد (b).
تبين الوثيقة 3 دورة نمو طحلب *Dictyota Dichotoma*.



5- بالاعتماد على الوثيقة 3، انجز (ي) الدورة الصبغة لطحلب *Dictyota Dichotoma*، ثم استنتج (ي) نمط هذه الدورة. (1ن)