

SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSS

مناصر الإجابة

RR 35

3h

العنوان

علوم الحياة والأرض

141

5

141-111

شعبـة العـلـوم التـجـريـيـة مـسـاـك العـلـوم الزـرـاعـيـة

الخطوة الأولى

| النقطة | استرداد المعرف (5 نقاط) | الرقم |
|--------|--|-------|
| ن 0,5 | 1- التعريف: 2- الانتقاء: عزل أفراد ذوو صفات أو خصائص مرغوبة من أجل إخضاعها للتکاثر. 2- التهجين : عملية تزاوج أفراد من سلالات أو من أنواع مختلفة تتوفّر على صفات مرغوبة للحصول على جيل هجين. قبول كل تعريف صحيح | I |
| ن 0,5 | (ج -1) | II |
| ن 0,5 | (ج -2) | |
| ن 0,5 | (ج -3) | |
| ن 0,5 | (ب -4) | |
| ن 0,25 | (ج -1) | III |
| ن 0,25 | (أ -2) | |
| ن 0,25 | (ب -3) | |
| ن 0,25 | (د -4) | |
| ن 0,25 | (خطأ -1) | IV |
| ن 0,25 | (صحيح -2) | |
| ن 0,25 | (خطأ -3) | |
| ن 0,25 | (صحيح -4) | |

الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبيان

| النقطة | التمرين 1 (5 نقط) | الرقم |
|--------|--|-------|
| 0,25 | أهمية الخلايا الميلانينية في الحماية من السرطان: يمنع تراكم الميلانين داخل الخلايا الكيراتينية تسرب الأشعة فوق البنفسجية المضرة. يؤدي غياب الميلانين لدى الأشخاص المصابين بالمهق إلى تسرب الأشعة فوق البنفسجية المضرة عبر الخلايا الكيراتينية وهو ما يمكن أن يحدث طفرات على مستوى ADN تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. | 1 |
| 0,5 | إذن الخلايا الميلانينية تحمي من الإصابة بسرطان الجلد. | |
| 0,25 | | |

| النقطة | التمرين 1 (تتمة) | الرقم | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---|-----------------|---|----------|---|--------------------------|---|
| 0,25 ن | - العلاقة بروتين-صفة: وجود الميلانين يعطي اصطباغ جلدي، وغياب الميلانين يعطي جلدا بدون اصطباغ (المهق). التيروزيناز هو البروتين الذي يحفز تركيب الميلانين. بوجود التيروزيناز، يتم تركيب الميلانين، وفي غيابه يتوقف تركيب الميلانين. هناك إذن علاقة بروتين (التيروزيناز) صفة (الاصطباغ الجلدي). | 2 | | | | | | | | |
| 0,25 ن | - متتالية الأحماض الأمينية لدى الشخص ذو اصطباغ جلدي: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>...TAT GAC CTC TTT GTC TGG ATG CAT...</td><td>خيط ADN غير المنسوخ</td></tr><tr><td>... ATA CTG GAG AAA CAG ACC TAC GTA ...</td><td>خيط ADN المنسوخ</td></tr><tr><td>... UAU GAC CUC UUU GUC UGG AUG CAU ...</td><td>خيط ARNm</td></tr><tr><td>... Tyr-Asp-Leu-Phe-Val-Trp-Met-His ...</td><td>متتالية الأحماض الأمينية</td></tr></table> | ...TAT GAC CTC TTT GTC TGG ATG CAT... | خيط ADN غير المنسوخ | ... ATA CTG GAG AAA CAG ACC TAC GTA ... | خيط ADN المنسوخ | ... UAU GAC CUC UUU GUC UGG AUG CAU ... | خيط ARNm | ... Tyr-Asp-Leu-Phe-Val-Trp-Met-His ... | متتالية الأحماض الأمينية | 3 |
| ...TAT GAC CTC TTT GTC TGG ATG CAT... | خيط ADN غير المنسوخ | | | | | | | | | |
| ... ATA CTG GAG AAA CAG ACC TAC GTA ... | خيط ADN المنسوخ | | | | | | | | | |
| ... UAU GAC CUC UUU GUC UGG AUG CAU ... | خيط ARNm | | | | | | | | | |
| ... Tyr-Asp-Leu-Phe-Val-Trp-Met-His ... | متتالية الأحماض الأمينية | | | | | | | | | |
| 0,25 ن | - متتالية الأحماض الأمينية لدى الشخص ذو الجلد المصاب بالمهق: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>...TAT GAC CTC TTT GTC TAG ATG CAT ...</td><td>خيط ADN غير المنسوخ</td></tr><tr><td>... ATA CTG GAG AAA CAG AUC TAC GTA ...</td><td>خيط ADN المنسوخ</td></tr><tr><td>... UAU GAC CUC UUU GUC UAG AUG CAU ...</td><td>خيط ARNm</td></tr><tr><td>...Tyr-Asp-Leu-Phe-Val</td><td>متتالية الأحماض الأمينية</td></tr></table> | ...TAT GAC CTC TTT GTC TAG ATG CAT ... | خيط ADN غير المنسوخ | ... ATA CTG GAG AAA CAG AUC TAC GTA ... | خيط ADN المنسوخ | ... UAU GAC CUC UUU GUC UAG AUG CAU ... | خيط ARNm | ...Tyr-Asp-Leu-Phe-Val | متتالية الأحماض الأمينية | 3 |
| ...TAT GAC CTC TTT GTC TAG ATG CAT ... | خيط ADN غير المنسوخ | | | | | | | | | |
| ... ATA CTG GAG AAA CAG AUC TAC GTA ... | خيط ADN المنسوخ | | | | | | | | | |
| ... UAU GAC CUC UUU GUC UAG AUG CAU ... | خيط ARNm | | | | | | | | | |
| ...Tyr-Asp-Leu-Phe-Val | متتالية الأحماض الأمينية | | | | | | | | | |
| 0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن | - تفسير الأصل الوراثي للمهق: عند شخص مصاب بالمهق حليل المورثة TYR طافر. طفرة استبدال النوكليوتيد G في النوكليوتيد رقم 533 بالنوكليوتيد A. أعطى هذا وحدة رمزية بدون معنى STOP مما أدى إلى توقف الترجمة. تكون سلسلة بيبتيدية غير مكتملة تعطي أنيزم غير وظيفي بوجود تيروزيناز غير وظيفي، لا تستطيع خلايا الميلانين أن تنتج صبغة الميلانين وبالتالي الإصابة بالمهق. ... | 4 | | | | | | | | |
| 0,5 ن | - في حالة سرطان: طفرة في المورثة BRAF حيث تم استبدال النوكليوتيد T في الموقع 600 بالنوكليوتيد A أعطى بروتينا غير فعال. ترمز الثلاثية GTG على مستوى حليل الشخص العادي للحمض الأميني Val، بينما ترمز الثلاثية GAG في الحليل الطافر عند الشخص المصاب بالسرطان الجلدي إلى الحمض الأميني Glu وهو ما يؤدي إلى تكاثر الخلايا الميلانينية وهجرتها وظهور سرطان جلدي. - عند السيدة : يبين تحليل ADN ان طفرة المورثة BRAF هي استبدال النوكليوتيد A بالنوكليوتيد G في الموقع 601. تعطي هذه الطافرة بروتينا عاديا لأن الثلاثية GTG في الحليل العادي والثلاثية GTA في حليل السيدة ترمزان لنفس الحمض الأميني Val | 5 | | | | | | | | |

الصفحة



4

RR 35

6

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - **مماصر الإجابة**

- مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <p>التزاوج الثالث:</p> <p>هذا تزاوج اختباري. وقد أعطى 4 مظاهر خارجية مختلفة: - مظهرين خارجيين أبوين بنسبة 92% : $[L; n]$ بنسبة 46% و $[\ell; n]$ بنسبة 46% - مظهرين خارجيين جديدا التركيب بنسبة 8% : $[n; L]$ بنسبة 4% و $[\ell; n]$ بنسبة 4% نسبة المظاهر الخارجية الأبوية أكبر من نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب، إذن فالمورثان مرتبطان.</p> <p>المسافة بين المورثتين هي : $4\% + 4\% = 8cMg$</p> | 3 | | | | | | | | | | | | |
| <p>النتائج النظرية للتزاوج الأنثى بزغلب قصير وأجنحة غير عادية مع ذكر بزغلب قصير وأجنحة غير عادية:</p> <p>المظاهر الخارجية الأنماط الوراثية الأمشاج</p> | 4 | | | | | | | | | | | | |
| <p>شبكة التزاوج</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">\varnothing</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">σ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\frac{1}{2} Ln/$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\frac{1}{2} \ell n/$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\frac{1}{2} Ln/$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$L n // \ell n$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$L n // \ell n [L; n]$ $1/3$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$L n // \ell n [L; n]$ $1/3$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\frac{1}{2} \ell n/$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$L n // \ell n [L; n]$ $1/3$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">$[\ell; n] \quad 1/3 \quad [L; n] \quad 2/3$ و النمط الوراثي $L // \ell$ مميت، نتيجة التزاوج هي $2/3 [L; n]$ و $1/3 [\ell; n]$</p> | \varnothing | σ | $\frac{1}{2} Ln/$ | $\frac{1}{2} \ell n/$ | $\frac{1}{2} Ln/$ | $L n // \ell n$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | $\frac{1}{2} \ell n/$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | $\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$ | $\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$ | |
| \varnothing | σ | $\frac{1}{2} Ln/$ | $\frac{1}{2} \ell n/$ | | | | | | | | | | |
| $\frac{1}{2} Ln/$ | $L n // \ell n$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | | | | | | | | | | |
| $\frac{1}{2} \ell n/$ | $L n // \ell n [L; n]$ $1/3$ | $\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$ | $\ell n // \ell n [\ell; n]$ $1/3$ | | | | | | | | | | |
| <p>الخريطة العاملية للمورثات الثلاث:</p> <p>الحالة الأولى:</p>  <p>الحالة الثانية:</p>  | 5 | | | | | | | | | | | | |

| النقطة | التمرين 3 (5 نقاط) | السؤال |
|--------------------------------------|---|--------|
| 0,5 ن | <p>أ- العلاقة بين السديمة الحرة والنهر: بعد الفترة القاحلة، المستوى التغمازي للسديمة الحرة أقل من مستوى الماء في النهر. مياه النهر هي التي تتدفق في السديمة: مياه النهر تغذي سديمة الحملماء الرملية بالماء</p> <p>ب - تفسير آخر ممكن يؤدي لنفس هذه الوضعية</p> <ul style="list-style-type: none"> - بعد تساقطات مطرية مهمة في عالية النهر، تجمع المياه عبر الروافد ويترتفع مستوى الماء به. - بعد ضخ كميات مهمة من الماء من السديمة الحرة وانخفاض المستوى التغمازي. <p>قبول كل جواب صحيح.</p> | 1 |
| 0,5 ن | <p>أ- مقارنة حالة السديمة قبل وبعد الفترة الممطرة. في الحالة الشكل (أ)، تمتلئ الفجوات بين حبيبات الحملماء الرملية التي تتسبّع بالماء؛ بينما في الحالة الشكل (ب) يشغل الهواء أغلب الفجوات بين حبيبات الحملماء الرملية، نسبة الماء قليلة (الماء الملتصق بحبيبات الرمل)، والحملماء غير مشبعة بالماء.</p> <p>ب - تفسير : تترسّح مياه الأمطار في الأعمق حيث تملأ تدريجياً فجوات الهواء في الحملماء حتى تصل حالة الإشباع. ... يرتفع مستوى المنطقة المشبعة بالماء داخل الحملماء، أي يرتفع المستوى التغمازي للسديمة المائية الحرة</p> | 2 |
| 0,25 ن 0,25 ن | <p>وصف تطور مستوى الماء في الجدول المائي: ما بين 2 و 22 يوليوز، مستوى الماء في الجدول المائي ثابت في حوالي 0,45m</p> <p>ما بين 22 و 15 غشت، انخفض مستوى الماء في الجدول المائي بشكل تدريجي إلى أن انعدم بعد 15 غشت، يبقى مستوى الماء في الجدول المائي منخفضاً وثابتًا في قيمة متوسطة 5cm</p> | 3 |
| 0,75 ن | <p>اقتراح ثلاث فرضيات لتفسير كيفية اجتلاف الجدول المائي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - غياب التساقطات الطيرية التي تغذي الجدول المائي - مياه الجدول تغذي السديمة المائية الجوفية - ضخ المياه من الجدول لأغراض زراعية، أو صناعية، أو منزلية - ارتفاع درجة الحرارة وتبخّر الماء <p>قبول كل فرضية مقترحة صحيحة</p> | 4 |
| 0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن 0,25 ن | <p>العلاقة بين التساقطات المطرية ومستوى الماء في الجدول المائي:</p> <p>خلال الفترة المطيرة العادية، يصل مستوى الماء في الجدول المائي ما بين 0,4m و 0,5m</p> <p>عندما تكون التساقطات المطرية قوية، يرتفع مستوى الماء في الجدول المائي بشكل كبير إلى 1,2m</p> <p>خلال فترة الجفاف حيث تقلّ أو التساقطات المطرية، ينخفض مستوى الماء في الجدول المائي بشكل تدريجي</p> <p>مستوى الماء في الجدول المائي مرتبطة بالتساقطات المطرية.</p> | 5 |