



0.1 Continuité en un point - Continuité sur un intervalle

0.1.1 Continuité en un point

Définition 1

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I , et $x_0 \in I$.
On dit que f est continue au point x_0 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

0.1.2 Continuité à droite et à gauche en un point.

Définition 2

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[x_0; x_0 + \alpha[; ([x_0 - \alpha; x_0])$ où $\alpha > 0$

* On dit f est continue à droite (à gauche) en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$)

Propriété

La fonction f est continue en $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

0.1.3 Continuité sur un intervalle.

Définition 3

On dit qu'une fonction f est continue sur $[a, b]$ si elle est continue en tout élément de l'intervalle $[a, b]$ et continue à droite en a et à gauche en b

Remarque

De la même façon, On définit la continuité d'une fonction sur les intervalles $[a, b[,]a, b], [a, +\infty[$ et $]-\infty, b]$

0.1.4 Continuité des fonctions usuelles

Conséquence

Les fonctions polynômes , Rationnelles ; $x \rightarrow \sqrt{x}$; $x \rightarrow \cos x$; $x \rightarrow \sin x$ et $x \rightarrow \tan x$; sont continue sur chaque intervalle inclus dans leur ensemble de définition

0.1.5 Opération sur les fonctions Continue

Propriété

Si f et g sont continues sur I , alors : $f + g$, $f \times g$; kf sont continues sur I

Si f et g sont continues sur I , avec $\left(\forall x \in I, g(x) \neq 0 \right)$ alors : $\frac{f}{g}$; $\frac{1}{g}$ sont continues sur I

0.2 Image d'un intervalle par une fonction continue.

Définition


L'image d'un intervalle I par une fonction f est l'ensemble de tous les nombres avec x dans I . On note $f(I)$.

Propriété 1

L'image d'un segment (**intervalle**) par une fonction continue est un segment (**intervalle**).


Info

$$f([a; b]) = [m; M] \quad \text{avec} \quad m = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$



0.2.1 Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone.

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle I ; On a les résultats suivants




L'image de $f(I)$

	f est strictement croissante	f est strictement décroissante
$[a; b]$	$[f(a); f(b)]$	$[f(b); f(a)]$
$]a; b[$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right]$
$[a; b[$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a) \right]$
$]-\infty; a]$	$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(a) \right]$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$
$]a; +\infty[$	$\left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right]$
\mathbb{R}	$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$

0.3 Théorème des valeurs intermédiaires.

Propriété

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$; alors $\forall k \in f([a; b])$, il existe au moins un réel c dans l'intervalle $[a; b]$, tel que $f(c) = k$



Conséquence 1

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a; b]$.

Conséquence 2

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur $[a; b]$; alors pour tout $k \in f([a; b])$, il existe une seul réel $c \in [a; b]$, tel que $f(c) = k$

0.4 Continuité de la composée de deux fonctions.


Conséquence 2

Soit f une fonction continue sur I et g une fonction continue sur J et tel que $f(I) \subset J$, alors gof est continue sur I

0.5 Fonction réciproque

Propriété 1

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur I , alors f admet une fonction réciproque, notée f^{-1} définie sur $f(I) = J$ vers I



Propriété 2

*

$$\left\{ \begin{array}{l} f(y) = x \\ y \in I \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} f^{-1}(x) = y \\ x \in f(I) \end{array} \right.$$

* $(\forall x \in I); f^{-1} \circ f(x) = x$

* $(\forall x \in f(I)); f \circ f^{-1}(x) = x$

* La fonction f^{-1} est continue et monotonie sur $f(I)$.

* Cf^{-1} est symétrique de Cf par rapport à la droite d'équation $y = x$ dans un repère orthonormé.

0.6 Fonction racine n- ième

Définition

La fonction réciproque de la fonction définie sur $[0 + \infty[$; par: $x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ est appelée fonction racine n-ième; notée $x \mapsto \sqrt[n]{x}$

Propriété

* La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0 + \infty[$; et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

* les deux courbes C_f et C_f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice d'équation $y = x$.

Propriété

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall (a; b) \in \mathbb{R}_+^2$

♣ $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b$

♣ $\sqrt[n]{a^n} = a$

♣ $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b$

Propriété (Opérations sur les racines nième)

$\forall (n; m) \in \mathbb{N}^*$ et $\forall (a; b) \in \mathbb{R}_+^2$

♣ $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \times b}$

♣ $\sqrt[n]{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}} \quad (\text{si } b \neq 0)$

♣ $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad Si \quad (b \neq 0)$

♣ $\sqrt[nm]{a^m} = \sqrt[n]{a} \quad \text{et} \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Propriété

$p \in \mathbb{Z}^* ; p \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^+$: $\sqrt[q]{x^p} = x^{\frac{p}{q}}$

Cas particulier: $\sqrt[q]{x} = x^{\frac{1}{q}}$ et $\sqrt[2]{x} = x^{\frac{1}{2}}$

0.7 L'équation $x^n = a/n \in \mathbb{N}^* ; x \in \mathbb{R}; a \in \mathbb{R}$

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n est paire	$x = \sqrt[n]{a}$ ou $x = -\sqrt[n]{a}$	$x = 0$	
n est impaire	$x = \sqrt[n]{a}$	$x = 0$	$x = -\sqrt[n]{ a }$

Des Remarques

$a \in \mathbb{R}_+^* ; b \in \mathbb{R}_+^*$

$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} \quad / \quad \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \frac{a + b}{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$$