

TD :Exercices: LIMITE ET CONTINUITÉ

Exercice1 : Déterminer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} + 1}{2x - 1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 5x^2 - 7x^4}{x - 10x^2 + 14x^3}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 8x^2 - 2x^5}{x^2 + 2x^6}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$$

$$6) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$$

Exercice2 : (*Limites à droite et à gauche*)

Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{(x+1)^2}{|x^2 - 1|}$

Etudier la limite de f en $x_0 = -1$

Exercice3 : Soient les fonctions tels que :

$$f(x) = \sqrt{2x+1}(-3x^2 + x) \text{ et } g(x) = \frac{-2x^2 + 1}{(x-3)^2}(\sqrt{x} + 1)$$

$$k(x) = \frac{-3x+1}{x(x-2)} \text{ et } h(x) = \frac{x^2+1}{x^3} \sin x$$

1) Déterminer : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2) Déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$

3) Déterminer : $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

4) Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de k

Exercice4 : Considérons la fonction f définie

$$\text{par : } \begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x-1}; \text{ si } x \neq 1 \\ f(1) = -4 \end{cases}$$

1) Déterminer Df

$$2) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

b) Comparer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et $f(1)$

Exercice5 : Considérons la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x - 3}; \text{ si } x \neq 3 \text{ et } f(3) = 7$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 3$

Exercice6 : Considérons la fonction f définie

$$\text{Par : } f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\tan x}; \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = \frac{1}{2}$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$

Exercice7 : Considérons la fonction f définie

$$\text{Par : } f(x) = \frac{\sin(x-2)}{x^2 - 2x}; \text{ si } x \neq 0 \text{ et } x \neq 2 \text{ et } f(2) = \frac{1}{2}$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 2$

Exercice8 : Considérons la fonction f définie

$$\text{Par : } \begin{cases} f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x-1}; \text{ si } \dots x \neq 1 \\ f(1) = m \end{cases}$$

avec m paramètre réel

déterminer la valeur du réel m pour laquelle f est continue en $x_0 = 1$

Exercice9 : Considérons la fonction f définie par

$$f(x) = 2 + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right); \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 2$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$

Exercice10 : Soit f définie sur \mathbf{R} par :

$$\begin{cases} f(x) = x^2; \text{ si } \dots x \leq 0 \\ f(1) = 2 + x; \text{ si } \dots x > 0 \end{cases}$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$

Exercice11 : Soit f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = 3 - x^2; \text{ si } \dots x \leq 0 \\ f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 1}; \text{ si } \dots x > 0 \end{cases}$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$

Exercice12 : Considérons la fonction f définie

$$\text{Par : } \begin{cases} f(x) = \frac{2x+1}{7-3x}; \text{ si } \dots x \leq 2 \\ f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x-2}; \text{ si } \dots x > 2 \end{cases}$$

Etudier la continuité de f en $x_0 = 2$

Exercice13 : Soit la fonction :

$$f : x \mapsto \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} \text{ si } x \neq 1 \text{ et } f(1) = 2$$

Etudier la la continuité de f en $x_0 = 1$

Exercice14 : Soit la fonction h définie par

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 3x + 2}$$

1- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .

2- Déterminer la limite $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, f est-elle continue en $x_0 = -1$?

3- Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = f(x); \text{ si } x \neq -1 \\ f(-1) = 3 \end{cases}$$

a) Déterminer D_f

b) Etudier la continuité de la fonction

f en $x_0 = -1$ La fonction f s'appelle un prolongement par continuité de la fonction de f en -1

4- Peut-on prolonger f par continuité en $a = -2$

Exercice15 : Soit f une fonction définie par

$$f(x) = \frac{1 - \cos x}{x} \text{ Donner un prolongement par}$$

continuité de la fonction f en $x_0 = 0$

Exercice 16 : Etudier la la continuité des fonctions suivantes :

$$1) h(x) = \sqrt{x^2 + x + 3} \quad 2) g(x) = \frac{x^4 + x^3 - 6}{x^2 + 2x - 3}$$

$$3) t(x) = \tan x$$

Exercice 17 : Etudier la la continuité des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = \cos(2x^2 - 3x + 4)$$

$$2) g(x) = \sqrt{\frac{x}{1 + \sin^2 x}} \quad 3) h(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right)$$

Exercice 18 : Déterminer les limites suivantes :


$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \pi\right) \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\pi \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)$$

Exercice19 : Déterminer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \tan x}{3x}\right) \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x^2 - 4x + 3}{4x^2 + 7}\right)$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \sin\sqrt{\frac{2x^2}{1 - \cos x}}$$

Exercice20 : Le graphe ci-contre est le graphe de la fonction $f(x) = x^2 + 2x$



Déterminer graphiquement les images des intervalles : $[-1, 2]$, $[0, 2[$; $] -1, 0]$

$$[2, +\infty[;]-\infty, 1]$$

Exercice21 : Soit f une fonction définie par

$$f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1}$$

Déterminer les images des intervalles suivants :

$$[0, 1] ; [-2, -1[;] -1, 1] ; [2, +\infty[$$

Exercice22 : Montrer que l'équation :

$$4x^3 - 3x - \frac{1}{2} = 0 \text{ admet une racine dans chacune}$$

des intervalles suivants : $]-1; -\frac{1}{2}[$; $]-\frac{1}{2}; 0[$ et $]0; 1[$

Exercice23 : Montrer que l'équation :

$$x^3 + x + 1 = 0$$

Admet une racine unique dans $]-1; 0[$

Exercice24 : Montrer que l'équation : $\cos x = x$

Admet au moins une racine dans intervalle :

$$I = [0; \pi]$$

Exercice25 : Montrer que l'équation : $1 + \sin x = x$

Admet au moins une racine dans intervalle :

$$I = \left[\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right]$$

Exercice26 : on considère la fonction : f tel que $f(x) = x^3 + x - 1$

1) Montrer que l'équation : $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur \mathbb{R}

2) Montrer que l'équation : $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]0; 1[$

3) étudier le signe de $f(x)$ sur \mathbb{R}

Exercice 27 : Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x-3}{x+2}$$

1) Montrer que la fonction g la restriction de f sur l'intervalle $I =]-2; +\infty[$ admet une fonction

réciproque g^{-1} définie sur un J qu'il faut déterminer.

2) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout x de l'intervalle J

Exercice 28: Soit f la fonction définie sur

$$I = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[\text{ par : } f(x) = \sqrt{2x-1}$$

1) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un J qu'il faut déterminer.

2) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout x de l'intervalle J

3) Représenter (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ dans le même repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j})

Exercice 29 : Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

1) $x^5 = 32$ 2) $x^7 = -128$ 3) $x^4 = 3$ 4) $x^6 = -8$

Exercice 30 : simplifier les expressions suivantes : 1) $(\sqrt[3]{2})^3$ 2) $\sqrt[2]{\sqrt[4]{2}}$

3) $A = \sqrt[5]{32} - (\sqrt[7]{2})^7 + \sqrt[3]{\sqrt[3]{512}} + \frac{\sqrt[5]{96}}{\sqrt[5]{3}}$

4) $B = \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[5]{16} \times \sqrt{\sqrt[3]{4}} \times \sqrt[15]{2}}{\sqrt[15]{256}}$

5) $C = \frac{(27)^{\frac{2}{9}} \times (81)^{\frac{1}{4}} \times 9^{\frac{5}{2}}}{3^{\frac{17}{3}}}$ 6) $D = \sqrt[6]{\frac{2^5 \times 128000000}{27^2}}$

7) $E = \frac{\sqrt[5]{2} \times \sqrt{8}}{\sqrt[5]{128}}$ 8) $F = \frac{\sqrt[3]{4} \times \sqrt{8} \times (\sqrt{\sqrt{2}})^2}{\sqrt[3]{4}}$

Exercice 31 : comparer : $\sqrt[5]{2}$ et $\sqrt[3]{3}$

Exercice 32 : résoudre dans \mathbb{R} :

1) $\sqrt[5]{3x-4} = 2$ 2) $(\sqrt[5]{x})^2 - 5\sqrt[5]{x} + 6 = 0$

Exercice 33 : calculez les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{x^3 + 24}$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^5 + 2x^3 - x + 4}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$ 4) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$

5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2x+6} - \sqrt{x+3}}{x-1}$ 6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt[3]{x^2 - 2}}$

7) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt[4]{x^2 - 1}}{\sqrt{x-1}}$

Exercice 34 : simplifier les expressions suivantes : 1) $A = \frac{\sqrt[3]{1024} \times \sqrt[5]{3200000}}{\sqrt[4]{64} \times \sqrt[3]{\sqrt{252}} \times \sqrt{18}}$

2) a) comparer : $\sqrt[5]{4}$ et $\sqrt[4]{3}$

b) comparer : $\sqrt[3]{28}$ et $\sqrt{13}$

c) comparer : $\sqrt[5]{23}$ et $\sqrt[15]{151}$

Exercice 35 : 1) Rendre le dénominateur rationnel

$$a = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2} - 2} \quad b = \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1} \quad c = \frac{1}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{5}}$$

$$d = \frac{1}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}}$$

2) Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt[3]{x}-1}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 1} - x$

Exercice 36 : Déterminer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{20x^2 - 4} - 2}{2x^2 + x - 3}$$

Exercice 37: 1) simplifier les expressions suivantes : $A = \frac{\sqrt[5]{3^5} \times \sqrt[3]{9} \times (\sqrt[5]{9})^3}{\sqrt[5]{3}}$

$$\text{et } B = \frac{\sqrt[4]{9} \times \sqrt[3]{3^3 \times \sqrt{9}}}{\sqrt[5]{81} \times \sqrt{\sqrt[3]{3}}}$$

2) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation :

a) $\sqrt[3]{x-1} = 3$ b) $x^{\frac{2}{3}} - 7x^{\frac{1}{3}} - 8 = 0$

c) $\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} - 12 = 0$

2) Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[5]{x^5 + x^2 + 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x+1} - 1}$

Exercice 38 : Considérons la fonction f définie

par : $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$; si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$

- 1) Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$
- 2) Etudier la continuité de f sur les intervalles $]0; +\infty[$ et $]-\infty; 0[$ et est ce f est continue sur \mathbb{R}
- 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Exercice 39 : soient f et g sont deux fonctions définies sur \mathbb{R} tels que f est bornée et g continue sur \mathbb{R} ; Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées sur \mathbb{R}

Exercice 40: Considérons la fonction f continue Sur l'intervalle $[a;b]$ et x_1 et x_2 et x_3 des nombres de l'intervalle $[a;b]$

Montrer que l'équation :

$3f(x) = f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)$ admet au moins une solution dans $[a;b]$

Exercice 41 : soient f et g sont deux fonctions continues sur $[a;b]$ tels que :

$$0 < g(x) < f(x) \quad \forall x \in [a;b]$$

Montrer que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^* / \forall x \in [a;b]; (1+\lambda)g(x) \leq f(x)$$

Exercice 42: Considérons la fonction f continue Sur l'intervalle $[a;b]$ tel que : $f(a) < 0$

il existe $x_0 \in]a;b[$ tel que : $f(x_0) = \frac{a-x_0}{b-x_0}$

Exercice 43 : Soit la fonction $f(x) = x^2 + x + 1$ définie sur \mathbb{R} .

- 1- Déterminer $J = f([0,1])$
- 2- Montrer que f admet une fonction réciproque de J vers $[0,1]$ et déterminer $f^{-1}(x) \quad \forall x \in J$

Exercice 44 : Soit la fonction $g(x) = x - 2\sqrt{x}$

définie sur \mathbb{R}^+ .

- 1- Montrer que g est strictement croissante sur $[1, +\infty[$ puis déterminer $J = g([1, +\infty[)$
- 2- Montrer que g admet une fonction réciproque de J vers $[1, +\infty[$ et déterminer $g^{-1}(x) \quad \forall x \in J$

Exercice 45 : Soit la fonction $h(x) = \frac{x}{1-x^2}$

Montrer que h est une bijection de $-1, 1[$ vers un intervalle J qu'il faut déterminer et déterminer et déterminer $h^{-1}(x) \quad \forall x \in J$

Exercice 46 :

1. Résoudre dans \mathbb{R} l'équation: $\sqrt[3]{x} - x = 0$
2. Résoudre dans \mathbb{R} l'équation : $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[6]{x} + 6 = 0$
3. Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation : $\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x-2} > 1$

Exercice 47:

1. Résoudre dans \mathbb{R} : $x^4 = 16$
2. Résoudre dans \mathbb{R} : $(x-1)^3 = -27$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron » Dit un proverbe. C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices Que l'on devient un mathématicien

