Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Pro. Benmoussa Med

I. Dérivabilité d'une fonction en un point x_0 – dérivabilité à droite et à gauche en un point x_0 :

A. Dérivabilité :

a. Définitions :

Soit une fonction f tel que son domaine de définition contient un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell \in \mathbb{R}\right)$ $\ell = f'(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé de f en x_0.
- f est dérivable à droite de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_d \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell_d \in \mathbb{R}\right)$ $\ell_d = f'_d(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0.
- f est dérivable à gauche de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_g \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell_g \in \mathbb{R}\right)$ $\ell_g = f'_g(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0.

b. Propriété :

Soit une fonction f .

f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow$ f est dérivable à droite et à gauche et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

B. interprétation géométrique des nombres dérivées $f'(x_0)$ et $f_d'(x_0)$ et $f_g'(x_0)$

a. Interprétation géométrique du nombre dérivée $f'(x_0)$:

- f est une fonction dérivable au point x_0.
- (C_f) sa courbe représentative dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

❖ Le nombre dérivé $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la droite tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $A(x_0, f(x_0))$ (le point x_0).

❖ Equation cartésienne de la tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $A(x_0, f(x_0))$ est $(T): y = (x-x_0)f'(x_0) + f(x_0)$.

❖ Si $f'(x) = 0$ alors la tangente est parallèle à l'axe des abscisse .

b. Exemple :

1. Trouver équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $x_0 = 1$ avec $f(x) = 2x^2$.

L'équation est $(T): y = (x-1)f'(1) + f(1)$ ou $(T): y = (x-1)\times 4 + 2$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

D'où le coefficient directeur est $m=4$ et vecteur directeur est : $\vec{u}(1,4)=1\vec{i}+4\vec{j}$

A partir du point $A(1,f(1))$ avec $f(1)=2$

- On construit le point B tel que $\overrightarrow{AB}=1\vec{i}$ et on construit le point C tel que : $\overrightarrow{BC}=4\vec{j}$.
- D'où la droite (AC) est la tangente (T) à (C_f) au point A.
- Pour tracer la tangente il suffit de tracer un segment dans les extrémités on met des flèches son milieu est A.



c. Interprétation géométrique des nombres dérivées $f_d'(x_0)$ et $f_g'(x_0)$:

- Si f est dérivable à droite de x_0 on a une demi-tangente à droite de x_0 de coefficient directeur $f_d'(x_0)$.
- équation du demi tangente à droite de $-x_0$ est $(T_d): y=(x-x_0)f_d'(x_0)+f(x_0)$ avec $x\geq x_0$.
- Si f est dérivable à gauche de x_0 on aune demi-tangente à droite de x_0 de coefficient directeur $f_g'(x_0)$.
- équation du demi tangente à gauche de $-x_0$ est $(T_g): y=(x-x_0)f_g'(x_0)+f(x_0)$ avec $x\leq x_0$.
- Si $f_d'(x_0)\neq f_g'(x_0)$ donc f n'est pas dérivable en x_0 et le point $A(x_0,f(x_0))$ est appelé point anguleux.

d. Exemple :

soit $\begin{cases} f(x)=(x+3)^3+2 & ;x\geq -2 \\ f(x)=-(x+3)^2+4 & ;x<-2 \end{cases}$ on a $f_d'(-2)=3$ et $f_g'(-2)=-2$

- équation du demi tangente à droite de -2 est $(T_d): y=(x+2)f_d'(-2)+f(-2)$ avec $x\geq x_0$.
- équation du demi tangente à gauche de -2 est $(T_g): y=(x+2)f_g'(-2)+f(-2)$ avec $x\leq x_0$.

Demi tangente à droite de -2



Demi tangente à gauche de -2



Demi tangente en -2 le point $A(-2,3)$ est un point anguleux



Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

e. Remarque :

- si f n'est pas dérivable à droite (c.à.d. $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\pm\infty$) dans ce cas on a demi tangente à droite de x_0 parallèle à l'axe des ordonnées
- si f n'est pas dérivable à gauche (c.à.d. $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\pm\infty$) dans ce cas on a demi tangente à gauche de x_0 parallèle à l'axe des ordonnées .

f. Exemple : exemple $f(x)=\sqrt{(x+1)(x+2)}$.



❖ à droite de $x_0=1$ on a : $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=f(1)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+}=\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\infty$.

donc (C_f) admet demi tangente verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) à droite du point $M(1,f(1))$

à gauche de $x_0=-1$ on a : $\lim\limits_{x\to(-1)^-}f(x)=f(-1)$ et $\lim\limits_{x\to(-1)^+}=\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\infty$. donc (C_f) admet demi tangente verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) à gauche du point $M(-1,f(-1))$

g. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .

II. Dérivabilité sur un intervalle – fonction dérivée première – dérivée seconde –dérivée n^{ième} d'une fonction :

A. Dérivabilité sur un intervalle :

a. Définition :

- f est une fonction dérivable sur $I=]a;b[$ si et seulement si f est d dérivable en tout point x_0 de I .
- f est une fonction dérivable sur $[a;b[$ si et seulement si f est d dérivable sur $I=]a;b[$ et f est dérivable à droite du point a .
- f est dérivable sur $]a,b]\Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à gauche de b
- f est dérivable sur $[a,b]\Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à droite de a et à gauche de b .

B. La fonction dérivée première d'une fonction – la fonction dérivée seconde – dérivée n^{ième} d' une fonction:

a. Définition :

f est une fonction dérivable sur un intervalle I .

- La fonction g qui relie chaque élément x de I par le nombre f '(x) s'appelle la fonction dérivée de f et on note : $g=f'$. Ou encore $\begin{array}{l} g:I\to\mathbb{R} \\ x\to g(x)=f'(x)\end{array}$ g s'appelle la fonction dérivée de f on note : $g=f'$.
- La fonction dérivée de f ' sur I s'appelle la fonction dérivée seconde (dérivée d'ordre 2) on note f " ou $f^{(2)}$
- En général : la dérivée d'ordre n de f est la fonction dérivée de $f^{(n-1)}(x)$ (la dérivée de la fonction dérivée d'ordre $n-1$) et on note $f^{(n)}(x)=\left(f^{(n-1)}\right)'(x)$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

III. Les opérations sur les fonctions dérivables :

a. Propriété :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . on a :

- La fonction $f+g$ est dérivable sur I et $(f+g)'(x)=f'(x)+g'(x)$.
- La fonction αf est dérivable sur I et $(\alpha f)'(x)=\alpha f'(x)$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$
- La fonction $f\times g$ est dérivable sur I et $(f\times g)'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$.
- La fonction $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I $\forall x\in I, g(x)\neq 0$ et $\left(\frac{1}{g}\right)'(x)=-\frac{g'(x)}{g^2(x)}$.
- La fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I $\forall x\in I, g(x)\neq 0$ et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

IV. Dérivabilité des fonctions : polynomiales – rationnelles - $f^n(x)$ - fonctions trigonométriques :

a. Propriété :

- Toute fonction polynomiale est dérivable sur son ensemble de définition $D_f=\mathbb{R}$ et $(ax^n)'=nax^{n-1}$ et $n\in\mathbb{N}^*$.
- Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition D_f .
- f est une fonction dérivable sur un intervalle I .
  - ✓ La fonction f^n avec $n\in\mathbb{N}^*$ est dérivable sur I et on a : $(f^n)'(x)=nf^{n-1}(x)f'(x)$.
  - ✓ Si pour tout x de I ; $f(x)\neq 0$ on a la fonction $f^p(x)$ avec $p\in\mathbb{Z}^*$ est dérivable sur I et $(f^p)'(x)=pf^{p-1}(x)f'(x)$.
- La fonction $f(x)=\cos(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x)=(\cos(x))'=-\sin(x)$.
- La fonction $f(x)=\sin(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x)=(\sin(x))'=\cos(x)$.
- La fonction $f(x)=\tan(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\ ;\ k\in\mathbb{Z}\right\}$ avec $f'(x)=(\tan(x))'=1+\tan^2(x)$ ou encore $f'(x)=(\tan(x))'=\frac{1}{\cos^2 x}$.

b. Exemple : Calculer : $g'(x)$ pour $g(x)=(-2x^4+5x^2+x-3)^7$.

On a : $g'(x)=\left[(-2x^4+x-3)^7\right]'$.

$=7(-2x^4+x-3)^6(-2x^4+x-3)'$

$=7(-2x^4+x-3)^6(-8x^3+1)$

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

VII. Dérivabilité de la composée de deux fonctions :

a. Théorème :

f dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$ alors la fonction $g\circ f$ est dérivable en x_0 et on a :

$$(g\circ f)'(x_0)=f'(x_0)\times g'\left(f(x_0)\right).$$

b. Application :

- $\left(\sqrt{f(x)}\right)'=\dfrac{f'(x)}{2\times\sqrt{f(x)}}$; $x\in D_{f'}$ et $f(x)>0$.
- $\left(\sin(ax+b)\right)'=a\times\cos(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$.
- $\left(\cos(ax+b)\right)'=-a\times\sin(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$.
- $\left(\tan(ax+b)\right)'=a\times\left[1+\tan^2(ax+b)\right]=a\times\dfrac{1}{\cos^2(ax+b)}$ avec $ax+b\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$; $k\in\mathbb{Z}$.

V. La fonction dérivée de la fonction réciproque :

a. Théorème :

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur I et $f(I)=J$) , f^{-1} est la fonction réciproque de la fonction ($(x_0\in I)$; $x_0\mapsto f(x_0)=y_0$; $(y_0\in J)$)

f est dérivable en x_0 et $f(x_0)\neq 0$ } alors la fonction f^{-1} est dérivable en $y_0=f(x_0)$ et $\left(f^{-1}\right)'\left(f(x_0)\right)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$

ou encore $\left(f^{-1}\right)'(y_0)=\dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$.

b. Applications :

$n\in\mathbb{N}^*$ et $r\in\mathbb{Q}^*$ et f est une fonction strictement positive et dérivable sur I	
$g'(x)=\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\left((x)^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$; $n\in\mathbb{N}^*$	$\left(\sqrt[n]{f(x)}\right)'=\left((f(x))^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}\times f'(x)\times(f(x))^{\frac{1}{n}-1}$
$g'(x)=\left(x^r\right)'=rx^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$	$\left(\left[f(x)\right]^r\right)'=r\times f'(x)\times\left[f(x)\right]^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$

c. Exemple :

1. Calculer la fonction dérivée f ' de f .

$f(x)=\sqrt[5]{x}$ et $f(x)=\sqrt[5]{x^2+1}$ et $f(x)=\sqrt[5]{(x^2+1)^7}$

On a :

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{x}\right]'=\left[x^{\frac{1}{5}}\right]'=\frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}-1}=\frac{1}{5}x^{\frac{-4}{5}}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{\sqrt[5]{x^4}}$.
- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{(x^2+1)}\right]'=\left[(x^2+1)^{\frac{1}{5}}\right]'=\frac{1}{5}(x^2+1)'(x^2+1)^{\frac{1}{5}-1}=\frac{14}{7}x(x^2+1)^{\frac{4}{5}}=\frac{14}{7}x\sqrt[5]{(x^2+1)^4}$.
- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{(x^2+1)^7}\right]'=\left[(x^2+1)^{\frac{7}{5}}\right]'=\frac{7}{5}(x^2+1)'(x^2+1)^{\frac{7}{5}-1}=\frac{14}{7}x(x^2+1)^{\frac{2}{5}}=\frac{14}{7}x\sqrt[5]{(x^2+1)^2}$

VI. Tableau des fonctions dérivées des fonctions usuelles :

La fonction f	D_f Domaine de définition de f	La fonction dérivée f '	$D_{f'}$ Domaine de définition de f '
$f(x)=a$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=0$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=1$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x^n$; $n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{Z}^*\setminus\{1\}$; $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$
$f(x)=\sqrt{x}$	$D_f=[0,+\infty[$	$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_{f'}=]0,+\infty[$
$f(x)=\frac{1}{x}$	$D_f=\mathbb{R}^*$	$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$
$f(x)=\sin x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=\cos x$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=\cos x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=-\sin x$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=\tan x$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi;k\in\mathbb{Z}$	$f'(x)=1+\tan^2 x$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$
$f(x)=\sqrt{g(x)}$	$x\in D_g / g(x)\geq 0$	$f'(x)=\frac{g'(x)}{2\times\sqrt{g(x)}}$	$x\in D_{g'} / g(x)>0$
$f(x)=a$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=0$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=1$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}$ $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{Z}^*\setminus\{1\}$; $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$

VI. Applications de la fonction dérivée première :

Remarque :

- dans le reste de ce chapitre f est une fonction numérique de la variable réelle x .
- (C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

A. La monotonie d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée :

a. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle I .

- **Si la fonction dérivée f ' est strictement positive sur I alors la fonction f est strictement croissante sur I .**
  (même si f ' s'annule en un points fini de I ne change pas la monotonie de f)
- **Si la fonction dérivée f ' est strictement négative sur I alors la fonction f est strictement décroissante sur I .**
  (même si f ' s'annule en un points fini de I ne change pas la monotonie de f)
- **Si la fonction f ' est nulle sur I (sur I tout entier) alors f est constante .**

b. Exemple :

Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ avec $f(x)=(2x+4)^2$.

- **On calcule : f ' .**

$$f'(x)=\left[(2x+4)^2\right]'$$
$$=2(2x+4)'(2x+4)=2\times 2(2x+4)=8x+16$$

- **Signe de f ' :**

On a $f'(x)\geq 0 \Leftrightarrow 8x+16\geq 0$

$\Leftrightarrow x\geq -2$

Donc : f ' est positive sur $[-2,+\infty[$ **et négative sur** $]-\infty,-2]$.

- **Tableau de variation de f :**

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
f '		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$f(-2)=0$	$\nearrow$	$+\infty$

B. Extremums d'une fonction dérivable :

a. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert I , a est un élément de I .

Si f est dérivable au point a et admet un extremum au point a alors $f'(a)=0$.

Remarque : Si $f'(a)=0$ **ne signifie pas que** $f(a)$ **est un extremum de la fonction f .**

b. Exemple :

$f(x)=2x^3$ **on a** $f'(x)=6x^2$ **d'où** $f'(0)=0$ **mais** $f(0)$ **n' est pas un extremum de la fonction f .**

La fonction $f(x)=2x^3$



Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

c. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert I , a est un élément de I .
Si f ' s'annule au point a et f ' change de signe au voisinage de a alors $f(a)$
est un extremum de la fonction f

VII. Applications de la fonction dérivée deuxième :

A. Position relative de la tangente et la courbe – la concavité :

a. Propriété et définition :

f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .
$\forall x \in I : f''(x) > 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- **La courbe (C_f) de f est située au dessus des tangentes des points x tel que $x \in I$.**

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est convexe (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés positives . on note ∪

$\forall x \in I : f''(x) < 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- **La courbe (C_f) de f est située au dessous des tangentes des $x \in I$.**

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est concave (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés négatives . on note ∩ .

b. Exemple :

Exemple 1 :

La figure ci-contre représente la courbe d'une fonction f .

- **Sur l'intervalle $]1,+\infty[$: la courbe (C_f) de f est convexe .**

(ou sa concavité est dans le sens des ordonnés positives) .

- **Sur l'intervalle $]-\infty,1[$: la courbe (C_f) de f est concave .**

(ou sa concavité est dans le sens des ordonnés négatives) .



Exemple 2 :

Le tableau ci-contre représente le signe de la fonction dérivée seconde de f et la concavité de la courbe (C_f) de f

x	$-\infty$	-5	-1		2	$+\infty$
$f''(x)$	−	0	+	−	0	+
Concavité de (C_f)	∩	∪	∩		∪	

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

B. Points d'inflexions :

a. Propriété et définition :

f est une fonction dérivable deux fois sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

Si la fonction dérivée seconde f'' s'annule en x_0 et f'' change de signe au voisinage de x_0 alors le point d'abscisse $A\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ est un point d' inflexion au courbe $\left(C_f\right)$; dans ce cas la tangente au point $A\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ coupe (ou traverse) la courbe.

b. Exemple :

Exemple 1 :

- Soit la fonction f définie par : $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
- $\left(C_f\right)$ est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.



Exemple 2 :

Le tableau suivant représente le signe de la fonction dérivée seconde de f et la concavité de la courbe $\left(C_f\right)$ de f

x	$-\infty$	-5	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0 $+$		$-$ 0	$-$
Concavité de $\left(C_f\right)$	∩	∪	∩		∩

- Le point d'abscisse $x_0=-5$ est un point d'inflexion au courbe $\left(C_f\right)$ de f car $f''(-5)=0$ et f'' change de signe au voisinage de $x_0=-5$.
- Le point d'abscisse $x_1=2$ n'est pas un point d'inflexion au courbe $\left(C_f\right)$ de f car f'' change de signe au voisinage de $x_1=2$

VIII. Centre de symétrie – axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

A. Centre de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. Propriété :

Soit $\left(C_f\right)$ la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.

Le point $I(a,b)$ est centre de symétrie au courbe $\left(C_f\right)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x)+f(x)=2b \end{cases}$

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

b. **Exemple :**



B. axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. **Propriété :**

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

La droite d'équation $D: x = a$ est axe de symétrie au courbe (C_f) $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x) = f(x) \end{cases}$

b. **Exemple :**



IX. Branches infinies d'une fonction :

A. Branches infinies :

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si au moins une des coordonnées d'un point M de la courbe de (C_f) tend vers l'infinie on dit que la courbe (C_f) admet une branche infinie .

B. Asymptote verticale :

a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\pm\infty$ et $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\pm\infty$ alors la droite d'équation $x=a$ est une asymptote verticale à (C_f) (à droite de a ou à gauche de a) .

b. Exemple :

Exemple : asymptote verticale d'équation $x=1$.



C. Asymptote horizontale

a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $([a,+\infty[\subset D_f$ ou $]-\infty,a[\subset D_f)$ dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ (ou $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=c$) alors la droite d'équation $y=b$ (ou $y=c$)est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).

b. Exemple :

Asymptote horizontale d'équation $y=2$ au voisinage de $\pm\infty$.



Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

D. Asymptote oblique :

a. Définition :

- Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $([a,+\infty[\subset D_f$ ou $]-\infty,a[\subset D_f)$ dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.
- $a \in \mathbb{R}^*$ ($a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$) et $b \in \mathbb{R}$

Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)-(ax+b)=0$ alors la droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$.

b. Exemple :

Soit $f(x)=x+3-\dfrac{(x+7)}{(x-1)}$.



(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation $y=x+3$ voisinage de $\pm\infty$

c. Propriété :

Si la droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$, donc pour déterminer a et b on calcule les limites suivantes :

- Pour déterminer a on calcule : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ (c.à.d. $a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$) , donc on a deux cas particulières .
- Pour déterminer a on calcule : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x)-ax) = b \in \mathbb{R}$ (c.à.d. $b \neq \pm\infty$) . donc on a la troisième cas particulière .
- Les cas particulières
  - 1ère cas particulière : $a=\pm\infty$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des ordonnés .
  - 2ième cas particulière : $a=0$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des abscisses .
  - 3ième cas particulière : $b=\pm\infty$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) la droite d'équation $y=ax$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



cas particulier 2 : $a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

Exemple $f(x) = \sqrt{x}$



cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnés

Exemple $f(x) = x^3$



X. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .(complément)

a. Définition :

f est une fonction dérivable au point a

- La fonction u tel que : $u : x \to f(a) + (x-a)f'(a)$ (ou encore $(x - a = h)$; $v : h \to f(a) + hf'(a)$) est appelée la fonction affine tangente à la fonction f au point a.
- Quand x est très proche de a le nombre $f(a) + (x-a)f'(a)$ est une approximation affine de $f(x)$ au voisinage de a on écrit : $f(x) \approx f(a) + (x-a)f'(a)$.
- Ou encore le nombre $f(a) + hf'(a)$ est approximation affine de $f(a+h)$ au voisinage de zéro on écrit $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ avec $x - a = h$.

C. Exemple :

❖ **Exemple 1 :**

1. Trouver une approximation affine du nombre $f(1+h)$ avec $f(x) = x^2$ et $a = 1$.

Correction :

f est une fonction dérivable au point 1 avec $f'(1) = 2$ approximation affine de $f(1+h)$ est :

$f(1+h) \approx hf'(1) + f(1) \approx 2h + 1$.

Conclusion : $f(1+h) = (1+h)^2 \approx 2h + 1$.

Application du résultat :

On prend $h = 0,001$ d'où : $f(1,001) = f(1+0,001) \approx 2 \times 0,001 + 1$ donc $f(1+0,001) \approx 1,002$.

On vérifie : $f(1,001) = (1,001)^2 = 1,002001$ donc $1,002 \approx 1,002001$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

Technique de calcule : $(1+h)^2$ **avec** h **très proche de zéro on calcule** $2h+1$.

❖ **Exemple 2 :**

1. **Trouver une approximation affine du nombre** $\sqrt{9,002}$.

Correction :

On pose $f(x)=\sqrt{x}$ **et** $a=9$ **et** $h=0,002$ **d'où** $\sqrt{9,002}=f(9+0,002)$.

On calcule le nombre dérivé de f **en 9 on a :**

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(9+h)-f(9)}{h}=\lim_{x\to 9}\frac{f(x)-f(9)}{x-9}=\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}=\lim_{x\to 9}\frac{\cancel{\sqrt{x}-3}}{\cancel{(\sqrt{x}-3)}(\sqrt{x}+3)}=\lim_{x\to 9}\frac{\cancel{1}}{(\sqrt{x}+3)}=\frac{1}{6}\in\mathbb{R}$$

D'où : f est dérivable au point 9 et le nombre dérivée en 9 est $f'(9)=\frac{1}{6}$.

On trouve une approximation affine du nombre $\sqrt{9,002}$.

On a : $f(a+h)\approx f(a)+hf'(a)$ **d'où** $f(9+0,002)\approx f(9)+0,002\times f'(9)$.

Donc : $f(9+0,002)\approx\sqrt{9}+0,002\times\frac{1}{6}$ **par suite** $f(9+0,002)\approx 3,000333333$.

On remarque que $\sqrt{9,002}\approx 3,000333333$ **la calculatrice donne :** $\sqrt{9,002}\approx 3,000333315$ **d'où la précision est** 3×10^{-8} .

I. Remarque :

- **Pour la fonction :** $f(x)=x^2$ **et** $a=1$ **on a :** $f(1+h)=(1+h)^2\approx 1+2h$.
- **Pour la fonction :** $f(x)=x^3$ **et** $a=1$ **on a :** $f(1+h)=(1+h)^3\approx 1+3h$.
- **Pour la fonction :** $f(x)=\sqrt{x}$ **et** $a=1$ **on a :** $f(1+h)=\sqrt{1+h}\approx 1+\frac{h}{2}$.
- **Pour la fonction :** $f(x)=\frac{1}{x}$ **et** $a=1$ **on a :** $f(1+h)=\frac{1}{1+h}\approx 1-h$.

XI. Résumer des branches infinies :

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع
Lien du site : https://benmoussamath1.jimdo.com/ Pro. Benmoussa Med

Les branches infinies

Asymptote horizontale

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = a$

(C_f) admet une asymptote horizontale c'est la droite d'équation $y = a$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple : asymptote horizontale d'équation $y = 2$ au voisinage de $\pm\infty$



$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) - (ax+b) = 0$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$

(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation y=ax+b voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + 3 - \dfrac{(x+7)}{(x-1)}$



Rq : position relative de (C_f) et (D) on étudie le signe de $f(x) - (ax+b)$

Asymptote oblique et les trois cas particuliers

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



cas particulier 2 : $a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

Exemple $f(x) = \sqrt{x}$



les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

Asymptote verticale

$\lim\limits_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$

(C_f) admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x = a$

Exemple : asymptote verticale d'équation $x = 1$



$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$

cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnés

Exemple $f(x) = x^3$



Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع