

**Définition**







$f$  est une fonction continue sur  $[ab]$  tel que  $F$  est une fonction primitive de  $f$  sur  $[ab]$  c.à.d.  $F' = f$   
 Le nombre  $F(b) - F(a)$  est appelé intégral de  $f$  de  $a$  à  $b$  on note :  
 $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b$  on lit intégral de  $a$  à  $b$  de  $f(x)dx$ .

**Propriétés ( le programme considère seulement les fonctions continues )**

Linéarité	$\int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$	$\int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx ; \alpha \in \mathbb{R}$
Relation de Chasles - $f$ est continue	$\int_a^a f(x)dx = 0$	$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$
	$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ à condition $c \in [ab]$	
	$f$ est dérivable sur $[ab]$ et $f'$ continue sur $[ab]$ on a : $\int_a^b f'(x)dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$	
	$\int_a^b cdx = [cx]_a^b = c(b-a)$ avec $c \in \mathbb{R}$ .	
Intégral et l'ordre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\forall x \in [ab], f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0</math> ; (à condition que <math>a \leq b</math>) .</li> <li>• <math>\forall x \in [ab], f(x) \leq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq 0</math> ; (à condition que <math>a \leq b</math>) .</li> <li>• <math>\forall x \in [a,b] ; f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx</math> .</li> <li>• <math>\left  \int_a^b f(x)dx \right  \leq \int_a^b  f(x) dx</math> . avec <math>a \leq b</math>.</li> <li>• <math>\forall x \in [a,b] : m \leq f(x) \leq M \Rightarrow (b-a)m \leq \int_a^b f(x)dx \leq (b-a)M</math></li> <li>• D'où : <math>m \leq \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx \leq M (a \neq b)</math> .</li> </ul>	
La valeur moyenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il existe au moins un <math>c \in [ab]</math> avec <math>a &lt; b</math> tel que <math>(b-a) \times f(c) = \int_a^b f(x)dx</math> .</li> <li>• Le nombre <math>f(c) = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x)dx</math> s'appelle la valeur moyenne de <math>f</math> sur <math>[ab]</math></li> </ul>	
intégration par parties	<p>u et v sont deux fonctions dérivables sur <math>[ab]</math> leurs dérivées <math>u'</math> et <math>v'</math> sont continues sur <math>[ab]</math> on a</p> $\int_a^b u(x) \times v'(x)dx = \underbrace{[u(x) \times v(x)]_a^b}_{(1)} - \underbrace{\int_a^b u'(x) \times v(x)dx}_{(3)}$	méthode ou bien disposition $u(x) = \dots \quad u'(x) = \dots$ $(1) \downarrow \quad (2) \searrow \quad - \quad \downarrow (3)$ $v'(x) = \dots \quad v(x) = \dots$

### Applications sur les intégrales calculs des surfaces

- Le plan ( $P$ )** est rapporté à un repère orthogonal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On pose  $\vec{OI} = \vec{i}$  et  $\vec{OJ} = \vec{j}$  et le point K tel que OIKJ est parallélogramme. On considère la surface du parallélogramme OIKJ comme unité d'aire (du la surface) cette aire on la note 1 u.a
- $f$  est une fonction continue sur  $[ab]$  et  $(C_f)$  la courbe de  $f$ .
  - $(F)$  est la partie du plan  $(P)$  compris entre la courbe  $(C_f)$  et l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x=a$  et  $x=b$ . On désigne par A la surface de la partie  $(F)$  du plan  $(P)$ .
  - **Remarque :** la surface A se calcule par l'intégral  $\int_a^b f(x)dx$  et dépend du signe de  $f(x)$

<b>Propriété</b>	<p><b>La surface de <math>(F)</math> est <math>A = \int_a^b  f(x)  dx \times \ i\  \times \ j\ </math> (u.a)</b></p>		
<b>Les cas possibles</b>	<p><b>La fonction <math>f</math> est positive sur <math>[ab]</math>.</b> ( c'est-à-dire <math>(C_f)</math> au dessus de l'axe des abscisses )</p>  <p><b>La surface est :</b> <math>A = \int_a^b f(x) dx \times \ i\  \times \ j\ </math> u.a</p>	<p><b>La fonction <math>f</math> est négative sur <math>[ab]</math>.</b> ( c'est-à-dire <math>(C_f)</math> au dessous de l'axe des abscisses )</p>  <p><b>La surface est :</b> <math>A = - \int_a^b f(x) dx \times \ i\  \times \ j\ </math> u.a</p>	<p><b>La fonction <math>f</math> est change de signe sur <math>[ab]</math>.</b> ( c'est-à-dire <math>(C_f)</math> au dessous et au dessus de l'axe des abscisses )</p>  <p><b>La surface est :</b> <math>A = \int_a^b  f(x)  dx \times \ i\  \times \ j\ </math> u.a <math>= \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx</math> (u.a)</p>
<b>Remarque :</b> $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ $\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$	<p><b><math>f</math> est une fonction paire sur <math>[-a,a]</math> et positive sur <math>[0,a]</math>.</b></p>  <p><b>On a:</b> <math>\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx</math> u.a</p> <p><b>Remarque :</b> <math>\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx</math></p>	<p><b><math>f</math> est une fonction impaire sur <math>[-a,a]</math> et positive sur <math>[0,a]</math>.</b></p>  <p><b>On a :</b> <math>\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx</math> u.a</p> <p><b>Remarque :</b> <math>\int_{-a}^a f(x) dx = 0</math></p>	<p><b>domaine du plan comprise entre les deux courbes <math>(C_f)</math> et <math>(C_g)</math></b></p>  <p><b>On considère</b> <math>\mathcal{A}</math> <b>La surface du domaine du plan comprise entre les deux courbes <math>(C_f)</math> et <math>(C_g)</math> et les droites d'équations <math>x=a</math> et <math>x=b</math>.</b> La surface est : <math>A = \int_a^b  f(x) - g(x)  dx \times \ i\  \times \ j\ </math> u.a</p>

L'espace est muni d'un repère orthogonal  $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .  $(C_f)$  la courbe d'une fonction continue sur  $[ab]$  avec  $(a < b)$ . on suppose que  $(C_f)$  tourne au tour de l'axe des abscisse de  $360^\circ$  le solide de révolution obtenu à pour volume :

$$V = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx \times \|i\| \times \|j\| \times \|k\| \text{ (unité de volume)}$$
