Groupe Scolaire Anisse	مراقبة مستمرة الأسدس الثاني 2011 - 05 - 04	السنة 2 من سلك البكالوريا شعبتي العلوم الاقتصادية مادة: الرياضيات - المعامل 4 مدة الإنجاز: ساعتان

التمرين الأول: أسئلة مستقلة — 4ن

① حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $(e^x-3)(\ln x-2)=0$ — 0,5

② باستعمال مكاملة بالأجزاء، احسب التكامل: $I=\int_1^e x\ln x\,dx$ — 1

③ A و B حدثان من Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية بحيث: $p(A)=0,2$ و $p(B)=0,6$

أ- احسب احتمال الحدث (A أو B) علما أن الحدثين A و B غير متنافيين — 0,5

ب- احسب احتمال الحدث (A و B) علما أن الحدثين A و B مستقلان. — 0,5

④ E و F حدثان من Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية بحيث:

$p(E)=\frac{1}{2}$ و $p(F)=\frac{1}{3}$ و $p(E\cup F)=\frac{2}{3}$

أ- احسب $p(E\cap F)$ و $p_E(F)$ — 1

ب- هل الحدثان E و F مستقلان. — 0,5

التمرين الثاني: — 6ن

يحتوي صندوق على ست كرات بيضاء وأربع كرات سوداء، لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس.

نسحب عشوائيا وتآنيا ثلاث كرات من هذا الصندوق.

1) احسب احتمال كل حدث من الأحداث التالية:

A « الحصول على ثلاث كرات لها نفس اللون » — 1

B « الحصول على كرتين من لون وكرة من لون آخر » — 1

C « الحصول على الأقل على كرة واحدة بيضاء » — 1

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات البيضاء المسحوبة من الصندوق.

أ- بين أن القيم التي يمكن أن يأخذها X هي 0 ; 1 ; 2 ; 3 - — 0,5

ب- حدد قانون احتمال X. — 2

ج- احسب الأمل الرياضي لـ X. — 0,5

التمرين الثالث:

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي $g(x)=e^x-1-x$

1) أ- احسب $\lim_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim_{x\to+\infty} g(x)$ — 1

ب- ضع جدول تغيرات الدالة g — 1

2) بين أن: $(\forall x\in\mathbb{R})\quad g(x)\geq 0$ — 0,5

II) لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي

$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{xe^x}{e^x-1} & ; x\neq 0 \\ f(0)=1. \end{cases}$$

وليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في م م م $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- بين أن الدالة f متصلة في الصفر (نذكر أن $\lim_{t\to 0}\frac{e^t}{t-1}=1$) — 1

ب- تحقق أن $\lim_{x\to-\infty} f(x)=0$ وأول مبيانيا هذه النتيجة. — 1

2) أ- تحقق أن لكل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x)=\dfrac{x}{1-1/e^x}$ ثم احسب $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ — 1

ب- بين أن لكل x من $\mathbb{R}^*$ $f(x)-x=\dfrac{1}{\frac{e^x}{x}-\frac{1}{x}}$ ثم استنتج أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$. — 1

3) أ- بين أن لكل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{e^x g(x)}{(e^x-1)^2}$ — 1

ب- استنتج أن الدالة f تزايدية على $\mathbb{R}$ ثم ضع جدول تغيراتها. — 1

ج- نقبل أن: $f'(0)=\frac{1}{2}$، اكتب معادلة المماس (T) في النقطة التي أفصولها 0. — 0,5

د- أنشئ المنحنى (C). — 1

Talamidi.ma : دروس وتمارين وفروض مراقبة مستوى 2 باك علوم