

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions f , g et h dont on donne le tableau de variation ci-dessous, indiquer le nombre de solutions de l'équation proposée, en précisant pour chacune d'elles un intervalle auquel elle appartient.

1. $f(x) = -2$

x	$-\infty$	-4	-3	$+\infty$
f	$+\infty$	0	-5	$-\infty$

2. $g(x) = 0$

x	$-\infty$	-4	2	5	$+\infty$
g	$-\infty$	-2	-3	4	$-\infty$

3. $h(x) = 3$

x	$-\infty$	-4	3	5	$+\infty$
h	3	$-\infty$	$+\infty$	-5	$-\infty$

Exercice 2 :

Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$g(x) = x^3 - 3x^2 - 1$$

- Dresser le tableau de variation de g .
- Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ a une solution unique α et vérifier que $\alpha \in]3,10 ; 3,11[$
- Déterminer le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

Exercice 3 :

On considère la fonction h définie par :

$$h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x.$$

- Dresser le tableau de variation de h .
- Pour k réel donné, étudier le nombre de solutions dans \mathbb{R} de l'équation : $h(x) = k$.
- Démontrer que l'équation $h(x) = 8$ a une solution unique α . Donner un encadrement de α à 10^{-2} près.

Exercice 4 :

f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{x} + x.$$

- Donner le sens de variation de f sur $[0 ; +\infty[$, et dresser le tableau de variation de f .
- Calculer $f(3)$ et $f(4)$. En déduire que l'équation $f(x) = 5$ admet une seule solution α . Encadrer α par deux entiers consécutifs.

- Avec la calculatrice, déterminer un encadrement de α , d'amplitude 10^{-1} .

Exercice 5 : Deux méthodes de résolution

f est la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = x^3 - 30x^2 + 112.$$

Il s'agit d'étudier le signe de $f(x)$ sur \mathbb{R} .

Première partie

- Calculer $f'(x)$; étudier son signe et dresser le tableau de variation de f
- Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ a trois solutions.
- Avec la calculatrice, donner l'arrondi au dixième ou la valeur exacte de chaque solution.
- En déduire le signe de f .

Deuxième partie

- Calculer $f(2)$
- Trouver trois réels a , b et c tels que pour tout réel x : $f(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$.
- Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- En déduire le signe de $f(x)$.

Exercice 6 :

- Soit g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 - 1200x - 100$$

- Déterminer la limite de g en $+\infty$.

Etudier le sens de variation de g et dresser son tableau de variation.

- Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[20 ; 40]$.
- En déduire le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

- Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + 50 + \frac{1200x + 50}{x^2}.$$

On appelle C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$

On prendra 1cm pour 5 en abscisse et 1 cm pour 20 en ordonnée.

- Déterminer la limite de f en 0 et en $+\infty$.
- Démontrer que :

$$\text{Pour tout } x \text{ de }]0 ; +\infty[, \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

où g est la fonction définie en 1).

- Etudier les variations de f .
- Démontrer que la droite D d'équation $y = x + 50$ est asymptote à C .
- Construire C et D sur le même graphique.
- Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 130$ et donner les valeurs approchées de chacune des solutions à l'unité près.