

### Exercice 1 :

Dans un pays, il y a 2 % de la population contaminée par un virus.

#### Partie A

On dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes :

- La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99 (sensibilité du test).
- La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97 (spécificité du test).

On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population.

On note :

$V$  l'événement « la personne est contaminée par le virus »

$T$  l'événement « le test est positif ».

$\bar{V}$  et  $\bar{T}$  désignent respectivement les événements contraires de  $V$  et  $T$ .

- 1) a) Préciser les valeurs des probabilités  $p(V)$ ,  $p_V(T)$ ,

Traduire la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.

b) En déduire la probabilité de l'événement  $V \cap T$ .

- 2) Démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,0492.

- 3) a) Justifier par un calcul la phrase :

« Si le test est positif, il n'y a qu'environ 40 % de chances que la personne soit contaminée ».

b) Déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée par le virus sachant que son test est négatif.

#### Partie B

On choisit successivement 10 personnes de la population au hasard, on considère que les tirages sont indépendants.

On appelle  $X$  la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes contaminées par le virus parmi ces 10 personnes.

- 1) Justifier que  $X$  suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

- 2) Calculer la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes contaminées parmi les 10.

### Exercice 2 :

Une usine produit des sacs. Chaque sac fabriqué peut présenter deux défauts : le défaut A et le défaut B. Un sac est dit défectueux s'il présente au moins l'un des deux défauts.

- 1) Dans cette question, les probabilités demandées seront données avec leurs valeurs décimales exactes.

On prélève au hasard dans la production d'une journée.

On note A l'événement « le sac présente le défaut A » et B l'événement « le sac présente le défaut B ».

Les probabilités des événements A et B sont respectivement  $p(A) = 0,02$  et  $p(B) = 0,01$ ;

On suppose que ces deux événements sont indépendants.

- a) Calculer la probabilité de l'événement C « le sac prélevé présente le défaut A et le

défaut B ».

- b) Calculer la probabilité de l'événement D « le sac est défectueux ».
  - c) Calculer la probabilité de l'événement E « le sac ne présente aucun défaut ».
  - d) Sachant que le sac présente le défaut A, quelle est la probabilité qu'il présente aussi le défaut B?
- 2) On suppose que la probabilité (arrondie au centième) qu'un sac soit défectueux est égale à 0,03.

On prélève au hasard un échantillon de 100 sacs dans la production d'une journée. La production est suffisamment importante pour que l'on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 100 sacs.

On considère la variable aléatoire  $X$  qui, à tout prélèvement de 100 sacs, associe le nombre de sacs défectueux.

- a) Justifier que la variable aléatoire  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- b) Quelle est la probabilité de l'événement « au moins un des sacs est défectueux » ? On arrondira cette probabilité au centième. Interpréter ce résultat.
- c) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire  $X$ . Interpréter ce résultat dans le cadre de l'énoncé.