

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2019 - الموضوع -		المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه
1	***** RS24 *****		
5	مدة الانجاز	الرياضيات	المادة
♦♦	المعامل	شعبة العلوم الرياضية : (أ) و (ب)	الشعبة أو المسلك

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من أربعة تمارين مستقلة فيما بينها.
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين 1 يتعلق بالأعداد العقدية.....(3.5 ن)
- التمرين 2 يتعلق بالاحتمالات.....(3 ن)
- التمرين 3 يتعلق بالبنىات الجبرية.....(3.5 ن)
- التمرين 4 يتعلق بالتحليل.....(10 ن)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيفما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين 1: (3.5 نقطة)

ليكن α عددا عقديا غير منعدم.

I- نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $z^2 - i\alpha\sqrt{3}z - \alpha^2 = 0$: (E_α)

0.25 1- أ) تحقق أن مميز المعادلة (E_α) هو: $\Delta = \alpha^2$

0.5 ب) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E_α)

0.5 2- علما أن $\alpha = |\alpha|e^{i\lambda}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$)، اكتب حلي المعادلة (E_α) على الشكل الأسّي.

II- نفترض أن المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط M_1 و M_2

و ذات الألفاق على التوالي α و $z_1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$ و $z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\alpha$ و ليكن R الدوران الذي مركزه O

و زاويته $\frac{\pi}{3}$.

0.5 1- أ) بين أن $R(M_1) = M_2$ و $R(\Omega) = M_1$

0.25 ب) استنتج أن المثلثين OM_1M_2 و $O\Omega M_1$ متساويا الأضلاع.

0.25 2- أ) تحقق أن: $z_1 - z_2 = \alpha$

0.5 ب) بين أن المستقيمين (ΩM_2) و (OM_1) متعامدان.

0.25 ج) استنتج أن $O\Omega M_1 M_2$ معين.

0.5 3- بين أن لكل عدد حقيقي θ ، العدد $Z = \frac{z_2 - \alpha}{z_1 - \alpha} \div \frac{z_2 - |\alpha|e^{i\theta}}{z_1 - |\alpha|e^{i\theta}}$ حقيقي.

التمرين 2: (3 نقط)

يحتوي كيس على n كرة مرقمة من 1 إلى n ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$). نسحب، الواحدة تلو الأخرى و بدون إحلال،

جميع الكرات من هذا الكيس. لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس.

1 1- ما هو احتمال الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 بالتتابع و في هذا الترتيب؟

1 2- ما هو احتمال الحصول على الكرات 1 و 2 و 3 في هذا الترتيب (سواء كانت متتابعة أم غير متتابعة)؟

1 3- نعتبر المتغير العشوائي X_n الذي يساوي العدد الضروري من السحبات للحصول على الكرات 1 و 2 و 3.

حدد قانون احتمال المتغير X_n .

التمرين 3: (3.5 نقطة)

نعتبر الفضاء المتجهي $(V_2, +, \cdot)$ الذي بعده 2.

ليكن $(\vec{i}, \vec{j})$ أساسا للفضاء V_2 . نضع: $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$ و $\vec{e}_2 = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

ليكن * قانون التركيب الداخلي المعرف في V_2 بما يلي:

$$\forall (x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4 \quad (x\vec{i} + y\vec{j}) * (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = (xx' + yy')\vec{i} + (xy' + yx')\vec{j}$$

0.25 1- أ) بين أن $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ أساس للفضاء V_2

0.25 ب) تحقق أن: $\vec{e}_1 * \vec{e}_1 = \vec{e}_1$ و $\vec{e}_1 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2$ و $\vec{e}_2 * \vec{e}_2 = \vec{e}_2$ و $\vec{e}_2 * \vec{e}_1 = \vec{0}$

0.25 ج) بين أن: $\forall (X, X', Y, Y') \in \mathbb{R}^4 \quad (X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2) * (X'\vec{e}_1 + Y'\vec{e}_2) = XX'\vec{e}_1 + YY'\vec{e}_2$

0.25 2- أ) بين أن القانون * تبادلي.

0.25 ب) بين أن القانون * تجميعي.

0.25 ج) بين أن القانون * يقبل عنصرا محايدا.

0.25 د) بين أن $(V_2, +, *)$ حلقة تبادلية واحدة.

3- ليكن $\vec{u} \in V_2 - \{\vec{0}\}$. نعتبر: $E_{\vec{u}} = \{\lambda\vec{u} / \lambda \in \mathbb{R}\}$

0.25 أ) بين أن $(E_{\vec{u}}, +)$ زمرة جزئية للزمرة $(V_2, +)$

0.25 ب) بين أن $(E_{\vec{u}}, +, \cdot)$ فضاء متجهي جزئي للفضاء $(V_2, +, \cdot)$

0.5 ج) بين أن: $E_{\vec{u}}$ مستقر بالنسبة للقانون * $\Leftrightarrow$ الأسرة $(\vec{u} * \vec{u}, \vec{u})$ مقيدة.

4- نفترض أن: $\vec{u} * \vec{u} = \alpha\vec{u}$; $(\exists \alpha \in \mathbb{R}^*)$. نعتبر التطبيق $\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow E_{\vec{u}}$

$$x \mapsto \frac{x}{\alpha}\vec{u}$$

0.5 أ) بين أن φ تشاكل تقابلي من $(\mathbb{R}^*, \times)$ نحو $(E_{\vec{u}}, *)$

0.25 ب) بين أن $(E_{\vec{u}}, +, *)$ جسم تبادلي.

التمرين 4: (10 نقط)

الجزء I : نعتبر الدالة g المعرفة على $I =]-1, +\infty[$ بما يلي: $g(x) = 1 + x^2 - 2x(1+x)\ln(1+x)$

0.25 1- أ) بين أن: $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 2$

0.5 ب) بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

2- بين أن g قابلة للاشتقاق على I ، و أن: $(\forall x \in I) \quad g'(x) = -2(1+2x)\ln(1+x)$ 0.5

3- نعطى جدول تغيرات الدالة g :

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$	
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	2	$\frac{5}{4}-\frac{\ln 2}{2}$	1	$-\infty$	

(أ) بين أنه يوجد عدد حقيقي موجب قطعاً وحيد α بحيث: $g(\alpha) = 0$ 0.5

(ب) تحقق أن: $\alpha < 1$ (نأخذ: $\ln 2 = 0.7$) 0.25

(ج) استنتج أن: $0 < g(x)$ و $(\forall x \in]-1, \alpha[)$ و أن: $g(x) < 0$: $(\forall x \in]\alpha, +\infty[)$ 0.5

الجزء II : نعتبر الدالة f المعرفة على $I =]-1, +\infty[$ بما يلي: $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها. 0.5

(ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها. 0.5

2- (أ) بين أن f قابلة للاشتقاق على I و أن $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)(1+x^2)^2}$ $(\forall x \in I)$ 0.75

(ب) اعط جدول تغيرات الدالة f على I 0.5

(ج) تحقق أن: $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ و أن: $f(x) \leq \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ $(\forall x \in I)$ 0.75

3- (أ) حدد معادلة المماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات الأفصول 0. 0.25

(ب) بين أن: $\ln(1+x) < x$ $(\forall x > 0)$ 0.5

(ج) استنتج أن: $f(x) < x$ $(\forall x > 0)$ 0.25

(د) مثل مبيانيا (T) و (C) . (نأخذ: $\alpha = 0.8$ و $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$) 1

الجزء III : نضع $J = \int_0^1 f(x) dx$

1 - أ) باستعمال تغيير المتغير: $t = \frac{1-x}{1+x}$ ، بين أن: $J = \frac{\pi}{8} \ln 2$

0.5 ب) حدد، بالسنتيمر مربع، مساحة الحيز المستوي المحصور بين المنحنى (C) و المستقيمت (T) و

$x=1$ و $x=0$

1 2- باستعمال طريقة المكاملة بالأجزاء، احسب: $K = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x} dx$

انتهى