

حساب الاحتمالات

I- التجارب العشوائية

1- تقديم يوجد نوع من الأحداث تقع دائمًا بنفس الطريقة، فمثلاً إذا أطلقنا شيئاً ذا وزن من يدنا نعلم مسبقاً أنه سوف يسقط على الأرض ، إن دراسة هذا النوع من الأحداث بعد إيجاد المعادلات وقوانينها ومعطياتها الأولية المنظمة لها يمكن أن تتوقع نتيجتها النهائية .
لكن هناك نوع آخر من الأحداث التي تنتج عن نفس المعطيات ومع ذلك لا يمكن أن تتوقع نتيجتها ، فمثلاً إذا رمينا نرداً على طاولة مستوية لا يمكن أن نعلم مسبقاً الرقم الذي سيعينه النرد عندما يستقر، رغم إن المعطيات لا تتغير في كل محاولة.
إن هذه التجارب تسمى تجارب عشوائية أو اختبارات عشوائية .
إن التفكير في تجربة عشوائية ما معناه جرد جميع الإمكانيات أي جميع النتائج المحتملة وترتيبها حسب درجة احتمال وقوعها.

2- أمثلة

* "رمي النرد في الهواء" تجربة عشوائية. هناك 6 نتائج ممكنة
* "سحب ثلاثة كرات من كيس يحتوي على 7 كرات" تجربة عشوائية .

هناك - C_7^3 نتيجة ممكنة إذا كان السحب تأنيا .

- A_7^3 نتيجة ممكنة إذا كان السحب بالتتابع وبدون إحلال.

- 7^3 نتيجة ممكنة إذا كان السحب بالتتابع وإحلال.

* "رمي قطعة نقود مرتين" تجربة عشوائية مكونة من اختبارين عشوائيين.

مجموعة النتائج الممكنة $\{FF; FP; PF; PP\}$

3- مصطلحات

a- الإمكانية - كون الإمكانيات

كل نتيجة من بين النتائج الممكنة لتجربة عشوائية تسمى إمكانية .

مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية تسمى كون الإمكانيات ونرمز له بـ Ω

أمثلة * $\Omega = \{F; P\}$ كون الإمكانيات المرتبط بالتجربة "رمي قطعة النقود مرة واحدة".

* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ كون الإمكانيات المرتبط بالتجربة "رمي النرد مرة واحدة".

b- الحدث

كل جزء من المجموعة Ω كون الإمكانيات يسمى حدثاً .

أمثلة * $A = \{PP; FF\}$ هو حدث من التجربة "رمي قطعة النقود مرتين متتاليتين "

* {1} هو حدث من التجربة "رمي النرد مرة واحدة"

* يعتبر التجربة العشوائية "رمي النرد مرة واحدة"

$B = \{2; 4; 6\}$ الحصول على عدد زوجي " هو حدث في هذه التجربة

c- تحقق أو وقوع حدث

إذا قمنا بتجربة وكانت النتيجة تنتمي إلى الحدث A فإننا نقول إن الحدث A قد تحقق.

فمثلاً إذا رمينا نرداً وحصلنا على أحد الأعداد 2 أو 4 أو 6 فإننا نقول إن الحدث B " الحصول على عدد زوجي " قد تحقق.

d- تتحقق الحدثان $A \cup B$ و $A \cap B$

إذا تحققا الحدث A والحدث B في نفس الوقت فإننا نقول إن الحدث $A \cap B$ قد تحقق.

إذا تحققا الحدث A أو الحدث B أوهما معاً فإننا نقول إن الحدث $A \cup B$ قد تحقق.

e- مثال

التجربة "رمي النرد مرة واحدة "

نعتبر الحدثين A " الحصول على عدد قابلة للقسمة على 3 " و B " الحصول على عدد زوجي "

إذا رميينا النرد وحصلنا على 6 فإننا نقول إن الحدث $A \cap B$ قد تحقق

إذا رميينا النرد وحصلنا مثلاً على أحد الأعداد 2 , 4 , 3 , 6 فإننا نقول إن الحدث $A \cup B$ قد تتحقق

f- أحاديث خاصة

ليكن Ω كون الإمكانيات

أ- الحدث الأكيد

$\Omega \subseteq \Omega$ وبما أن نتيجة التجربة تنتمي دائمًا إلى كون الإمكانيات أي أن Ω حدث يتحقق دائمًا فإن Ω يسمى الحدث الأكيد.

ب- الحدث المستحيل

$\Omega \subseteq \Omega$ وبما أن \emptyset لا يحتوي على أي نتيجة، أي \emptyset لا يتحقق أبداً فـ \emptyset يسمى الحدث المستحيل.

ج- الحدث الابتدائي الحدث الابتدائي هو حدث يحتوي على إمكانية واحدة.

حدث ابتدائي في التجربة "رمي قطعة نقود مرتين" $\{pp\}$

f- انسجام حديثين

نقول إن الحديثين A و B غير منسجمين إذا و فقط $A \cap B = \emptyset$

مثال

"رمي قطعة النقود ثلاث مرات متتالية"

$C = \{FPF; PFF; FFP\} \quad B = \{FPP; PPF; PPP\} \quad A = \{FFF; PPP\}$ نعتبر الأحداث

$A \cap B = \emptyset$ A و B غير منسجمين لأن

$B \cap C = \{PFF\}$ B ومنه B و C منسجمان

g- الحدث المضاد ليكن Ω كون الإمكانيات

نقول إن الحديثين A و B متصادان إذا و فقط إذا كان $A \cap B = \emptyset$ و $A \cup B = \Omega$

نكتب $\bar{B} = A$ أو $\bar{A} = B$

أمثلة

* نعتبر التجربة "رمي النرد مرة واحدة" و نسجل رقم وجهه الأعلى.

كون الإمكانيات $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

نعتبر الأحداث $\{3; 5\}$ B و $\{1; 2; 4; 6\}$ A "عدد مضاعف ل 6" و C "عدد فردي"

و E "عدد زوجي" و F "عدد أكبر قطعاً من 6"

$\bar{C} = E$ لدينا $\bar{A} = B$ A $\cup B = \Omega$ و منه A

D = {6} حدث ابتدائي.

$A \cap C \neq \emptyset$ و منه A و C حدثان منسجمان.

$E \cap B = \emptyset$ و منه E و B غير منسجمين.

F حدث مستحيل.

** نعتبر كيس يحتوي على على 2 كرات بيضاء و 4 كرات حمراء . "نسحب من الصندوق تأنيا 3 كرات "

A "الحصول على كرة واحدة بيضاء فقط" B "الحصول على كرة واحدة حمراء فقط"

C "الحصول على 3 كرات بيضاء" D "الحصول على كرتين حمراوبيتين على الأقل"

كون الإمكانيات Ω يضم جميع الإمكانيات و عددها C_6^3

عدد إمكانيات الحدث A هو $C_2^1 C_4^2$

عدد إمكانيات الحدث D هو $C_4^3 + C_2^1 C_4^2$

A و B غير منسجمين لأن لا يمكن أن نحصل على كرة واحدة حمراء فقط و كرة واحدة بيضاء فقط

(لا يمكن أن يتتحقق معاً في نفس الوقت $\bar{D} = \bar{B}$)

II- الفضاءات الاحتمالية المنتهية

1- أنشطة

نعتبر نرداً أوجهه تحمل الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

نرمي النرد و نسجل الرقم المحصل عليه عندما يستقر .

نعتبر الأحداث A "الحصول على عدد زوجي" B "الحصول على مضاعف ل 3"

C "الحصول على مضاعف ل 7"

1- حدد A و B بتفصيل . ما هو الحدث الذي له أكبر حظ أن يتتحقق؟

2- ما هي نسبة احتمال الحصول على 1 أي تحقيق الحدث {1}؟

3- ما هي نسبة احتمال الحصول على A ثم على B ثم على C؟

لتكن $\Omega = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ مجموعة منتهية

إذا ربطنا كل عنصر a_i من Ω بعدد p_i ينتمي إلى $[0;1]$ و كان مجموع جميع الأعداد هو 1 فإننا نقول إننا عرفنا احتمالا p على Ω .

نقول إن احتمال الحدث الابتدائي $\{a_i\}$ هو العدد p_i نكتب $p(\{a_i\}) = p_i$ يسمى الروج $(\Omega; p)$ يسمى فضاء احتماليا منتهيا

b- احتمال حدث

تعريف

احتمال حدث A هو مجموع احتمالات الأحداث الابتدائية التي توجد ضمن A نرمز له ب $p(A)$

ملاحظة * كل احتمال على Ω هو تطبيق من مجموع الأحداث $P(\Omega)$ نحو $[0;1]$

$$p(\Omega) = 1 \quad p(\emptyset) = 0 \quad *$$

مثال نرمي قطعة نقود مرتين متتاليتين

ما هو احتمال الحصول على الوجه مررتين

ما هو احتمال الحصول على الحدث A "ظهور الوجه على الأكثر مرة"

$$p(\{FF\}) = \frac{1}{4} \quad \Omega = \{FF; FP; PF; PP\}$$

$$p(A) = p(\{PF\}) + p(\{FP\}) + p(\{PP\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad A = \{PP; PF; FP\}$$

تمرين

نعتبر نردا مغشوشا بحيث احتمال ظهور العدد 2 هو ثلاثة مرات احتمال ظهور العدد 1 ، وأن الأعداد 3 و 4 و 5 لها نفس احتمال الظهور . نرمي النرد مرة واحدة.

-1- احسب احتمال كل حدث ابتدائي في هذه التجربة .

-2- أحسب احتمال الحدث A " الحصول على عدد زوجي "

تمرين

يحتوي صندوق على كرتين حمراوبيتين مرقمتين بـ 1 و 2 على التوالي و 3 كرات خضراء مرقمة بـ 1 و 2 و 3 على التوالي . نسحب تانيا كرتين من الصندوق

-1- حدد كون الإمكانيات .

-2- أحسب كل حدث ابتدائي .

-3- أحسب احتمال الحصول على الحدث A " الحصول على كرة حمراء واحدة فقط "

-4- أحسب احتمال الحصول على الحدث B " الحصول على كرتين مجموع رقميهما 4 "

3- احتمال اتحاد و تقاطع حدثين

a- احتمال اتحاد حدثين غير منسجمين

ليكن A و B حدثين غير منسجمين

$$A \cup B = \{a_1; a_2; \dots; a_n; b_1; b_2; \dots; b_m\} \quad B = \{b_1; b_2; \dots; b_m\} \quad A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$$

$$p(A \cup B) = \sum_{i=1}^n p(\{a_i\}) + \sum_{i=1}^m p(\{b_i\}) = p(A) + p(B)$$

خاصية

لكل حدثين غير منسجمين A و B


b- احتمال الحدث المضاد

$$A \cup \bar{A} = \Omega \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$p(A \cup \bar{A}) = p(A) + p(\bar{A}) \Leftrightarrow p(\Omega) = p(A) + p(\bar{A}) \Leftrightarrow 1 = p(A) + p(\bar{A})$$

خاصية

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) \quad \text{لكل حدث A من } \Omega$$



$B - A = \{x \in B / x \notin A\}$	ليكن Ω و حدثين من Ω
$A \cap (B - A) = \emptyset$	لدينا $A \cup B = A \cup (B - A)$
$p(A \cup B) = p(A) + p(B - A)$ ومنه	
$(A \cap B) \cap (B - A) = \emptyset$	و لدينا $B = (A \cap B) \cup (B - A)$
$p(B) = p(A \cap B) + p(B - A)$ و منه	
$p(B - A) = p(B) - p(A \cap B)$ أي	
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ ادن	

خاصية

$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ كل حدثين A و B من كون الإمكانيات من Ω

- فرضية تساوي الاحتمالات

لدينا E تذكير الرمز $cardE$ يقرأ رئيسياً E و هو عدد عناصر المجموعة

خاصية

إذا كانت جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمال فان احتمال كل حدث A هو $p(A) = \frac{cardA}{card\Omega}$ حيث Ω كون الإمكانيات.

البرهان ليكن $\Omega = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ حدث حيث $cardA = k$ $card\Omega = n$

بما أن جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمالات فان $p(\{a_i\}) = \frac{1}{n}$ $\forall i \quad 1 \leq i \leq n$

وبما أن $p(A)$ تساوي مجموع احتمالات الأحداث الابتدائية التي ضمن A و عددها k فان

$$p(A) = k \times \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{cardA}{card\Omega}$$

ملاحظة

إن فرضية تساوي احتمالات الأحداث الابتدائية يمكن أن تذكر صراحة في نص التمارين كما يمكن أن تفهم من خلال شروط التجربة .

تمرين

يحتوي صندوق على 4 كرات بيضاء و 5 حمراء و 6 صفراء . نسحب ثلات كرات من الصندوق

نعتبر الأحداث A " الحصول على ثلاثة كرات صفراء "

" الحصول على ثلاثة كرات لها نفس اللون "

" الحصول على ثلاثة كرات مختلفة اللون "

" الحصول على الأقل على كرة صفراء "

-1 أحسب احتمال كل حدث من الأحداث A و B و C و D إذا كان السحب تانياً .

-2 نفس السؤال إذا كان السحب بالتتابع و بدون إحلال.

-3 نفس السؤال إذا كان السحب بالتتابع و بإحلال.

الحل

-1 ليكن Ω كون الإمكانيات $card\Omega = C_{15}^3 = 455$

$$p(B) = \frac{34}{455} \quad cardB = C_6^3 + C_5^3 + C_4^3 = 34 \quad p(A) = \frac{20}{455} = \frac{4}{99} \quad cardA = C_6^3 = 20$$

هو الحدث المضاد ل B $p(C) = 1 - p(B) = 1 - \frac{34}{455}$ C

ليكن F " الحصول على ثلاثة كرات لا تضم أي كرة صفراء "

$$p(F) = \frac{84}{455} \quad cardF = C_9^3 = 84$$

$$p(D) = 1 - p(F) = 1 - \frac{84}{455}$$

حدث مضاد للحدث D

تمرين

ليكن A و B حدثين من فضاء احتمالي حيث

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$$

$$p(\bar{A} \cup \bar{B}) \quad p(A \cup B)$$

تمرين

نعتبر نرداً أوجهه الستة مرقمة من 1 إلى 6، نرمي النرد ثلاط مرات متتالية فنحصل على عدد مكون من ثلاثة أرقام.

أحسب احتمال الأحداث A الحصول على عدد رقم مئاته هو 2

B الحصول على عدد مكون من أرقام مزدوجة

C الحصول على عدد مكون من أرقام مختلفة مثنى مثنى

III- الاحتمال الشرطي

1- الاحتمال الشرطي

a- أنشطة

تضم إحدى الشانويات 500 تلميذ موزعين حسب الجدول التالي :

المجموع	ع تجريبية	الأدب	الشعبية	
			الجنس	الشعبة
260	120	140	إناث	
240	180	60	ذكور	
500	300	200	المجموع	

نختار عشوائياً تلميذاً من بين 500 تلميذ

1- أحسب احتمال الأحداث التالية

" اختيار ذكر " F " اختيار أنثى " E " اختيار فرد من ع تجريبية " G

" اختيار تلميذ ذكر من ع تجريبية " $G \cap E$

2- إذا كان تلميذ ذكراً فما هو احتمال لكي يكون من شعبة ع تجريبية ؟

الحل

$$p(G \cap E) = \frac{180}{500} \quad p(L) = \frac{200}{500} \quad p(E) = \frac{300}{500} \quad p(F) = \frac{260}{500} \quad p(G) = \frac{204}{500} \quad \text{card } \Omega = 500 \quad -1$$

إذا كان تلميذ ذكراً فاحتمال لكي يكون من شعبة ع تجريبية هو $\frac{180}{240}$

لأنه يوجد 180 تلميذ ذكر في ع تجريبية من بين 240 ذكر.

$p(E/G) = \frac{180}{240}$ هو احتمال الحصول على تلميذ من ع تجريبية علماً أنه ذكر نرمز له بـ $p_G(E)$ أو p_G

يقرأ احتمال الحدث E علماً أن الحدث محققاً نكتب $p_G(E) = \frac{180}{240}$

$$p_G(E) = \frac{\text{card}(G \cap E)}{\text{card}(G)} = \frac{\frac{\text{card}(G \cap E)}{\text{card}(\Omega)}}{\frac{\text{card}(G)}{\text{card}(\Omega)}} = \frac{p(G \cap E)}{p(G)} \quad \text{لدينا} \quad \text{ملاحظة}$$

b- تعريف

ليكن A و B حدثين من فضاء احتمالي منته حيث

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma :

$$p_A(B) = p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

احتمال الحدث B علماً أن الحدث A محققاً هو

$$p_A(B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)}$$

ملاحظة إذا كان لجميع الأحداث الابتدائية نفس الاحتمال فان

٥- صيغة الاحتمالات المركبة خاصة

إذا كان A و B حدثان احتمالهما غير منعدمين فان

تمرین

يحتوي كيس على 5 كرات سوداء مرقمة بـ 1, 1, 1, 1, 2 وثلاث كرات بيضاء مرقمة بـ 1, 2, 1 .
نسحب بالتتابع وبدون إحلال كرتين
أحسب احتمال الحدثين I " الحصول على كرتين سوداويتين مجموع رقميهما 2 "
J " الحصول على كرتين سوداويتين علماً أن مجموع رقميهما 2 "

الحل

$$\text{ليكن } \Omega \text{ كون الإمكانيات} \quad \text{card}\Omega = A_8^2$$

* لكي تكون الكرتين سوداويتين مجموعهما 2 يجب أن نسحب من 4 كرات سوداء تحمل الرقم 1

$$p(I) = \frac{A_4^2}{A_8^2} \quad \text{card}I = A_4^2$$

* نعتبر A " الحصول على كرتين سوداويتين " B " الحصول على كرتين مجموعهما 2 "

$$p(J) = p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(I)}{p(B)} = \frac{\frac{A_4^2}{A_8^2}}{\frac{A_6^2}{A_8^2}} = \frac{A_4^2}{A_6^2} \quad \text{card}B = A_6^2 \quad \text{card}A = A_5^2$$

$$p(J) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}B} = \frac{A_4^2}{A_6^2}$$

طريقة ثانية بما أن الأحداث الابتدائية لها نفس الاحتمالات فان

٢- الاحتمالات الكلية ٤- تجزئ مجموع تعريف

نقول إن الأحداث $A_1; A_2; \dots; A_n$ تجزئاً للفضاء Ω اذا تحقق الشرطان التاليان :

$$\forall (i, j) \quad i \neq j \quad 1 \leq i \leq n \quad 1 \leq j \leq n \quad A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$$

٦- خاصية الاحتمالات الكلية خاصية

ليكن $A_1; A_2; \dots; A_n$ تجزئنا للفضاء Ω . نعتبر B حدثاً من Ω

$$p(B) = p(A_1)p_{A_1}(B) + p(A_2)p_{A_2}(B) + \dots + p(A_n)p_{A_n}(B)$$

البرهان


$B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$
بما أن $(A_n \cap B); \dots; (A_2 \cap B); (A_1 \cap B)$ غير منسجمة مثنى مثنى فان

غير منسجمة مثنى مثنى. ومنه

$$p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + \dots + p(B \cap A_n)$$

$$p(B) = p(A_1)p_{A_1}(B) + p(A_2)p_{A_2}(B) + \dots + p(A_n)p_{A_n}(B)$$

تمرین نعتبر ثلاث صناديق . يحتوي الصندوق الأول على 4 كرات بيضاء وكرة سوداء والصندوق الثاني على كرتين بيضاوين و كرتين سوداويتين والصندوق الثالث على 3 كرات بيضاء وكرة سوداء .
نختار عشوائياً صندوقاً من بين الصناديق الثلاث ثم نسحب منه كرة واحدة .



نعتبر الأحداث C_i " اختيار الصندوق i $B \quad 1 \leq i \leq 3$ " سحب كرة بيضاء " لدينا C_1 و C_2 و C_3 غير منسجمة مثنى مثنى . و اتحادهم هو Ω ومنه C_1 و C_2 و C_3 تكون تجزيئا لـ Ω

$$p(C_1) = p(C_2) = p(C_3) = \frac{1}{3} \quad \text{بما أن للصناديق نفس الاحتمال فان}$$

احتمال الحصول على كرة بيضاء من صندوق C_1 هي $p_{C_1}(B) = \frac{4}{5}$

احتمال الحصول على كرة بيضاء من صندوق C_2 هي $p_{C_2}(B) = \frac{2}{4}$


احتمال الحصول على كرة بيضاء من صندوق C_3 هي $p_{C_3}(B) = \frac{3}{4}$

بما أن C_1 و C_2 و C_3 تجزيئا كلها لـ Ω فان حسب خاصية الاحتمالات الكلية

$$p(B) = p(C_1)p_{C_1}(B) + p(C_2)p_{C_2}(B) + p(C_3)p_{C_3}(B)$$

$$p(B) = \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{41}{60}$$

ملاحظة يمكن تلخيص جميع نتائج تجربة في هذه الشجرة



$$p_{C_3}(B) = \frac{3}{4} \quad p_{C_1}(B) = \frac{4}{5} \quad \text{مثلا}$$

$$p(N) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{19}{60} \quad \text{من خلال الشجرة نستنتج}$$

تمرين ينتج معمل مصابيح كهربائية بواسطة ثلاثة آلات A و B و C بحيث

الآلة A تضمن 20% من الإنتاج و 5% من المصابيح المصنوعة غير صالحة

الآلة B تضمن 30% الإنتاج و 4% من المصابيح المصنوعة غير صالحة

الآلة C تضمن 50% من الإنتاج و 1% من المصابيح المصنوعة غير صالحة

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

نختار عشوائيا مصباحا كهربائيا .

1- مَا هـ و احتمـال

-a لكي يكون المصباح غير صالح و مصنوع بـ A

-b لكي يكون المصباح غير صالح و مصنوع بـ B

-c لكي يكون المصباح غير صالح و مصنوع بـ C

2- استنتج الاحتمال لكي يكون المصباح غير صالح

(لاحظ أن $\frac{20}{100} = 20\%$ هو الاحتمال لكي يكون المصباح مصنوعا بـ A و 5% هو الاحتمال لكي يكون

المصباح غير صالح علما أنه مصنوعا بـ A)

3- أحسب احتمال لكي يكون المصباح مصنوعا بـ A علما أنه غير صالح .

الحل

-a-1 " مصنوع بـ A " I " غير صالح " A

$$p(A \cap I) = p(A)p_A(I) = \frac{20}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{1}{10}$$

$$p(B \cap I) = p(B)p_I(B) = \frac{30}{100} \times \frac{4}{100} = \frac{12}{1000} \quad -b " مصنوع بـ B "$$

$$p(C \cap I) = p(C)p_I(C) = \frac{50}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{5}{1000} \quad -c " مصنوع بـ C "$$

$$p(I) = p(A)p_A(I) + p(B)p_B(I) + p(C)p_C(I) = \dots \quad -d$$

$$p_I(A) = \frac{p(A \cap I)}{p(I)} \quad -2$$

IV- الاستقلالية

1- الأحداث المستقلة

نشاط يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و كرتين خضراوبيتين . نسحب بالتناوب كرتين من الكيس

نعتبر الحدين R_1 " الكرة الأولى حمراء " R_2 " الكرة الثانية حمراء "

أحسب $p_{R_1}(R_2)$ ثمقارنهما في الحالتين التاليتين

-1 السحب بإحلال

-2 السحب بدون إحلال

$$p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p(R_2) \quad \text{نقول إن } R_1 \text{ و } R_2 \text{ مستقلان .} \quad -1$$

$$p_{R_1}(R_2) \neq p(R_2) \quad \text{نقول إن } R_1 \text{ و } R_2 \text{ غير مستقلين .} \quad -2$$

تعريف

نقول إن الحدين A و B مستقلان إذا و فقط إذا كان $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

تمرين نرمي نردا مرتين متتاليتين . نعتبر الأحداث A " الحصول على العدد في الرمية الأولى "

B " الحصول على عددين مجموعهما 7 " C " الحصول على عددين زوجيين "

هل A و B مستقلان ؟ هل A و C مستقلان ؟

2- استقلالية الاختبارات العشوائية

نعلم أن بعض التجارب العشوائية تتكون من اختبار واحد أو عدة اختبارات عشوائية فمثلا

أ- "رمي قطعة النقود n مرة متتالية " تجربة عشوائية تتكون من n اختبار "رمي قطعة النقود"

ب- "رمي النرد n مرة متتالية " تجربة عشوائية تتكون من n اختبار "رمي النرد "

ت- "سحب n كررة من بين m كررة بالتتابع وإحلال " تجربة عشوائية تتكون من n اختبار "سحب كررة"

ث- "سحب n كررة من بين m كررة بالتتابع وبدون إحلال " تجربة عشوائية تتكون من n اختبار "سحب كررة"

نلاحظ أنه في بعض التجارب لا تؤثر نتائج اختبار على اختبار الموالي مثلا كتجارب الأمثلة أ- ب - ث


و أنه في بعض التجارب تؤثر نتائج اختبار على اختبار الموالي مثلا - ث .

إذا كانت نتائج اختبار ما لا تؤثر على الاختبار الموالي نقول إن التجربة تتكون من اختبارات عشوائية مستقلة

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

حالة خاصة (الاختبارات المتكررة)

مثال 1 نرمي قطعة نقود ثلاث مرات متتالية . أحسب احتمال الحدث A " ظهور الوجه F مرتين بالضبط "



$$A = \{FFP; FPF; PFF\}$$

$$p(A) = p(FFP) + p(FPF) + p(PFF)$$

$$p(A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

مثال 2

نرمي نردا خمس مرات متتالية . لنحسب احتمال الحصول على رقم قابل للقسمة على 3 ثلاث مرات بالضبط .

ت تكون هذه التجربة من تكرار الاختيار "رمي النرد" خمس مرات .

في هذا الاختبار نعتبر الحدث A " الحصول على رقم قابل للقسمة على 3"

$$A = \{3; 6\} \quad p(A) = \frac{1}{3}$$

عندما نرمي النرد اما نحصل على الحدث A و اما على الحدث \bar{A} و هكذا يمكن أن نمثل هذه التجربة كما يلي :



حيث تشغّل الخانات الخامسة بـ A أو \bar{A} .

نعتبر B " الحصول على رقم قابل للقسمة على 3 ثلاث مرات " النتائج التي تنتهي إلى B هي النتائج الذي يحتل فيها الحدث A ثلاث مرات من بين 5 أمكنة . و منه عدد النتائج التي تنتهي إلى B هي C_5^3 .

وبما أن احتمال كل نتائج تنتهي إلى B هو $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ لأن

$$p(\bar{A}) = \frac{2}{3} \quad p(B) = C_5^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = C_5^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{5-3}$$

خاصية

ليكن A حدثا احتماليه p في اختبار عشوائي .

ادا أعيد هذا الاختبار n مره فان احتمال وقوع الحدث A k مره بالضبط

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

تمرين الاحتمال لكي يصيّب رام الهدف هو $\frac{2}{3}$ ، قام الرامي بعشر محاولات .

تمرين ما هو الاحتمال لكي يصيّب الهدف 6 مرات بالضبط ؟
يحتوي كيس على 5 كرات بيضاء و 12 كرة سوداء و 3 كرات حمراء
نسحب 8 كرات بالتتابع و باحلال .
أحسب احتمال الحصول على 6 كرات بيضاء بالضبط .