

الكيمياء (7 نقاط)

- 1- اختيار طريقة التتبع.
- 1-1- هذا التحول الكيميائي يمكن تتبعه بواسطة تقنية قياس الطيف الضوئي.
التحول الكيميائي يستهلك وينتج انواع كيميائية ملونة و بالتالي يمكن تتبعه بتقنية الطيف الضوئي
- 1-2- هذه التقنية يمكن وصفها بأنها "تقنية غير مدمرة" لأن نقوم بإجراء القياسات دون تغيير محتوايا الخليط المتفاعل
- 2- التتبع الزمني للتحول : تتبع الايونات المتبقية من تаниي كرومات $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (aq) بالوسط
- 2-1- التتبع الزمني للتحول : تتبع الايونات المتبقية من تانيي كرومات $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (aq) بالوسط
- 2-2- الجدول الوصفي للتحول.

Équation		$3 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{aq}) + 2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 16\text{H}^+(\text{aq}) = 3 \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + 4 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 11 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$					
État initial	x = 0	n_1	n_2	excès	0	0	excès
État intermédiaire	x	$n_1 - 3x$	$n_2 - 2x$	excès	3x	4x	excès

2- اعتمادا على الجدول الوصفي العلاقة بين: تقدم التفاعل (t) x و تركيز ايونات تانيي كرومات $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ في الخليط في لحظة t ، حجم الخليط المتفاعل V و كمية المادة n₂
 $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = n_2 - 2x$, donc $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{n_2 - 2x}{V}$

3-2- نبين أن العلاقة بين الامتصاصية A و تقدم التفاعل في لحظة t تكتب على شكل: $x(t) = [10 - 4.A(t)].10^{-5}$

$$A = 150 [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}], \text{ donc } A = 150 \times \frac{n_2 - 2x}{V}$$

$$n_2 - 2x = \frac{V}{150} \cdot A \quad \text{donc} \quad x = \frac{n_2}{2} - \frac{V}{300} \cdot A$$

$$\frac{n_2}{2} = \frac{c \cdot V_1}{2} = \frac{2,0 \times 10^{-2} \times 10,0 \times 10^{-3}}{2} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol} = 10 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\frac{V}{300} = \frac{12 \times 10^{-3}}{300} = 4,0 \times 10^{-5} \text{ mol} \quad \text{Finalement, } x = (10 - 4,0A) \times 10^{-5}$$

4- لحساب التقدم الأقصى x_m .

عند نهاية التحول. ($x = x_{\max}$, $A = A_{\infty}$) مبيانا

$$x_{\max} = (10 - 4,0A_{\infty}) \times 10^{-5} = (10 - 4,0 \times 2,39) \times 10^{-5}$$

$$x_{\max} = 4,4 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

باعتبار تانيي كرومات $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ متفاعلا محد نجد ان $x_{\max} = n_2/2 = 1,10^{-4} \text{ mol}$ و تختلف القيمة المحصل عليها تجربيا و منه نستنتج أن المتفاعل المحد الايثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

5-2- السائق لم يخرق القانون.

$$\text{الكحول متفاعلا محد } 0 = n_0 - 3x_{\max} = 0$$

$$n_0 = 3x_{\max} = 3 \times 4,4 \times 10^{-6} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$m_0 = n_0 \times M(\text{éthanol}) \quad V = 2 \text{mL} \quad \text{في حجم}$$

$$m_1 = m_0 \times \frac{1,0}{2,0 \times 10^{-3}} = n_0 \times M(\text{éthanol}) \times 500 = 1,3 \times 10^{-5} \times 46 \times 500 \quad V = 1 \text{L} \quad \text{في حجم}$$

$$m_1 = 0,30 \text{ g}$$

هذه القيمة اصغر القيمة 0,5g و بالتالي السائق لم يخرق القانون

3- السرعة الحجمية للتفاعل

3-1- نعم ان $v = -\frac{4 \cdot 10^{-5}}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$. فيصبح تعريف السرعة الحجمية للتتحول: $v = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{dA}{dt}$

3-2- قيمة السرعة الحجمية عند $t=0$,

$$v = -\frac{4 \cdot 10^{-5}}{12,10^{-3}} \cdot \frac{2,50 - 2,38}{0 - 2,5} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L.min} = 2,67 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L.s}$$

تنخفض سرعة التحول مع الزمن وذاك راجع الى انخفاض تركيز المتفاعلات مع الزمن.


3-3- عند $t_{1/2}$ فان $x(t_{1/2})/10^{-5} - 10 = 4.A(t_{1/2})$ و منه

$$A(t_{1/2}) = -[x(t_{1/2})/10^{-5} - 10]/4 = -(2,2 \cdot 10^{-6}/10^{-5} - 10)/4 = 2,445$$

نجد ان قيمة زمن النصف $t_{1/2} = 3,75 \text{ min}$


تمرين 1 (5 نقط)

- 1- الموجة فوق الصوتية : موجة ميكانيكية طولية تنتشر في الاوساط المادية الصلبة و السائلة و الغازية تنتشر عن طريق انصهار - تمدد طبقات وسط الانتشار
- 2- الدور $T=1/N=1,2 \cdot 10^{-5} \text{ s}$: طول الموجة $\lambda=v/N=18,07 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- 3- $K=3000$ عدد الأدوار الذي تحتوي عليه هذه الدفعه.
- II تحديد عمق البحر و مكان تواجد المجموعة السمكية.
- 4- ماذا تمثل كل اشارة على الرسم التذبذبي



- 5- التأثير الزمني بين لحظة انبعاث الاشارة ولحظة التقاط الاشارة المنعكسة من المجموعة السمكية ، $\Delta t = 3,50 = 150 \text{ ms}$ المسافة h بين الباخرة ومكان تواجد المجموعة السمكية $h=v \cdot \Delta t = 1500 \cdot 150 \cdot 10^{-3} / 2 = 112,5 \text{ m}$ و منه
- 6- حدد التأثير الزمني بين لحظة انبعاث الاشارة ولحظة التقاط الاشارة المنعكسة من عمق البحر. $\Delta t = 8,50 = 400 \text{ ms}$ عمق البحر. $V = H / \Delta t \cdot H2$ و منه

تمرين 2 (7 نقط)



- 2-1 الضوء الأحادي اللون ضوء لا يتبدل بعد اجتيازه للموشور
- 3-1 الظاهرة التي تبرزها هذه الصورة هي ظاهرة الحيود الشروط الضرورية لتحصل ظاهرة الحيود ان يكون عرض الشق (أو السلك) محصورا بين 10λ و 100λ
- 4-1 تعبير الفرق الزاوي $\theta = \lambda/a$ و a هو :
- 5-1 عندما تكون θ صغيرة تعبير $\theta = \lambda/D$ و λ عرض البقعة المركزية على الشاشة.
- 6-1 قطر الخيط إذا علمت أن $d = \lambda \cdot 2 \cdot D / L = 80 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ $\lambda = 4,7 \text{ cm}$ $L = \text{م}$ $\theta = \lambda / a$
- 7-1 نعلم ان $\theta = \lambda / a$ و بما ان $\theta = L / 2 \cdot D$ و $\lambda = \text{م}$ (rouge) $> \lambda = \text{م}$ (bleu) اذن $L' > L$ اذن $L' = \lambda / 2 \cdot D > L = \lambda / 2 \cdot D$ ومنه نستنتج ان $L' > L$
- 1-2 الظاهرة المحدثة من طرف الموشور في هذه الحالة هي ظاهرة انحراف الشعاع الضوئي
- 2-2 زاوية الورود i . نعلم ان $D = i + i' = 57,78 + 60 - 67,78 = 50^\circ$ و منه $i = (D + A) - i' = 57,78 + 60 - 67,78 = 50^\circ$
- 3-2 بين أن: $n \cdot \sin(r) = \sin(i)$ ②

$$n \cdot \sin(A - r) = n \cdot [\sin(A) \cdot \cos(r) - \cos(A) \cdot \sin(r)] = \sin(i) \quad ① \quad \text{نجد } r' = A - r \quad \text{مع } n \cdot \sin(r') = \sin(i')$$

$$n \cdot [\sin(A) \cdot \cos(r) - \cos(A) \cdot \sin(r)] / n \cdot \sin(r) = \sin(i') / \sin(i) = 1/K \quad \text{نحصل على}$$

$$[\sin(A) / \tan(r)] - \cos(A) = 1/K$$

$$k = \frac{\sin i}{\sin r} \quad \tan r = \frac{\sin A}{\cos A + \frac{1}{k}}$$

مع

$$r' = A - r = 33,12^\circ \quad r = \arctan(\sin A / (\cos A + 1/K)) = 26,88^\circ \quad 4-2$$

$$n = \sin(i) / \sin(r) = 1,7 \quad \text{قيمة معامل الانكسار } n \text{ بالنسبة لهذا الشعاع}$$

$$n = \lambda(\text{air}) / \lambda(\text{prime}) \Leftrightarrow \lambda(\text{prime}) = \lambda(\text{air}) / n = 368,82 \text{ nm} \quad 4-2$$

الموشور وسط مبدد لأن $n = C/V$ يتغير التردد يتغير معامل الانكسار ومنه السرعة V تتغير