

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الموجات الميكانيكية المتواالية – Les ondes mécaniques progressives

1- الموجة الميكانيكية:

1-1: مفهوم التشوه:

التشوه هو تغير محلي و مؤقت لخاصية أو عدة خصائص فيزيائية لوسط معين .
ملحوظة

يسمى الموضع الذي انطلق منه التشوه بمنبع الموجة (S) . و الوسط المادي المرن الذي ينتشر فيه التشوه بوسط الانتشار .

1-2: تعريف الموجة الميكانيكية:

الموجة الميكانيكية هي انتشار التشوه في وسط مادي من يصاحبه انتقال الطاقة دون انتقال المادة التي تكون هذا الوسط

1-3: الموجة الميكانيكية المتواالية:

تكون الموجة الميكانيكية متواالية اذا كان المنبع يصدر اشارات (تشوهات) متتالية و متتابعة (منبع مصان)

1-4: الموجة المستعرضة – الموجة الطولية:

الموجة الميكانيكية المستعرضة : تهتز نقط وسط الانتشار عموديا على وسط الانتشار
الموجة الميكانيكية الطولية : تهتز نقط وسط الانتشار افقيا على وسط الانتشار

1-5: الموجات الميكانيكية الصوتية:

الصوت موجة ميكانيكية تنتشر في الاوساط المادية (السائلة ، الثلبة ز الغازية) عن طريق تمدد - انضغاط طبقات وسط الانتشار

موجات صوتية مسموعة

موجات صوتية مسموعة

موجات فوق صوتية

0Hz

20Hz

20KHz

التردد

ملحوظة خصائص انتشار موجة
انتقل الطاقة } انتشار الموجة
انتقل عدم المادة }

مثال: حدوث الزلازل يصاحب انتشار الطاقة ، يؤدي إلى كوارث.


2- الخواص العامة للموجة:

2-1: اتجاه انتشار موجة:

- الحبل أو النابض ، تنتشر الموجة فيه وفق اتجاه واحد .
- سطح الماء ، تنتشر الموجة فيه ، في جميع اتجاهات مستوى السطح .
- الفضاء ، تنتشر الموجة فيه ، في جميع اتجاهات الفضاء .

2-2: تراكب موجتين ميكانيكيتين:

بعد تراكب موجتين فإنهم يستمران في الانتشار دون تغير في شكلهما مع احتفاظ كل واحدة بهما بخصائصها .



3- سرعة انتشار موجة:

3-1: تعريف:

نعرف سرعة انتشار موجة بالعلاقة : $v = \frac{d}{\Delta t}$. حيث d المسافة التي تقطعها الموجة خلال المدة الزمنية Δt .

3-2: العوامل المؤثرة على سرعة الانتشار:

توتر الحبل : T

كلما كان توتر الحبل اكبر توثر كلما كانت سرعة انتشار الموجة فيه اكبر
الكتلة الطولية m .

كلما كانت الكتلة الطولية للحبل اقل كلما كانت سرعة انتشار الموجة فيه اكبر

ملحوظة: سرعة انتشار موجة على طول حبل متجانس تعطى بالعلاقة: $v = \sqrt{\frac{T}{m}}$ حيث T : توتر الحبل و m : كتلته الطولية

* بالنسبة لوسط مادي متجانس تكون سرعة انتشار موجة مستقلة عن شكل التشوه وعن مده ، فهي تتبع بطبيعة وسط الانتشار ، خاصة من حيث مرونته و قصوره و درجة حرارته.

4- التأخير الزمني

مثال: " انتشار موجة طول حبل "


أثناء انتشار الموجة طول الحبل تعيّد النقطة 'M' نفس حركة النقطة M

بتأخير زمني τ :

التأخير او التخلف الزمني لحركة نقطة 'M' بالنسبة للنقطة M . $\tau = t' - t$


التأخير او التخلف الزمني لحركة نقطة 'M' بالنسبة للنقطة M:

$$\tau = \frac{MM'}{v}$$



تمرين-1

تنتشر موجة طول حبل متجانس كتلته $m=200\text{g}$ و طوله $L=8\text{m}$ ، بسرعة ثابتة $v=2\text{m/s}$. تطلق الموجة من S طرف الحبل في لحظة نعتبرها أصلًا للتاريخ. يمثل الشكل أسفله مظهر الحبل في لحظة t .



- 1- بين أن الموجة المنتشرة مستعرضة.
- 2- أحسب اللحظة t .
- 3- حدد المدة الزمنية Δt التي تستغرقها حركة نقطة ما من الحبل.
- 4- في أي لحظة t ستصل مقدمة الموجة إلى النقطة N. استنتج "t" لحظة توقف النقطة N عن الحركة.
- 5- أوجد التأخير الزمني τ لحركة النقطة N بالنسبة لحركة النقطة S.
- 6- مثل مظهر الحبل عند لحظة $t''' = 2,5\text{s}$.
- 7- عين T توتر الحبل.