



سوق أربعاء الغرب

الفيزياء و الكيمياء 2 bac

الأستاذ : خالد المكاوي  
v : سرعة انتشار الموجة ب  $m.s^{-1}$

N : تردد الموجة ب Hz

✓ ملحوظة :

طول الموجة  $\lambda$  هو أصغر مسافة تفصل بين نقطتين تهتزان على توافق في الطور.

❖ مقارنة حركة نقطتين من وسط الانتشار :

- تهتز نقطتان على توافق في الطور إذا كانت المسافة بينها تحقق  $d = n\lambda$  مع n عدد صحيح.

- تهتز نقطتان على تعاكس في الطور إذا كانت المسافة بينها تحقق  $d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ .

### 3 – استعمال وماض لتتبع موجة : stroboscope

- الوماض : جهاز الكتروني يصدر ومضات ضوئية éclairs سريعة في مدد زمنية متتالية و متساوية  $T_e$  و يحتوي على زر يكمن من تغيير وضبط تردد الومضات  $\nu_e$ .

يستعمل هذا الجهاز لدراسة ظاهرة دورية سريعة.

نسمي تردد الوماض  $\nu_e$  عدد الومضات التي يصدرها في الثانية :  $\nu_e = \frac{1}{T_e}$

• شروط مشاهدة التوقف الظاهري :

عند تسليط ضوء الوماض على هذه دورية سريعة ترددها  $\nu$  فإنه :

- إذا كان تردد الوماض  $\nu_e$  يساوي تردد الظاهرة الدورية فإن هذه الأخيرة تبدو ظاهريا متوقفة  $\nu_e = \nu$ .

- إذا كان  $\nu_e > \nu$  : تتحرك الموجة ظاهريا ببطء في المنحى المعاكس لحركتها الحقيقية.

- إذا كان  $\nu_e < \nu$  : تتحرك الموجة ظاهريا ببطء في المنحى الحقيقي للحركة.



### III – ظاهرة الحيود :

#### 1 – شروط حيود موجة :

عند التقاء موجة متوالية جيئية بحاجز فتحة عرضها a أو بجهاز عرضه a يمكن أن يحدث تغير في بنية الموجة (شكل الموجة) إذا حقق العرض a بعض الشروط تسمى هذه الظاهرة ظاهرة الحيود.

يحدث حيود موجة واردة على مسنوى فتحة عرضها a يساوي طول الموجة الواردة أقل منها  $a \leq \lambda$ .

#### 2 – خاصيات الموجة المحيدة :



الأستاذ : خالد المكاوي

الفيزياء و الكيمياء bac 2

سوق أربعاء الغرب

- نلاحظ على مستوى الفتحة تولد موجة دائرية عن الموجة المستقيمية الواردة حيث تبدو وكأنها انبعثت من منبع وهمي يوجد في الفتحة تسمى هذه الدائرية الموجة المحيدة.

- للموجتين الواردة و المحيدة نفس التردد و نفس طول الموجة و نفس السرعة (الحيود لا يغير من خواص الموجة).

#### IV – وسط مبدد :

- إذا كانت سرعة انتشار الموجة مرتبطة بتردد الموجة نقول أن وسط الانتشار وسط مبدد لهذه الموجات.

- إذا كانت سرعة انتشار الموجة مرتبطة بوسط الانتشار فقط، فإن الوسط غير مبدد.

❖ مثال :

- عند درجة حرارة  $20^{\circ}\text{C}$  و ضغط  $1\text{atm}$  تنتشر الموجات الصوتية بسرعة ثابتة  $v = 340\text{m.s}^{-1}$  كيف ما كان تردد الموجة إذن الهواء وسط غير مبدد للموجات الصوتية.

- سطح الماء وسط مبدد بالنسبة لموجة تنتشر على سطحه لأنه عند تغيير تردد الموجة الدائرية  $N$  تتغير طول الموجة  $\lambda$  و بالتالي تتغير

$$v = \lambda \cdot N \quad \text{السرعة } v$$