


## الذرة و ميكانيك نيوتن




### 1 - حدود ميكانيك نيوتن:

القوى المدروسة على المستوى الماكروسکوپي مثل قوى التجاذب الكوني ، و قوى التأثير البيني الكهرباسکن ، هل يمكن أن تطبق كذلك على المستوى الميكروسکوپي ؟

### 1 - 1 التأثير البيني التجاذبي :

(Newton 1687) . A و B كتلتان نقطيتان تبعدان عن بعضهما بالمسافة  $d$  . كل واحدة تطبق على الأخرى قوة تجاذب ، حيث :





$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -G \frac{m_A m_B}{AB^2} \vec{u}_{AB}$$

مع  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$

### 2 - التأثير البيني الكهرباسکن :

A و B شحتنان نقطيتان ( $q_A$  و  $q_B$ ) تبعدان عن بعضهما بالمسافة  $AB = d$  . يمكن أن تكون قوتا التأثير البيني إما قوتا تجاذب ( $q_A x q_B > 0$ ) أو تنافر ( $q_A x q_B < 0$ ) ، حيث لدينا دائما :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = (q_A x q_B) \vec{u}_{AB}$$



$$k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$$

مع

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = k \frac{q_A \times q_B}{AB^2} \vec{u}_{AB}$$

\*ملحوظة : يبين تعبير كل من قوى التأثير البيني التجاذبي و قوى التأثير البيني الكهرباسکن أن قيمتها تتاسب و المقدار  $\frac{1}{d^2}$  . نقول بأنها قوى نيوتونية .

3 - تطبيق ميكانيك نيوتن على الذرة : في سنة 1911 ، و باستعمال المقارنة الشكلية بين قوى التجاذب الكوني و قوى التأثير الكهرباسکي (الكهرباسکن) ، أنجز Ernest Rutherford نموذجا كوكبيا للذرة .

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

حيث يمكن للإلكترون أن يأخذ مسارا دائريا (أو إهليجيا) حول النواة ، وبذلك فإن طاقته يمكن أن تأخذ قيمة طاقة ممكنا . وهذا غير صحيح حيث أن طاقة الذرة لا يمكن أن تأخذ إلا قيمات محددة . أي أن ميكانيك نيوتن بقى عاجزا عن تفسير مميزات الذرة .

## 2 - تغير الطاقة على المستوى الميكروسكopic :

### 1. دراسة طيف أبعاث ذرة الهيدروجين :

ت تكون ذرة الهيدروجين من بروتون واحد و إلكترون واحد ، وهي أبسط ذرة . لندرس الضوء المنبعث من مصباح للهيدروجين .



نلاحظ طيف يتكون من حزم ابعاث، فقط الحزم ذات طول موجة خاصة هي التي تبعث . في مصباح الهيدروجين ، تنتقل الطاقة الكهربائية إلى ذرات الهيدروجين ، فتصبح في حالة مثاررة أي في حالة غير مستقرة . للرجوع إلى حالتها المستقرة تبعث طاقة ضوئية . بما أن الطيف المنبعث طيفا يتكون من حزم وليس طيفا مستمرا فإن الطاقة المنبعثة لا يمكن أن تأخذ إلا قيمات محددة نقول بأن الطاقة مكمأة (quantifiée) .

## 2 - نموذج الفوتون : (photon)

في سنة 1900 وضع Max Planck فرضية أن الضوء ، كالموجات الكهرومغناطيسية ، تنقل الطاقة على شكل "حببات" تسمى quanta .

في سنة 1905 وضع Albert Einstein فرضية أن هذه الحبيبات محمولة من طرف دقائق دفائق عديمة الكتلة ، بدون شحنة ، تنتشر في الفراغ بسرعة الضوء  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  . الفوتونات دقائق موجة كهرمغناطيسية ، تردد  $\nu$  و طول موجتها في الفراغ  $\lambda$  ، تكون من فوتونات . طاقة كل فوتون تحقق العلاقة :

$$E = h\nu = \frac{h.c}{\lambda}$$

الطاقة  $E$  معبر عنها بالجول (J) ؛ التردد  $\nu$  معبر عنه بالهرتز (Hz) و طول الموجة بالمتر (m) .

الثابتة  $h$  تسمى ثابتة بلانك (Planck) :  $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

\* ملحوظة : الجول وحدة غير ملائمة لقيمة طاقة الفوتون ، نستعمل عادة الإلكترون فولط (eV) :


$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

## 3 - م الموضوعات بوهر (Bohr) :

لتفسير حزم طيف ذرة الهيدروجين وضع بوهر موضوعات (postulats) تحمل اسمه :

- تغيرات الطاقة لذرة تغيرات مكمأة .
- لا يمكن أن توجد الذرة إلا في حالات طاقية محددة . كل حالة تميز بمستوى طاقوي .
- تبعذ الذرة فوتونا تردد  $\nu$  و طاقته  $h\nu$  عندما تفقد إثارتها حيث تنتقل من مستوى طاقوي  $E_p$  إلى مستوى طاقوي  $E_n$  . لدينا :

$$E_p - E_n = h\nu$$



## 4.2 مخطط الطاقة لذرة الهيدروجين :


حسب موضوعات بوهر ، تغيرات الطاقة لذرة الهيدروجين .  
تغيرات مكماة .

باتخاذ حالة مرجعية نستنتج طاقات الحالات الأخرى .

- يمكن تمثيل مختلف مستويات الطاقة :
- يوافق المستوى الأسفل الحالة الأساسية .

- توافق المستويات الوسيطية مختلف الحالات المثاررة .


- يوافق المستوى الأعلى الحالة المرجعية حيث الإلكترون غير مرتبط بالبروتون (حالة التأين) .



## 5.2 دراسة طيف امتصاص لذرة الهيدروجين :



نلاحظ وجود حزات سوداء محل الحزات الملونة لحزاة الانبعاث . هذه الحزات توافق الاشعاعات الممتصة والتي لها نفس طول الموجة للأشعاعات المنبعثة من طرف مصباح الهيدروجين . نفس هذا يكون أن مختلف طاقة فوتونات الضوء الأبيض ، فقط الفوتونات التي لها طاقة توافق الفرق الموجود بين مستويين طاقيين للذرة هي التي تمتص .  
نستنتج أن طيف الامتصاص يبرز كذلك أن طاقة الذرة مكماة . كما يبين أن انتقال الطاقة بين الاشعاع والمادة لا يتم إلا بتبادل طاقة مكماة .




## 3. طاقة الدقائق الميكروسโคبية طاقة مكماة :

طاقة ذرة الهيدروجين طاقة مكماة . طاقة الذرات الأخرى ، الجزيئات ، النوى مكماة كذلك .

## 1.3 مستويات الطاقة للذرات :

طاقة ذرة مكماة : تغيراتها لها رتبة قدر الإلكترون فولط (eV) . كل ذرات نفس العنصر الكيميائي لها نفس الطيف المميز لهذا العنصر .


طيف امتصاص أو طيف انبعاث يمكن من الكشف عن عنصر كيميائي .  
تحليل الضوء المنبعث من النجوم مثلا ، نحدد مكوناتها الكيميائية .



### 2 . 3 مستويات الطاقة للجزيئات :

يعطي طيف الامتصاص لجزيئه معلومات عن المجموعات الوظيفية للجزيئه و نوعية الروابط التي تحتوي عليها الجزيئه . للحصول على طيف جزيئه نعرض مركبها إلى أشعة ضوئية تغير ترددتها باستمرار ، فيلاحظ أن كل امتصاص يوافقه شدة دنسه لشدة الضوء . حيث كل قمة امتصاص توافق ميزة محددة لالجزيئه .

مثلا : طيف امتصاص جزيئه هيكسان - 1 - أول . حيث أشير على محور الأفاصيل إلى عدد الموجة  $\sigma = \frac{1}{\lambda}$  مع  $\lambda$  طول الموجة .



### 3 . 3 مستويات الطاقة للنوى :

في الفيزياء النووية ، النوى المتولدة ناتجة عن تفتقن نوى مشعة ، عادة تكون في حالة مثارة . حيث تفقد إثارتها و تبعث فوتونات ذات طاقة عالية (إشعاع γ) . طاقة هذه الفوتونات تميز النوى الباعثة (النوى المتولدة) كذرات النوى لها مستويات الطاقة مكماة . طاقة نواة مكماة . تغير الطاقة في نواة لها رتبة قدر الميكا إلكترون فولط (MeV) .

