هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الإستدراكية 2010
عناصر الإجابة

الصفحة 1 / 3

المادة:	علوم الحياة والأرض	RR36	المعامل:	3
الشعب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم الرياضية (أ)		مدة الإنجاز:	2

" قبول كل إجابة صحيحة ذات صياغة لغوية سليمة بالنسبة لكل سؤال"

التمرين الأول (4 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
	التعريف: • الساكنة المثالية المتوازنة، مجموعة أفراد ينتمون إلى نفس النوع، تعيش في مجال جغرافي محدد وتتوفر فيها الخاصيات الآتية: – الساكنة مغلقة وراثيا ولا تخضع لعوامل التغير الوراثي (الهجرة، الانتقاء، الطفرة...) – ذات عدد لا متناهي من الأفراد – تتكاثر عبر التوالد الجنسي، كل أفرادها لهم نفس القدرة على التوالد وتتم التزاوجات فيها بالصدفة. – غير متراكبة.....	0.75 ن
	• قانون **Hardy-Weinberg**: في الساكنة المتوازنة يبقى تردد الحليلات والأنماط الوراثية مستقرا، ويتم تحديد تردد الأنماط الوراثية بتطبيق العلاقات: $f(AA) = p^2$ و $f(Aa) = 2pq$ و $f(aa) = q^2$	0.75 ن
	تطبيق قانون **Hardy-Weinberg** باعتبار زوج من الحليلات **A** و **a** في حالة السيادة، فإن تردد الحليلات يكون: • **في الجيل الأول** – تردد الحليل **A** هو **p**. تردد الحليل **a** هو **q**. والذي يطابق تردد الأمشاج الحاملة لهذه الحليلات مع **p+q=1**. – تردد الأنماط الوراثية: • تردد النمط الوراثي **AA** هو p^2. • تردد النمط الوراثي **Aa** هو **2pq** • تردد النمط الوراثي **aa** هو q^2 حسب قانون **Hardy-Weinberg** تبقى الترددات ثابتة من جيل لآخر.....	1 ن
	• **في الجيل الموالي** يتم التزاوج بالصدفة. يبين الجدول الآتي تردد الأنماط الوراثية المنتظرة:	

♀ γ / ♂ γ	(A) p	(a) q
(A) p	(AA) P^2	(Aa) pq
(a) q	(aA) pq	(aa) q^2

تردد الأنماط الوراثية هو:

$f(AA) = f(A) \times f(A) = p \times p = p^2$
$f(Aa) = [f(A) \times f(a)] + [f(a) \times f(A)] = pq + pq = 2pq$
$f(aa) = f(a) \times f(a) = q \times q = q^2$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

التمرين الأول (تابع)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
	تردد الحليلات هو:	
	$f(A) = f(AA) + 1/2\, f(Aa) = p^2 + 1/2\,(2pq) = p^2 + pq$	
	بما أن $(p + q = 1)$ و $(q = 1 - p)$	
	إذن $f(A) = p$	
	بالنسبة ل a نطبق نفس الاستدلال فنحصل على: $f(a) = q$	
	وبالتالي، يبقى تردد الحليلات والأنماط الوراثية في الجيل الموالي مستقرا ← استقرار البنية الوراثية للساكنة.....	1.5 ن

التمرين الثاني (4 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
1	إنجاز دورة صبغية تبرز التموضع الصحيح للإخصاب والانقسام الاختزالي مع تحديد الصيغة الصبغية لكل طور.....	1 ن
2	دورة أحادية الصيغة الصبغية.....	0.5 ن
	التعليل: اقتصار الطور ثنائي الصيغة الصبغية على البيضة. (قبول أي صيغة تبرز التعليل الصحيح).....	1 ن
3	يسمح الإخصاب بالانتقال من الطور n إلى الطور 2n، والانقسام الاختزالي من الطور 2n إلى الطور n. وهذا التعاقب يؤدي إلى ثبات عدد الصبغيات عند الطحلب المدروس.....	1.5 ن

التمرين الثالث (6 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
1	✓ اختلاف النباتات المتزاوجة بصفتين (زوجين من الحليلات): يتعلق الأمر بهجونة ثنائية.....	0.25 ن
	✓ تجانس أفراد الجيل F_1 يدل على أن الأبوين متشابهو الاقتران بالنسبة للمورثتين. الأبوان من سلالتين نقيتين. (تحقق القانون الأول لماندل Mendel).	0.25 ن
	✓ تدل المظاهر الخارجية لأفراد الجيل F_1 على أن الحليل المسؤول عن اللون الأصفر J سائد بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون الأبيض j، وأن الحليل المسؤول عن سنفات منفلقة D سائد بالنسبة للحليل المسؤول عن سنفات غير منفلقة d.....	0.25 ن
	✓ توحي النتائج بتوزيع وفق نسبة 25% لكل مظهر خارجي، نستنتج حالة مورثتين مستقلتين محمولتين على زوجين من الصبغيات المتماثلة.....	0.25 ن
	✓ **التزاوج الأول:** – المظاهر الخارجية : [J,D] × [j,d] – الأنماط الوراثية : (J//J,D//D) × (j//j,d//d) – الأمشاج : J/D/ j/d/ – النمط الوراثي لأفراد F_1 : (J//j,D//d) – المظهر الخارجي لأفراد F_1: [J,D]	1 ن
2	**التزاوج الثاني**	0.25 ن
	✓ بين أفراد F_1 ونباتات ثنائية التنحي: يتعلق الأمر بتزاوج اختباري..... – المظاهر الخارجية: [J,D] × [j,d] – الأنماط الوراثية : (J//j,D//d) × (j//j,d//d) – الأمشاج : ¼ J/D/ ¼ J/d/ ¼ j/D/ ¼ j/d/ 100% j/d/ – عند الإخصاب يتم التقاء الأمشاج بصفة عشوائية	

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

التمرين الثالث (تابع)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
	– شبكة التزاوج: ♀ γ / ♂ γ : J/ D/ | J/ d/ | j/ D/ | j/ d/ j/ d/ : J//j D//d [J,D] 25% | J//j d//d [J,d] 25% | j//j D//d [j,D] 25% | j//j d//d [j,d] 25% تطابق النتائج النظرية (في شبكة التزاوج) النتائج التجريبية المحصلة: يتعلق الأمر إذن بحالة مورثتين مستقلتين.....	1 ن 0.75 ن
3	– يتعلق الأمر بهجونة ثنائية. – عدم تجانس أفراد الجيل المحصل عليه يدل على أن النبتة كبيرة القد ذات أزهار حمراء مختلفة الإقتران (تزاوج اختباري). – نسبة المظاهر الخارجية الأبوية (80%) أكبر من نسبة المظاهر جديدة التركيب (20%). المورثتان مرتبطتان. النبتة مختلفة الاقتران تنتج أربعة أنواع من الأمشاج بنسب مختلفة..... – **التزاوج:** ▪ المظاهر الخارجية للآباء: [T,R] × [t,r] ▪ الأنماط الوراثية: (TR//tr) × (tr//tr) ▪ الأمشاج: TR/ tr/ Tr/ tR/ × tr/ 40% 40% 10% 10% 100% – شبكة التزاوج.....	1 ن 1 ن

التمرين الرابع (6 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
1	إنجاز صحيح للمضلع..... الاستنتاج: يوحي التوزيع أحادي المنوال بأن الساكنة متجانسة.....	2 ن 1 ن
2	الساكنة الأصلية P متجانسة إذن من سلالة نقية..... التعليل: الانتقاء لم يعط أي تغيير في توزيع عدد الولادات بالرغم من اختيار فئتين هامشيتين P_1 و P_2.....	1 ن 2 ن

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma