



الصفحة

1

3



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2011

الموضوع

3	المعامل	NS36	علوم الحياة والأرض	المادة
2	مادة الإنجاز		شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعب(ات) او الميداليات

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

التمرين الأول (4 نقاط)

هناك مجموعة من الأمراض الوراثية تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، من بين هذه الأمراض ما هو مرتبط بمورثات معينة، ومنها ما هو مرتبط بشذوذ صبغي. بواسطة عرض سليم ومنظما:

عرف الشذوذ الصبغي والوراثة المرتبطة بالجنس. (1 ن)

بين كيفية انتقال الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X في حالة التتحي. (1.5 ن)

بالاعتماد على حالة مرض Turner كمثال، وضح كيفية الإصابة بهذا المرض المرتبط بشذوذ صبغي

معززا ذلك برسم تخطيطي ملائم. (1.5 ن)

التمرين الثاني (6 نقاط)

تعتبر ذبابة الخل أداة تجريبية أساسية لدراسة انتقال الصفات الوراثية. للكشف عن كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية نجز عدة تزاوجات عند هذه الذبابة، نتتبع فيها انتقال صفتين وراثيتين؛ شكل الرغب وشكل الأجنحة:

- المورثة cu المسئولة عن شكل الأجنحة لها حليل: **الحليل cu**⁺ سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة عادية"، والحليل cu متح مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة معقوفة".

- المورثة sb المسئولة عن شكل الرغب لها حليل: **الحليل sb**⁺ سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "رغب قصير"، والحليل sb متح مسؤول عن المظهر الخارجي "رغب عادي".

التزاوج الأول: بين أنثى بأجنحة عادية وذكر بأجنحة عادية. أعطى هذا التزاوج جيلا مكونا من:

- 310 فردا بأجنحة عادية؛

- 101 فردا بأجنحة معقوفة.

التزاوج الثاني: بين أنثى بزغب قصير وذكر بزغب قصير. أعطى هذا التزاوج جيلا مكونا من:

- 242 فردا بزغب قصير؛

- 120 فردا بزغب عادي.

1. فسر نتائج التزاوجين الأول والثاني مستعينا بشبكة التزاوج. (2 ن)

التزاوج الثالث: بين ذكر بزغب عادي وأجنحة معقوفة، وأنثى بزغب قصير وأجنحة عادية. أعطى هذا التزاوج النتائج الآتية:

- 45,9 % فردا بزغب قصير وأجنحة عادية؛

- 45,9 % فردا بزغب عادي وأجنحة معقوفة؛

- 4,1 % فردا بزغب عادي وأجنحة عادية؛

- 4,1 % فردا بزغب قصير وأجنحة معقوفة.

2. فسر نتائج التزاوج الثالث مستعينا بشبكة التزاوج. (1.5 ن)

3. بالاعتماد على إجاباتك السابقة:
- أ. حدد النمط الوراثي لذبابة خل بمظهر خارجي زغب قصير وأجنحة معقوفة معللا إجابتك. (0.75 ن)
- ب. حدد النتيجة المتوقعة من تزاوج أنثى بزغب قصير وأجنحة معقوفة بذكر بزغب قصير وأجنحة معقوفة معللا إجابتك بشبكة التزاوج. (0.75 ن)
4. علما أن المسافة بين المورثة sb المسؤولة عن شكل الزغب ومورثة st مسؤولة عن لون العيون عند ذبابة الخل هو cMg_6 ، أنجز الخريطتين العاملية الممكنتين للمورثات الثلاث sb و cu و st . (1 ن)
(استعمل $0,5 \text{ cm} \text{ لكل } cMg$)

التمرين الثالث (5 نقط)

قصد تحسين الإنتاج على مستوى تربية الماشي قام تقي زراعي بتتبع زيادة وزن 100 فرد عند جماعتين مختلفتين من الماشية P_1 و P_2 ، وذلك خلال نفس المدة. يمثل الجدول الآتي النتائج الإحصائية المحصلة: (ملحوظة: 1 رطل = 453,59 g).

													وسط الفئة (بالرطل)
													ترددات
55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5			
3	6	9	11	13	16	13	11	9	6	3	P_1		
0	0	0	2	21	54	21	2	0	0	0	P_2		

1. مثل على نفس المبيان منحنى تردد زيادة الوزن عند الجماعتين P_1 و P_2 (استعمل $1\text{cm} = 1\text{kg}$ لكل فئة، و $1\text{cm} = 453,59 \text{ g}$ يساوي 5 أفراد). (1.5 ن)

أعطت الدراسة الإحصائية عند الجماعة P_1 الثابتات الإحصائية المبينة في الجدول الآتي:

الانحراف المعياري δ	الوسط الحسابي \bar{X} بالرطل	المنوال بالرطل	الثابتات الإحصائية
$\delta = 12.42$	$\bar{X} = 30$	$Mo = 30$	القيم

2. حدد قيمة المنوال واحسب قيمة كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري عند الجماعة P_2 وذلك بإنجاز جدول تطبيقي لحساب هذه الثابتات. نعطي $\delta = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{X})^2}{n}}$ (1.5 ن)

3. قارن بين توزيع الجماعتين على مستوى التمثيل البياني، وعلى مستوى الثابتات الإحصائية، مبرزا أي الجماعتين أكثر تجانسا. (1.5 ن)

4. هل سيؤثر اختلاف التوزيع بين الجماعتين على المردودية الإنتاجية عند الفلاح. على إجابتك. (0.5 ن)

التمرين الرابع (5 نقط)

تحكم في لون الأجنحة عند نوع من الفراشات، مورثة بحليلين A و a، وقد بينت دراسة أولية أن المظهر الفاتح متّح ويقابلّه النمط الوراثي a//a. نعتبر تردد الحليل A هو p وتردد الحليل a هو q.

مكّن القبض، في وسط طبيعي، على 1600 فراشة من ساكنة P، منها 1344 فراشاً بمظهر قاتم، و256 فراشاً بمظهر فاتح.

1. باعتبار هذه الساكنة خاضعة لقانون Hardy-Weinberg، احسب ترددات الأنماط الوراثية وتردد الحليلين A و a. (1.25 ن)

		نتيجة المجموعة 1	نتيجة المجموعة 2	نتيجة المجموعة 3
		A	a	
الحليل	الحليل			
15	47	38		
عدد أفراد كل مجموعة				-

ترمز المورثة المدروسة لأحد الأنزيمات المتقدّلة في تركيب الصبغات الملونة للأجنحة، ويمكن رصد هذه المورثة عن طريق تقنية التحديد الدقيق للحليلات المعتمدة على الهجرة الكهربائية؛ وتمثل الوثيقة جانب النتائج المحصلة عند عينة ممثّلة للساكنة P، تكون من 100 فرد:

2. انطلاقاً من معطيات هذه الوثيقة، حدد الأنماط الوراثية المناسبة لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة معلّلاً إجابتك، واحسب ترددّي الحليلين A و a عند هذه العينة. (1.75 ن)

3. تمثل الأعداد 38 و 47 و 15 الأعداد الملاحظة لأفراد كل مجموعة:

أ- احسب الأعداد المنتظرة (النظرية) لمختلف الأنماط الوراثية في حالة توازن الساكنة. (1,5 ن)

ب- قارن بين الأعداد النظرية والملاحظة لترددات مختلف الأنماط الوراثية للعينة ثم بين أن الساكنة المدروسة في حالة توازن حسب قانون Hardy-Weinberg. (0,5 ن)

(ملحوظة: عندما تكون الأعداد الملاحظة والأعداد المنتظرة أو النظرية متقاربة، نعتبر أن الساكنة في حالة توازن.)